

中西医执业/助理医师

药理学

刷题直播

主讲：庄严

1. 全身麻醉前给药，应选用的药物是
 - A. 毛果芸香碱
 - B. 新斯的明
 - C. 毒扁豆碱
 - D. 阿托品
 - E. 安定
2. 某患者有机磷农药急性中毒，其临床表现为
 - A. 口干，胃肠绞痛。
 - B. 尿失禁，呼吸肌麻痹。
 - C. 尿潴留，流唾液。
 - D. 脑内乙酰胆碱下降，瞳孔扩大。
 - E. 针尖样瞳孔，尿失禁。
3. 患者，男，25岁，有机磷农药中毒后，经碘解磷定和阿托品治疗，患者出现颜面潮红、脉搏加快、烦躁不安、瞳孔散大，对此应采取哪一项措施
 - A. 立即停用碘解磷定
 - B. 立即停用阿托品
 - C. 加大阿托品的用量
 - D. 加大碘解磷定用量
 - E. 阿托品逐渐减量至停
4. 既可以激动 α 受体，又可以激动 β 的药物是
 - A. 间羟胺
 - B. 肾上腺素
 - C. 去甲肾上腺素
 - D. 麻黄碱
 - E. 异丙肾上腺素
5. 肾上腺素能够抢救过敏性休克其机制说法错误的是
 - A. 激动心脏 β_1 受体→让骤停心肌复跳
 - B. 激动 β_2 受体→松弛血管
 - C. 激动血管 α 受体→升高血压
 - D. 激动 β_2 受体→松弛支气管平滑肌
 - E. 激动多巴胺受体（ D_1 ）→血管舒张。
6. 对各种类型癫痫均有治疗作用的药物是
 - A. 苯妥英钠
 - B. 地西洋
 - C. 乙琥胺

医师资格考试辅导

- D. 苯巴比妥
E. 丙戊酸钠
7. β 受体阻断药
- A. 可使心率加快、心排出量增加
 - B. 有时可诱发或加重哮喘发作
 - C. 促进脂肪分解
 - D. 促进肾素分泌
 - E. 升高眼内压作用
8. 不属于苯二氮草类药物作用特点的是
- A. 有抗焦虑作用
 - B. 具有外周性肌松作用
 - C. 有镇静作用
 - D. 有催眠作用
 - E. 静脉给药用于癫痫持续状态
9. 氯丙嗪对体温的影响是
- A. 不需要配合物理降温可使体温下降
 - B. 使体温随环境温度变化而升降
 - C. 降低发烧体温，对正常体温无影响
 - D. 降低正常体温，对发热者无效
 - E. 在高温环境中，对体温无影响
10. 吗啡的作用是
- A. 镇痛、镇静、镇咳
 - B. 镇痛、镇静、抗震颤麻痹
 - C. 镇痛、呼吸兴奋
 - D. 镇痛、欣快、止吐
 - E. 镇痛、镇静、散瞳
11. 几乎没有抗炎、抗风湿作用的药物是
- A. 保泰松
 - B. 乙酰水杨酸
 - C. 对乙酰氨基酚
 - D. 吲哚美辛
 - E. 布洛芬
12. 某发热伴有消化道溃疡患者最适宜选用的药物
- A. 布洛芬
 - B. 吲哚美辛
 - C. 保泰松
 - D. 阿司匹林
 - E. 对乙酰氨基酚

13. 对脑血管具有较强扩张作用的钙拮抗药是
- A. 维拉帕米
 - B. 硝苯地平
 - C. 尼莫地平
 - D. 地尔硫卓
 - E. 加洛帕米
14. 患者，男性，65岁，心悸、头晕10min，血压120/80mmHg，心电图提示室性心动过速。最恰当的治疗是立即使用
- A. 胺碘酮
 - B. 索他洛尔
 - C. 普罗帕酮
 - D. 利多卡因
 - E. 直流电复律
15. 患者，男，61岁，因风湿性心脏病给予地高辛0.5mg/d，连续治疗一个月后，病情好转，但患者出现恶心、呕吐、黄视等症状。经检查：心电图显示PP间期和PR间期延长；诊断为地高辛中毒。除立即停药外，还应采用
- A. 阿托品
 - B. 苯妥英钠
 - C. 普萘洛尔
 - D. 腺苷
 - E. 利多卡因
16. 不宜用于变异型心绞痛的药物是
- A. 硝酸甘油
 - B. 普萘洛尔
 - C. 硝苯地平
 - D. 维拉帕米
 - E. 硝酸异山梨酯
17. 用于变异型心绞痛的药物是
- A. 硝酸甘油
 - B. 普萘洛尔
 - C. 硝苯地平
 - D. 维拉帕米
 - E. 硝酸异山梨酯
18. 小剂量阿司匹林临床用于
- A. 风湿性关节炎
 - B. 头痛
 - C. 发热
 - D. 神经痛

E. 预防血栓形成

19. 患者，男，65岁，COPD及高血压20年，血压180/80mmHg，曾经有心绞痛发作史，休息后缓解，本次以头痛头晕就诊，首选药降压药为

- A. 利尿剂
- B. β 受体阻滞剂
- C. ACEI
- D. α 受体阻滞剂
- E. 钙通道阻滞剂

20. 患者，男性，65岁，高血压5年，血压170/100mmHg，空腹血糖7.0mmol/L，尿蛋白（++++）。该患者首选的降压药应为

- A. 钙通道阻滞剂
- B. β 受体阻滞剂
- C. 利尿剂
- D. α 受体阻滞剂
- E. 血管紧张素转换酶抑制剂

21. 男，60岁。突发喘憋1小时。查体：BP160/70mmHg，双肺满布湿性啰音，心率105次/分。该患者最适宜的治疗措施是

- A. 口服螺内酯
- B. 静脉滴注小剂量多巴胺
- C. 口服氨茶碱
- D. 口服氢氯噻嗪
- E. 静脉推注呋塞米

22. 肝素抗凝血作用的主要机制是

- A. 阻碍凝血因子II、VII、IX、X的合成
- B. 抑制血小板聚集
- C. 增强ATIII对凝血因子的灭活作用
- D. 降低血中钙离子浓度
- E. 促进纤维蛋白溶解

23. 呋塞米的利尿作用特点是

- A. 迅速、强大而持久
- B. 迅速、强大而短暂
- C. 迅速、微弱而短暂
- D. 缓慢、强大而持久
- E. 缓慢、微弱而短暂

24. 某患者，男，29岁。喘息12年，淋雨后咳嗽，夜间突发呼吸困难，查体：双肺满布哮鸣音。X线片未发现异常。应首先采取的治疗措施是

- A. 吸入糖皮质激素
- B. 口服抗过敏药物

医师资格考试辅导

- C. 静脉点滴抗生素
- D. 使用支气管舒张剂
- E. 无创通气

25. 患者，男，25岁，夜间上腹痛2周，黑便2天，呕血伴头晕乏力4小时，最适宜应用的药物是

- A. 雷利替丁
- B. 甲氧咪胍
- C. 奥美拉唑
- D. 多潘立酮
- E. 枸橼酸泌钾

26. 患者，女，36岁，患甲亢5年，需行甲状腺部分切除术，正确的术前准备是

- A. 术前2周给丙硫氧嘧啶+小剂量碘剂
- B. 术前2周给丙硫氧嘧啶+普萘洛尔
- C. 术前2周给丙硫氧嘧啶+大剂量碘剂
- D. 术前2周给丙硫氧嘧啶
- E. 术前2周给卡比马唑

27 (共用选项)

患者，男，56岁。糖尿病病史2年，服用二甲双胍治疗出现明显胃肠道反应，改为格列齐特缓释片30mg/日治疗6个月，复查空腹血糖6.3mmol/L，餐后2小时血糖11.8mmol/L，HbA1c7.5%，时有午餐前心慌出汗。查体：BP120/80mmHg，双下肢水肿，BMI 30。

(1) 该患者心慌、出汗的原因最可能是

- A. 过敏反应
- B. 高血压
- C. 焦虑
- D. 低血糖
- E. 心率失常

(2) **该患者目前最合适的治疗是改用**

- A. 阿卡波糖
- B. 吡格列酮
- C. 甘精胰岛素
- D. 瑞格列奈
- E. 格列吡嗪

28. 下列有关第三代头孢菌素的药理作用特点说法正确的是

- A. 主要用于轻、中度呼吸道和尿路感染
- B. 抗革兰阳性菌的作用较第一、二代头孢菌素弱，对革兰阴性菌有较强的作用
- C. 对β-内酰胺酶的稳定性较第一、二代头孢菌素低
- D. 对肾脏毒性较第一、二代头孢菌素强
- E. 对组织穿透力弱

29. 患者，女，3岁，高热，呼吸困难，双肺散在小水泡音，诊断为支气管肺炎，青霉素过

医师资格考试辅导

敏试验（+），宜用

- A. 四环素
- B. 氯霉素
- C. 头孢唑啉
- D. 磺胺嘧啶
- E. 红霉素

30（共用选项）

- A. 头孢唑啉
- B. 左氧氟沙星
- C. 庆大霉素
- D. 克林霉素
- E. 阿奇霉素

（1）男，14岁。发热、干咳伴全身肌痛2天，胸部X线片示间质性肺炎，同班级中数人有类似症状，治疗首选的是

（2）男，42岁。发热3天，咳脓臭痰1天。胸部X线片示右下叶空洞痰，其内有液平。治疗首选的是

31（共用选项）

- A. 青霉素
- B. 头孢曲松
- C. 克林霉素
- D. 氧氟沙星
- E. 红霉素

（1）孕妇感染生殖道沙眼衣原体首选的治疗药物是

（2）孕妇感染苍白密螺旋体首选的治疗药物是

32. 患者，男，38岁，发热，咳嗽两个月，胸部X线片示左上肺不规则片状阴影，予抗结核治疗一月余。查体：T36.5℃。巩膜稍黄染。双肺未闻及干湿啰音。WBC 4.3×10^9 ，N0.55。肝功能检查示：ALT，AST正常。总胆红素40.6 $\mu\text{mol/l}$ 。直接胆红素17.8 $\mu\text{mol/l}$ 。该患者现停用的药物是

- A. 利福平
- B. 异烟肼
- C. 吡嗪酰胺
- D. 乙胺丁醇
- E. 链霉素