

医学教育网中级主管护师：《答疑周刊》2021 年第 3 期

1. 【问题】胸腔穿刺过多或过快容易造成肺水肿，其机制是什么？

【解答】胸腔积液时一部分肺组织萎陷，造成缺血缺氧损伤，当肺复张时加大了肺血管的机械损伤，使其通透性增强，渗出，水肿形成。也可能与肺萎陷导致的气道炎症反应，和各种血管活性物质和炎症因子的释放有关。其次，肺复张，大量血管床开放，需要右心射出更多的血液量，易导致循环衰竭。

2. 【问题】各种瓣膜病的听诊声音怎么区别？

【解答】鉴别各种瓣膜病：

- ①二尖瓣狭窄：心尖部可闻及舒张期隆隆样杂音；
- ②二尖瓣关闭不全：心尖区全收缩期粗糙、吹风样杂音；
- ③主动脉瓣狭窄：主动脉瓣区可听到响亮、粗糙的收缩期吹风样杂音；
- ④主动脉瓣关闭不全：第二主动脉瓣区可听到舒张早期叹气样杂音。

3. 【问题】心梗最常见的心律失常不是室性期前收缩吗？

【解答】心律失常：是急性心肌梗死病人死亡的主要原因。约有 75%~95% 的病人发生心律失常，多发生于病后 1~2 天内，前 24 小时内发生率最高，以室性心律失常最多见，成对出现或呈短阵室性心动过速，常是出现室颤先兆。室颤是急性心肌梗死早期病人死亡的主要原因。

4. 【问题】破伤风和气性坏疽隔离方式是什么？

【解答】破伤风杆菌具有传染性，为防止播散，应执行接触隔离。

气性坏疽属于接触隔离，就是说气性坏疽的病人，不能接触其他人；气性坏疽，伤口部位的分泌物也不能接受到其他人。

5. 【问题】尿路刺激征病人能应用阿托品类药物吗？

【解答】尿路刺激征：包括尿频、尿急、尿痛、排尿不尽感及下腹坠痛等。尿路刺激征常见于尿路感染、结石等。

如果是尿路结石引起的尿路刺激征是可以使用的。

止痛：肾绞痛发作时单独或联合应用药物，如注射阿托品、哌替啶、钙离子阻滞药、黄体酮等可缓解肾绞痛。