

医学教育网内科主治医师考试:《答疑周刊》2022年第38期

消化内科学在内科主治医师考试中是相对来说比较简单的一科,但是零碎的内容比较多,还是需要大家重点复习,今天一起来做几道急性胰腺炎的题目。

问题索引:

1. 胰腺假性囊肿多在 SAP 病程几周左右出现?
2. 在患者病史不清的时候,下列对鉴别急性胰腺炎和急性消化性溃疡穿孔最有意义的是什么?
3. 是否了解关于急性胰腺炎的实验室检查中淀粉酶的情况?

具体解答:

1. 胰腺假性囊肿多在 SAP 病程几周左右出现

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
- E. 6

【正确答案】 C

【答案解析】 胰腺假性囊肿多在 SAP 病程 4 周左右出现,初期为液体积聚,无明显囊壁,此后由肉芽或纤维组织构成的囊壁缺乏上皮,囊内无菌生长,含有胰酶。一般假性囊肿 <5cm 时,6 周内约 50% 可自行吸收。[医学教育网原创]

2. 在患者病史不清的时候,下列对鉴别急性胰腺炎和急性消化性溃疡穿孔最有意义的是

- A. 疼痛部位不同
- B. 腹膜刺激征阳性
- C. 血清淀粉酶
- D. X 线腹平片
- E. 低血压

【正确答案】 D

【答案解析】 在急性胰腺炎与急性消化道溃疡穿孔的鉴别中,针对于以上 5 种

选项相对来讲最有价值的是 X 线腹平片，消化道穿孔会有膈下游离气体。

3. 关于急性胰腺炎的实验室检查正确的是

- A. 白细胞多数正常
- B. 血淀粉酶在起病后 2~12 小时开始升高，48 小时开始下降
- C. 尿淀粉酶有特异性，对临床有诊断意义
- D. 淀粉酶的特异性很高，其他的消化道疾病淀粉酶一般不高
- E. 淀粉酶的高低与病情成正比

【正确答案】 B

【答案解析】 血白细胞多数偏高。血淀粉酶在起病后的 2~12 小时开始升高，48 小时开始下降，持续 3~5 天。血淀粉酶的高低不一定反映病情的轻重，出血坏死型胰腺炎淀粉酶可以正常或低于正常。尿淀粉酶在轻度的肾功能改变时会受到影响，对临床诊断意义不大。[医学教育网原创]