

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2022年第37期

问题索引：

1. 【问题】伤寒病人灌肠时的注意事项有哪些？
2. 【问题】谵妄是属于昏睡状态吗？与意识模糊的区别在哪？
3. 【问题】胸腔闭式引流的拔管指征及拔管方法是什么？
4. 【问题】羊水量正常是多少？

具体解答：

1. 【问题】伤寒病人灌肠时的注意事项有哪些？

【解答】急性肾小球肾炎，成人和儿童有区别，成人多为凹陷性，儿童急性肾小球肾炎多为非凹陷性，这是由于小儿组织液多，液体过多集聚在组织间隙中所以压之不凹陷。而肾病综合征大量蛋白流失，所以是可凹性水肿。慢性肾小球肾炎也为凹陷性水肿。[医学教育网原创]

(1) 凹陷性水肿：体液积聚于皮下组织间隙，指压后组织下陷。病因：心、肝、肾源性水肿；营养不良性水肿等。

(2) 非凹陷性水肿：体液积聚于皮下组织间隙，指压后组织下陷不明显或没有凹痕；病因：粘液性水肿（组织液蛋白含量较高）、丝虫病（慢性淋巴液回流受阻）

2. 【问题】谵妄是属于昏睡状态吗？与意识模糊的区别在哪？

【解答】谵妄属于意识模糊，一种以兴奋性增高为主的意识模糊，伴有知觉障碍，是意识模糊的不同形式。

意识模糊：意识障碍的程度比嗜睡较深，病人有定向障碍、思维和语言也不连贯，对周围环境的理解和判断失常，可有错觉、幻觉、躁动、精神错乱等，常见于急性重症感染的高热期。

另有一种以兴奋性增高为主的意识模糊，伴有知觉障碍，称为谵妄，表现为定向力丧失，感觉错乱，乱语躁动。[医学教育网原创]

意识状态的相关知识点如下：

意识状态		意识障碍程度	可否唤醒	刺激反应	临床表现
嗜睡		最轻	可	有	可醒觉但反应较迟钝,一旦刺激去除,则又迅速入睡
意识模糊		比嗜睡深			定向力丧失,感觉错乱,乱语躁动
昏睡		近似于人事不省	不易唤醒	有	醒时答话含糊或答非所问
昏迷	浅昏迷	意识大部分丧失	否	强刺激有反应	各种防御反射仍存在,但反应迟钝
	深昏迷	意识全部丧失	否	无	瞳孔散大,呼吸不规则,血压下降

### 3. 【问题】胸腔闭式引流的拔管指征及拔管方法是什么?

**【解答】**拔管指征:一般置引流 48~72 小时后,临床观察无气体逸出[医学教育网原创],或引流量明显减少且颜色变浅,24 小时引流液 < 50ml,脓液 < 10ml, X 线胸片示肺膨胀良好无漏气,患者无呼吸困难,可拔管。

拔管方法:嘱患者先深吸一口气,在深吸气末屏气并迅速拔管,立即用凡士林纱布和厚敷料封闭胸壁伤口,外加包扎固定。

### 4. 【问题】羊水量正常是多少?

**【解答】**正常足月羊水量[医学教育网原创]为 800~1000ml,凡在妊娠任何时期内羊水量超过 2000ml 者,称羊水过多;妊娠足月时羊水量少于 300ml 称羊水过少。