

医学教育网内科主治医师考试:《答疑周刊》2022年第44期

呼吸内科学在内科主治医师考试中是相对来说比较简单的一科,但是零碎的内容比较多,还是需要大家重点复习,今天一起来做几道结核性脑膜炎的题目。

问题索引:

1. 化脓性脑膜炎与结核性脑膜炎的主要区别是什么?
2. 早期结核性脑膜炎的主要临床表现特点是什么?
3. 结核性脑膜炎最常侵犯的颅神经是什么?

具体解答:

1. 化脓性脑膜炎与结核性脑膜炎的主要区别是

- A. 脑脊液检查
- B. 病史
- C. OT 试验
- D. 胸部 X 线检查
- E. 血象检查

【正确答案】 A

【答案解析】 化脓性脑膜炎的脑脊液混浊,细胞数显著增加,蛋白增加,糖和氯化物降低,培养常(+);而结核性脑膜炎脑脊液呈毛玻璃状,静置后有薄膜形成,蛋白增加、葡萄糖的降低均不如化脓性脑膜炎显著,培养可见抗酸杆菌。其他检查对鉴别两者意义不大。[医学教育网原创]

2. 早期结核性脑膜炎的主要临床表现特点是

- A. 性情改变
- B. 头痛、呕吐
- C. 结核中毒症状
- D. 嗜睡、双眼凝视
- E. 感觉过敏

【正确答案】 A

【答案解析】 结核性脑膜炎前驱期(早期)1~2周,一般起病缓慢,在原有结核病基础上,出现性情改变,如烦躁、易怒、好哭,或精神倦怠、呆滞、嗜睡或

睡眠不宁, 两眼凝视, 食欲缺乏、消瘦, 并有低热、便秘或不明原因的反复呕吐。年长儿可自诉头痛, 初可为间歇性, 后持续性头痛。婴幼儿表现为皱眉、以手击头、啼哭等。

3. 结核性脑膜炎最常侵犯的颅神经是

- A. 嗅神经和舌咽神经
- B. 滑车神经和迷走神经
- C. 三叉神经和听神经
- D. 展神经和喉返神经
- E. 面神经和动眼神经

【正确答案】 E

【答案解析】 由于颅底炎性渗出物刺激、包埋和压迫颅神经及结核性动脉炎导致脑实质缺血、颅内压增高等影响, 结核性脑膜炎常有颅神经损害, 最多见面神经、动眼神经、外展神经、视神经, 可以是单侧或双侧, 呈完全或不完全麻痹。颅神经损害症状可以是结核性脑膜炎的首发症状。[医学教育网原创]