

医学教育网乡村全科助理医师: 《答疑周刊》2023年第26期

小儿腹泻或称腹泻病,是一组由多病原、多因素引起的以大便次数增多和大便性状改变为特点的消化道综合征。是我国婴幼儿最常见的疾病之一。6个月~2岁婴幼儿发病率高,是造成小儿营养不良、生长发育障碍甚至死亡的主要原因之一。引起小儿腹泻的病因分为感染性及非感染性原因。

问题索引:

1. 婴儿腹泻重度脱水的主要诊断依据是?
2. 迁延性腹泻的病程为?
3. 某患儿,因为急性腹泻,导致脱水,脱水性质(如高渗性、等渗性等)的判断依据是?

具体解答:

1. 婴儿腹泻重度脱水的主要诊断依据是

- A. 眼眶前囟深凹
- B. 皮肤弹性极差
- C. 哭无泪,尿量极少
- D. 精神极度萎靡
- E. 外周循环衰竭

【正确答案】E

【答案解析】重度脱水表现为皮肤黏膜极干燥,〔医学教育网原创〕弹性极差,眼窝深陷,四肢末梢厥冷,尿量极少或无尿。主要诊断依据为外周循环衰竭。

2. 迁延性腹泻的病程为

- A. 2周到2月
- B. 2周到3月
- C. 3周到2月
- D. 3周到3月

E. 1 月到 3 月

【正确答案】 A

【答案解析】 临床分期：急性腹泻：连续病程在 2 周以内。迁延性腹泻：病程 2 周~2 个月。慢性腹泻：病程 2 个月以上。

3. 某患儿，因为急性腹泻，导致脱水，脱水性质（如高渗性、等渗性等）的判断依据是

A. 血钠+血钾

B. 血钠+血氯

C. 血钠

D. 血钾

E. 血氯

【正确答案】 C

【答案解析】 脱水性质：根据脱水时血浆渗透压（主要是血钠浓度）的高低，可分为等渗性脱水、低渗性脱水、高渗性脱水。 [医学教育网原创]