

医学教育网外科主治医师：《答疑周刊》2024年第8期

手术顺利完成后并不能放松警惕，在患者恢复及出院前，患者手术的术后并发症也是需要及时发现的。本题带大家了解术后并发症的相关知识。

问题索引：

1. 术后出血的原因及诊断？
2. 切口裂开的原因及预防？
3. 阑尾炎术后并发症？

具体解答：

1. 术后出血的原因及诊断？

胸腔手术后，从引流管内每小时引流出血液超过多少，持续数小时，提示有内出血

- A. 300ml
- B. 200ml
- C. 100ml
- D. 50ml
- E. 250ml

【答案】C

【解析】术中止血不完善、原痉挛的小动脉断端舒张和渗血未完全控制等是术后出血的主要原因。（1）腹部手术后特别是没有放置腹腔引流者，腹腔内出血局部体征可以暂时不明显，只有严密观察或必要时进行腹腔穿刺才能明确诊断。（2）胸腔手术后，从引流管内每小时引[医学教育网原创]流出血液超过 100ml，持续数小时，提示有内出血。（3）手术后早期出现失血性休克征象，中心静脉压低于 0.49kPa，每小时尿量少于 25ml。（4）特别是在输给足够血液后，休克征象不好转或加重，或好转后又恶化者，均提示有手术后出血。

2. 切口裂开的原因及预防？

下列预防腹部切口裂开的措施中，不正确的是

- A. 患者咳嗽时最好是半卧位
- B. 适当腹部加压包扎
- C. 提高营养状况
- D. 良好麻醉肌肉松弛下缝合切口
- E. 必要时加用全层腹壁减张缝合

**【答案】** A

**【解析】**切口裂开主要原因有：①营养不良，组织愈合能力差；②切口缝合技术有缺点，缝线过细，打结不紧，腹膜[医学教育网原创]撕裂等；③腹腔压力突然增高，如剧烈咳嗽或严重腹胀等。预防包括：①手术时用减张缝线；②及时处理腹胀；③患者咳嗽时，最好平卧；④适当的腹部包扎。

### 3. 阑尾炎术后并发症?

下列属于阑尾炎术后并发症的是

- A. 外瘻
- B. 粘连性肠梗阻
- C. 腹腔脓肿
- D. 内瘻
- E. 化脓性静脉炎

**【答案】** B

**【解析】**阑尾炎手术后可以由于阑尾动脉结扎线脱落或局部感染侵犯血管而出现腹腔出血；由于阑尾残端炎症或包埋不满意导致粪瘻；由于手术粘连出现肠梗阻；由于阑尾残端残留过长而于术后出现阑尾残株炎。A、C、D、E均为急性阑尾炎并发症。