



医学教育网口腔主治医师：《答疑周刊》2024年第14期

问题索引：

1. 银汞合金的腐蚀有哪些表现？
2. 乳牙外伤后决定患牙能否保留的因素有哪些？
3. 新生儿颌骨骨髓炎常发生的位置？
4. 圈形卡环用于下颌近中舌侧倾斜的基牙时，卡环臂尖端应该在哪个位置？

具体解答：

1. 银汞合金的腐蚀有哪些表现？

银汞合金的腐蚀主要表现为

- A. 蠕变
- B. 膨胀
- C. 失泽
- D. 收缩
- E. 疏松

【答案】C

【解析】银汞合金的腐蚀有两种表现形式，一种称失泽，主要由口腔中的细菌、食物及硫化物、氯化物、氧化物等造成。[医学教育网原创]表现为充填体表面失去光泽、发暗或变色，但无实质性缺损。另一种表现为表面晦暗且有实质性缺损，称腐蚀，临床可见明显的小凹或表层片状剥脱，大多有电化学腐蚀所致。对银汞合金充填物表面进行高度抛光可以减少其腐蚀。

2. 乳牙外伤后决定患牙能否保留的因素有哪些？

乳牙外伤后，决定患牙是否保留的主要因素是

- A. 并发牙髓出血
- B. 并发牙髓坏死
- C. 并发根尖周炎
- D. 并发牙根吸收



E. 影响恒牙胚的发育

【答案】 E

【解析】乳牙外伤后，由于其下方为恒牙胚，[医学教育网原创]乳牙的病变可以导致恒牙的发育异常。

3. 新生儿颌骨骨髓炎常发生的位置？

新生儿颌骨骨髓炎常发生在

- A. 下颌骨体部
- B. 下颌支
- C. 下颌骨髁突
- D. 上颌骨
- E. 上颌骨与翼突连接处

【答案】 D

【解析】新生儿颌骨骨髓炎主要发生在上颌骨，[医学教育网原创]下颌骨极为罕见。

4. 圈形卡环用于下颌近中舌侧倾斜的基牙时，卡环臂尖端应该在哪个位置？

为下颌近中舌侧倾斜的末端孤立牙设置圈形卡环时，卡环臂尖端位于基牙的

- A. 基牙近中缺隙侧邻面
- B. 基牙舌侧近中的倒凹区
- C. 基牙颊侧近中的倒凹区
- D. 基牙远中邻面
- E. 基牙颊侧的倒凹区

【答案】 B

【解析】[医学教育网原创]圈形卡环的尖端在上颌磨牙的颊侧近中和下颌磨牙的舌侧近中。