

## 2018 年临床执业医师第一次全国水平测试卷

### 一、A1 型题

1. 对于胸腔积液, 下列说法错误的是

- A. 积液量在 300~500ml 时可无临床症状
- B. 积液量小于 500ml 可有 X 线表现
- C. CT 检查对提示积液性质无效
- D. B 超是敏感性最高的检查胸腔积液的无创性诊断方法
- E. X 胸片可不表现为弧形向上的积液影

2. 吸入性肺脓肿的病原菌绝大多数是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 厌氧菌
- C. 克雷伯杆菌
- D. 大肠杆菌
- E. 肺炎链球菌

3. 常用控制支气管哮喘急性发作药物的作用, 下列说法错误的是

- A.  $\beta_2$ 受体激动剂可提高细胞内 cAMP 的浓度
- B. 茶碱主要是通过抑制腺苷酸环化酶, 减少 cAMP 的水解作用
- C. 抗胆碱能类药可减少 cGMP 的浓度
- D. 糖皮质激素既有激活腺苷酸环化酶的作用又可以抑制磷酸二酯酶
- E. 酮替芬可抑制组胺和慢反应物质释放

4. 不能用于判断急性心肌梗死后溶栓成功的临床指标为

- A. 胸痛缓解
- B. 2 小时内频发的室性期前收缩
- C. 冠脉造影

D. CK-MB 峰值前移

E. 窦性心动过速

5. 急性心肌梗死早期最重要的治疗措施是

- A. 降低心肌耗氧量
- B. 消除心律失常
- C. 心肌再灌注
- D. 补充血量
- E. 控制心室率

6. 主动脉瓣听诊区闻及收缩期喷射样杂音, 向颈部传导。最可能的诊断是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 主动脉关闭不全
- E. 肺动脉瓣狭窄

7. 第二心音的产生主要是由于

- A. 二尖瓣和三尖瓣的关闭
- B. 二尖瓣和主动脉瓣关闭
- C. 主动脉瓣和三尖瓣关闭
- D. 二尖瓣和肺动脉瓣关闭
- E. 主动脉瓣和肺动脉瓣的关闭

8. 患有幽门螺杆菌相关性胃炎的病人, 给予哪种抗生素最为宜

- A. 氯霉素
- B. 左氧氟沙星
- C. 先锋霉素 IV
- D. 罗红霉素

E. 羟氨苄西林

9. 对结核性腹膜炎最有诊断价值的检查是

A. PPD 试验

B. 结肠镜检查

C. 血沉

D. 腹水常规

E. 腹腔镜检查+腹膜活检

10. 溃疡性结肠炎的好发部位是

A. 空肠远端

B. 回肠远端

C. 回盲部

D. 横结肠

E. 直肠、乙状结肠

11. 下列哪项不是胃食管反流病并发症

A. 胃癌

B. 食管狭窄

C. 食管腺癌

D. 消化道出血

E. Barrett 食管

12. 消化性溃疡治疗中不属于抑制胃酸分泌的药物是

A. 氢氧化铝

B. 溴丙胺太林

C. 丙谷胺

D. 雷尼替丁

E. 奥美拉唑

13. 判断尿路感染病人是复发还是重新感染, 通常以病人前次治疗停药后几个月再发为依据

A. 2 个月

B. 3 个月

C. 1 个半月

D. 半个月

E. 1 个月

14. 临床表现为“肾病综合征”的 15 岁病人, 经 4 周足量泼尼松治疗后, 症状明显改善, 其肾脏病理表现最可能为

A. 增殖性肾炎

B. 局灶性肾小球硬化

C. 膜性肾病

D. 肾小球囊壁层上皮增生新月体形成

E. 光镜下所见肾小球基本正常

15. 肾病综合征常见的并发症是

A. 感染和电解质紊乱

B. 严重的循环衰竭

C. 高血压脑病

D. 肾衰竭

E. 心力衰竭

16. 新生儿娩出后应首先

A. 抓紧娩出胎盘及胎膜

B. 擦洗新生儿面部

C. 清理呼吸道

D. 刺激新生儿足部

E. 断脐

17. 分娩即将开始比较可靠的征象是

A. 规律宫缩

B. 子宫颈管展平

C. 宫颈扩张

D. 见红

E. 胎先露部下降

18. 能单独应用化疗治愈的肿瘤是

A. 肾母细胞瘤

B. 霍奇金病

C. 急性淋巴细胞白血病

D. 粒细胞白血病

E. 食管癌

19. 营养性缺铁性贫血的有效治疗措施是

A. 叶酸加维生素 B<sub>12</sub>

B. 硫酸亚铁加维生素 C

C. 反复多次输代血浆

D. 服枸橼酸铁胺

E. 反复多次肌注右旋糖酐铁

20. 抢救糖尿病酮症酸中毒应用碳酸氢钠的指征是

A. 出现低钾血症

B. 常规应用

C. 二氧化碳结合力 < 7.1

D. 出现心律失常

E. 合并严重感染

21. 抑郁症特有的睡眠障碍是

A. 入睡困难

B. 易醒

C. 多梦

D. 早醒

E. 白天瞌睡

22. 抑郁症的急性期, 抗抑郁剂治疗至少

A. 1~2 周

B. 2~4 周

C. 4~6 周

D. 6~8 周

E. 8~10 周

23. 骨折的特有体征是

A. 畸形

B. 血运不良

C. 局部肿胀

D. 疼痛

E. 休克

24. 治疗小儿原发性肾病综合征的首选药物是

A. 呋塞米

B. 低分子右旋糖酐

C. 清蛋白

D. 肾上腺皮质激素

E. 环磷酰胺

25. 左向右分流型先天性心脏病最常见的并发症是

A. 细菌性心内膜炎

B. 脑血栓

C. 脑脓肿

D. 肺炎

E. DIC

26. 用硫酸镁治疗妊娠期高血压疾病, 最早出现的中毒症状是

A. 呼吸次数减少

B. 心率减慢

C. 血压降低

D. 循环衰竭

E. 膝反射消失

27. 初产妇, 足月, 阴道分娩, 为预防产后出血, 静注麦角新碱应在

A. 胎头已着冠时

B. 胎头娩出时

C. 胎盘娩出时

D. 胎肩娩出时

E. 胎头拨露阴唇后联合紧张时

28. 临产后, 肥皂水灌肠适用于

A. 胎膜早破

B. 胎位异常

C. 严重心脏病者

D. 初产妇宫口开大 3cm

E. 宫缩强, 估计 1 小时内可分娩者

29 成人上肢无移位的裂缝骨折(非关节处)

应选用哪种治疗

A. 八字固定

B. 三角巾包扎固定

C. 小夹板固定

D. 手术切开内固定

E. 不用处理

30. 大动脉弹性降低

A. 使收缩压与舒张压都升高

B. 使收缩压与舒张压都降低

C. 使收缩压升高, 舒张压降低

D. 只使舒张压升高, 收缩压无影响

E. 只使收缩压升高, 舒张压无影响

31. 中心静脉压低, 血压低提示

A. 心功能不全或血容量相对过多

B. 心功能不全或血容量不足

C. 血容量不足

D. 容量血管过度收缩

E. 心功能不全, 血容量正常

32. 可以转化为 GABA 的氨基酸是

A. 谷氨酸

B. 赖氨酸

C. 缬氨酸

D. 天冬氨酸

E. 蛋氨酸

33. RNA 聚合酶能与 DNA 分子发生特异性结合的部位是

A. 外显子

B. 增强子

C. 密码子

D. 终止子

E. 启动子

34. 关于子宫平滑肌抑制药不正确的是

A. 又称抗分娩药

B. 主要应用于治疗痛经和早产

C. 常用药物有硫酸镁、钙拮抗药等

D. 可包括 $\beta_2$ 肾上腺素受体激动剂

E. 常用于合并心脏病、重度高血压患者

35. 知觉过程中, 依据过去的知识经验, 力求对知觉对象做出某种解释, 使其具有一定的意义, 这是知觉的

A. 选择性

B. 整体性



C. 理解性

D. 恒常性

E. 定势

36. 看到蓝色、紫色常引起人冷的感觉, 属于感觉的

A. 联觉

B. 感觉后象

C. 感觉适应

D. 感觉对比

E. 感觉融合

37. 对患有不治之症且濒临死亡而又极度痛苦的患者, 停止采用人工干预方式抢救而缩短患者痛苦的死亡过程称为

A. 自愿安乐死

B. 非自愿安乐死

C. 积极安乐死

D. 消极安乐死

E. 医师助死

38. 从伦理上说, 允许一个人安乐死, 主要应该基于

A. 患者自身利益

B. 减轻家庭的经济负担

C. 减轻家庭的精神负担

D. 节约社会卫生资源

E. 提供移植器官

39. 对于涂改, 伪造病历资料的医务人员, 卫生行政部门可给予的行政处罚不包括

A. 吊销资格证书

B. 赔偿患者损失

C. 纪律处分

D. 吊销执业证书

E. 行政处分

40. 慢性病防治的基本原则不包括

A. 三级预防并重

B. 生命全程预防

C. 高危人群为主

D. 以健康教育和健康促进为主要手段

E. 以社区和家庭为基础

41. 疾病流行强度包括

A. 散发

B. 流行

C. 大流行

D. 暴发

E. 以上均是

42. 关于破伤风描述正确的是

A. 颈部肌肉强烈收缩最早出现

B. 光线不能诱发全身肌肉抽搐

C. 不会发生骨折

D. 严重者神志不清

E. 可出现尿潴留

43. 下列符合轻度有机磷农药中毒时胆碱酯酶活力是

A. 30%

B. 35%

C. 40%

D. 45%

E. 55%

44. 下列可反映胎儿肺成熟度的是

- A. 卵磷脂/鞘磷脂比值
- B. 淀粉酶值
- C. 胆红素类物质
- D. 含脂肪细胞出现率
- E. 肌酐值

45. 孕妇分娩出院后, 在社区医院进行产后访视, 第一次产后访视的时间应为

- A. 产妇出院后 24 小时内
- B. 产妇出院后 2 天内
- C. 产妇出院后 3 天内
- D. 在产后第 4 天
- E. 在产后第 5 天

46. 下列关于维生素 D 缺乏性手足搐搦症的描述, 哪一项是错误的

- A. 因缺乏维生素 D 所致
- B. 神经肌肉兴奋性增高
- C. 血离子钙低于  $1.0\text{mmol/L}$  ( $4\text{mg/dl}$ )
- D. 甲状旁腺反应迟钝
- E. 血磷基本正常

47. 良性骨肿瘤的 X 线表现

- A. 界限清楚, 密度均匀
- B. 界限不清, 密度均匀
- C. 界限清楚, 密度不均匀
- D. 病灶不规则, 密度不均匀
- E. 以上都不是

48. 电复律治疗时出现心室颤动, 应

- A. 静脉注射利多卡因
- B. 心内注射利多卡因
- C. 再次电复律
- D. 人工心脏起搏
- E. 以上都不对

49. 室间隔缺损的先天性心脏病的主要杂音是

- A. 第 4 肋间 II 级柔和的收缩期杂音
- B. 第 4 肋间 II 级柔和的舒张期杂音
- C. 第 3 肋间 II 级柔和的舒张期杂音
- D. 第 4 肋间 IV 级粗糙的收缩期杂音
- E. 第 4 肋间 IV 级粗糙的舒张期杂音

## 二、A2 型题

50. 病人休克, 血压低, 脉搏 130 次/分, 尿量 20 毫升/小时, 选用哪种血管活性药物最适宜

- A. 多巴胺
- B. 去甲肾上腺素
- C. 肾上腺素
- D. 异丙肾上腺素

E. 以上都不是

51. 患者女性, 34 岁。双腕关节和膝关节疼痛, 伴高热 2 个月。曾有癫痫样发作一次。心脏超声示中等量心包积液; X 线胸片示右侧少量胸腔积液。血常规: Hb、WBC 和血小板下降。尿蛋白 (+++), 多种抗生素治疗无效, 最可能诊断

- A. 结核性胸膜炎和心包炎
- B. 再生障碍性贫血
- C. 恶性肿瘤颅内转移
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 肾小球肾炎急性发作

52. 男, 32 岁, 右上肺结核, 初治用异烟肼、乙胺丁醇和链霉素治疗半年, 停药 4 个月后复发, 复治药物宜选用

- A. 异烟肼+乙胺丁醇+链霉素
- B. 异烟肼+卡那霉素+吡嗪酰胺
- C. 利福平+乙胺丁醇+链霉素
- D. 吡嗪酰胺+链霉素+卡那霉素
- E. 异烟肼+对氨基水杨酸

53. 女, 60 岁, 咳嗽咳痰 8~9 年。查体: 可平卧, 桶状胸, 两肺少量湿啰音, 剑突下可见收缩期搏动, 三尖瓣区可听到收缩期杂音, 查体未见肝脾肿大, 下肢无水肿。其诊断可能为

- A. 慢性支气管炎
- B. 慢性支气管炎+肺气肿
- C. 慢性支气管炎+肺气肿+肺心病代偿期
- D. 慢性支气管炎+肺心病右心衰竭
- E. 以上都不是

54. 男性, 25 岁。因支气管哮喘住院治疗已半月, 症状基本控制, 今晨花园跑步后突发胸痛、胸闷, 用氨茶碱、甲泼尼龙静滴后仍不能缓解, 此时考虑可能有

- A. 支气管哮喘急性发作
- B. 自发性气胸

- C. 继发感染
- D. 心力衰竭
- E. 肺不张

55. 男性, 42 岁。运动时胸闷 1 周。体检: 胸骨左缘第 3~4 肋间可闻及粗糙的喷射性收缩期杂音。心电图示 II、III、aVF 导联出现病理性 Q 波。超声心动图示室间隔流出道部分向左室内突出, 二尖瓣前叶在收缩期向前方运动。该患者最可能的诊断是

- A. 肥厚型心肌病
- B. 风湿性主动脉瓣关闭不全
- C. 室间隔缺损
- D. 动脉导管未闭
- E. 劳力型心绞痛

56. 男, 42 岁, 劳累时心悸、气短 2 年, 腹胀、尿少 3 天。入院诊断为扩张型心肌病, 心功能 IV 级。胸部 X 线示心影常明显增大, 心胸比值 60%, 肺淤血。心电图示心率 96 次/分, 心房颤动, 血清钾 6.5mmol/L, 血清钠 130mmol/L, 该患者不宜应用

- A. 硝普钠
- B. 呋塞米(速尿)
- C. 螺内酯(安体舒通)
- D. 地高辛
- E. 阿司匹林

57. 男性, 30 岁。活动后心悸、气急、发绀、颈静脉怒张 2 个月。检查发现肝大。质地中等, 表面平滑有压痛, 腹部移动性浊音阳性, 下肢压陷性水肿。最可能的诊断是

A. 肝硬化腹水

B. 肝癌伴腹水

C. 肺结核伴结核性腹膜炎

D. 肾病综合征伴腹水

E. 右心衰竭、肝淤血伴腹水

58. 男, 38 岁。突起寒战、高热、恶心、呕吐、腰痛已 4 天。体检: 重病容, 眼睑水肿, 球结膜及胸部皮肤充血, 腋下见少许点状出血点, 血压 70/50mmHg, 怀疑流行性出血热。本例必须首先考虑的治疗措施是

A. 立即手术

B. 补充血容量

C. 纠正酸中毒

D. 小剂量肝素抗 DIC

E. 抗病毒

59. 女, 37 岁, 慢性腹泻 2 年, 大便每天 2~3 次, 常带少量黏液, 反复粪便致病菌培养阴性, 结肠镜检查见为直肠、降结肠和横结肠充血、水肿, 有少数散在浅溃疡。拟诊为溃疡性结肠炎。首选的治疗方案是

A. 泼尼松口服

B. 诺氟沙星口服

C. 甲硝唑保留灌肠

D. 氢化可的松保留灌肠

E. 美沙拉嗪 (5-氨基水杨酸) 口服

60. 女, 30 岁。被汽车撞伤左季肋部 1 小时来诊。查体: T37.5℃, 心率 110 次/分, BP 90/70mmHg。腹平坦, 左上腹肌略紧张, 局部压痛, 全腹有反跳痛, 有移动性浊音 (+),

听诊未闻及肠鸣音。首先的检查是

A. 平卧位 X 线腹部平片

B. 胸部 X 线检查

C. 腹部 CT

D. 上消化道钡餐透视

E. 诊断性腹腔穿刺

61. 男, 25 岁, 腹部被倒墙压伤, 中腹部剧痛伴呕吐 3 小时。BP120/86mmHg, T38℃; 腹胀、肌紧张、压痛、反跳痛阳性, 肠鸣音消失。最可能的诊断是

A. 腹壁挫伤

B. 腹膜后血肿

C. 肝破裂 I 度

D. 小肠破裂

E. 右肾挫伤

62. 男, 6 个月。哭闹时, 右侧腹股沟隆起肿块, 平静时肿块可自行消失。最佳处理方法是

A. 绷带压住腹股沟深环, 观察

B. 尽早施行疝囊高位结扎术

C. 施行加强前壁的疝修补术

D. 施行加强后壁的疝修补术

E. 施行无张力疝修补术

63. 男, 70 岁。右腹股沟区肿块 3 年, 平卧消失。查体: 右耻骨结节外上方有一半球形肿块, 未进入阴囊, 可用手回纳, 压住腹股沟韧带中点上方咳嗽时仍可见肿块突出。最可能的诊断是

A. 股疝



B. 腹股沟斜疝

C. 腹股沟直疝

D. 精索鞘膜积液

E. 交通性鞘膜积液

64. 男, 27 岁。腹痛伴恶心 6 天。6 小时前脐周疼痛伴呕吐, 继而右下腹疼痛逐渐加剧。查体: 右下腹部可触及一直径约 5cm 肿块, 界不清, 明显触痛, 最可能的诊断是

A. 结肠癌

B. 克罗恩病

C. 阑尾周围脓肿

D. 溃疡性结肠炎

E. 直肠癌

65. 男, 60 岁。阑尾切除术后第 6 天起上腹压痛, 伴发热、寒战, 体温高达 39.5℃, 无腹泻。右下胸叩痛, 呼吸音减弱, 腹稍胀, 右上腹压痛, 腹肌软, 未及肿块, 肠鸣音不亢进。最可能的诊断是

A. 右侧肺炎

B. 右侧肺不张

C. 膈下脓肿

D. 盆腔脓肿

E. 小肠梗阻

66. 男, 69 岁。间断上腹痛 15 余年, 2 月来加重伴饱胀, 体重下降 7kg, Hb 90g/L。最可能的诊断是

A. 慢性胰腺炎

B. 慢性肝炎

C. 胃癌

D. 消化性溃疡

E. 功能性消化不良

67. 女, 25 岁, 昨晚吃剩饭一碗, 当夜发生上腹痛, 持续恶心、呕吐。体温 36.5℃, 上腹部压痛, 肠鸣音活跃。白细胞总数、分类及粪常规正常, 首先考虑

A. 急性胃炎

B. 急性肠梗阻

C. 胆囊炎

D. 胃溃疡

E. 急性胰腺炎

68. 男, 70 岁。健康体检时 B 超发现胆囊内有一直径约 0.6cm 结石, 随体位活动, 口服胆囊造影胆囊显影, 充盈缺损不明显。既往无胃病史, 无胆囊炎发作史, 无心脏病、糖尿病史。目前的治疗建议是

A. 观察、随诊

B. 溶石疗法

C. 中药排石

D. 择期行胆囊切除术

E. 择期行腹腔镜胆囊切除术

69. 女, 44 岁, 大便次数增多, 带血 2 个月, 伴便意频繁, 大便变形, 变细, 大便隐血(++); 直肠指诊: 距肛门触到一肿物约 3cm × 3cm 大小, 尚可活动, 指套上有血迹, 病理诊断直肠癌, 对其最主要的治疗方法为

A. 放疗

B. 化疗

C. 根治性手术

D. 中药治疗

E. 激光烧灼

70. 24 岁, 孕妇, G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>, 末次月经记不清。

产科检查: 宫高 34cm, 胎头入盆, 胎心位于脐左下方。其孕周最可能是

A. 孕 28 周

B. 孕 30 周

C. 孕 32 周

D. 孕 36 周

E. 孕 40 周

71. 女, 27 岁, 婚后 3 年未孕, 继发闭经 2 年, 查体双侧乳房泌乳, 血 hCG 水平 800μg/L, 磁共振检查垂体未见占位病变, 诊断继发闭经、原发不育。治疗宜采用

A. 放射治疗垂体腺瘤

B. 手术切除垂体腺瘤

C. 多巴胺激动剂溴隐亭

D. 人工周期恢复月经

E. 促排卵治疗不育

72. 女, 17 岁。身高 1.35m, 月经一直未来潮。智力正常, 第二性征未发育, 血 FSH 升高, 雌二醇水平低下。最可能的诊断是

A. 希恩综合征

B. 特纳综合征

C. 唐氏综合征

D. 多囊卵巢综合征

E. 雄激素不敏感综合征

73. 女, 35 岁。子宫 II 度脱垂伴阴道前后壁轻度膨出, 张力性尿失禁。妇检: 宫颈长约

6cm, 子宫后位, 正常大小, 附件未扪及块状物, 要求手术治疗。首选手术应是

A. 阴道前后壁修补术

B. 曼氏手术

C. 经腹子宫全切除术+阴道前后壁修补术

D. 阴道纵隔形成术

E. 子宫悬吊术

74. 女性, 40 岁。月经量多已 2 年, 近 3 个月来感乏力、头晕、心悸, 查: 血红蛋白 65g/L, 白细胞  $6.0 \times 10^9/L$ , 血小板  $140 \times 10^9/L$ 。骨髓象: 粒红比为 1:1, 红细胞增生活跃, 中晚幼红细胞 45%、体积小、胞浆偏蓝。治疗首选

A. 肌注维生素 B<sub>12</sub>

B. 口服铁剂

C. 输血

D. 手术治疗

E. 口服甘油

75. 年轻的张某是某单位的干部, 告诉医生自己在饭厅吃饭觉得菜很淡, 想拿酱油, 但别人先拿走了; 想喝水时, 就有人即去倒水, 认为别人了解自己的想法。该症状是

A. 超价观念

B. 罪恶妄想

C. 夸大妄想

D. 嫉妒妄想

E. 思维被洞悉妄想

76. 24 岁女性, 病程 6 年, 说有人要害他, 常自笑, 好追求异性, 有时打人摔东西, 话

多内容零乱, 精神检查: 意识清晰, 兴奋多语, 思维松弛, 主动接触异性, 有被害妄想及非血统性妄想, 活动增多而无目的性, 躯体及神经系统检查未见异常, 该患者诊断为

- A. 精神分裂症
- B. 情感障碍 (躁狂相)
- C. 脑器质性精神障碍
- D. 人格障碍
- E. 躯体疾病所致精神障碍

77. 女, 38 岁, 因外伤性股骨干骨折而入院, 入院次日突然出现呼吸困难, 继发昏迷、皮下出血, 血压 80/60mmHg, 其诊断最可能是

- A. 继发感染
- B. DIC
- C. 脂肪栓塞
- D. 骨筋膜室综合征
- E. 腱鞘炎

78. 10 岁女孩。无明显前驱病史。近 3 天来颜面水肿。伴少尿, 肉眼血尿。测血压 150/100mmHg, 查尿常规示: 蛋白 (+++), 红细胞 >100 个/HP, 白细胞 20~30 个/HP, 管型 6~11 个/HP, 血沉 50mm/h, 血 BUN 15mmol/L, 该患儿最可能的诊断是

- A. 急性链球菌感染后肾炎
- B. 急进性肾炎
- C. 狼疮性肾炎
- D. 肾炎性肾病
- E. 急性肾小球肾炎伴泌尿系感染

79. 10 岁男性患儿, 一周前受凉后出现血尿、

水肿 3 天, 近 1 天加重, 同时出现头痛、头昏、呕吐并抽搐 1 次, 查体: 体温 37.3℃, 血压 170/120mmHg, 血 BUN 7.8mmol/L, 尿常规示: 蛋白 ++, 红细胞 >100 个/HP, 白细胞 30 个/HP, 该患儿准确的诊断为

- A. 急进性肾炎
- B. 慢性肾炎急性发作
- C. 肾炎性肾病, 高血压脑病
- D. 急性肾炎, 高血压脑病
- E. 急性肾炎, 颅内出血

80. 女, 2 岁, 多次患肺炎, 体检胸骨左缘上方可闻及连续性“机器”样杂音, 于收缩末期最响应诊断为

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 艾森曼格综合征

81. 一小儿体重 7kg, 身高 65cm, 头围 42.5cm, 乳牙 3 枚, 能独坐一会儿, 不能听懂自己的名字, 此小儿的年龄最可能是

- A. 9 个月
- B. 8 个月
- C. 7 个月
- D. 6 个月
- E. 5 个月

82. 患儿, 男, 1 岁, 因发育落后来诊。查体: 皮肤细嫩、眼距宽、鼻梁扁平、舌常伸出口外, 通贯手。为确诊需首选的检查是

- A. 骨龄
- B. 染色体
- C. 甲状腺功能
- D. 尿氨基酸
- E. 智商测定

83. 高速公路车祸后 2 小时一患者被送至医院, 诉咳嗽、胸部疼痛。查体: T 36.5°C, P 130 次/分, R 30 次/分, BP 90/60mmHg, 神清, 右胸部压痛明显, 右肺呼吸音低, 右下肢有骨折征。胸片示: 右侧液气胸。创伤种类为

- A. 盲管伤
- B. 穿透伤
- C. 开放伤
- D. 挤压伤
- E. 闭合伤

84. 11 个月男婴, II 度烧伤面积 10%, 体重 10 公斤, 额外丢失液量为

- A. 100ml
- B. 150ml
- C. 200ml
- D. 250ml
- E. 300ml

85. 初孕妇, 24 岁, 妊娠 36 周。骨盆测量: 骶耻外径 18.5cm, 坐骨棘间径 9cm, 坐骨结节间径 7.5cm。本例孕妇的骨盆应诊断为

- A. 均小骨盆
- B. 出口狭窄骨盆
- C. 单纯扁平骨盆

- D. 漏斗型骨盆
- E. 男型骨盆

86. 女性患者 38 岁, 上腹部周期性疼痛、反酸、嗝气, 胃肠钡餐见胃窦小弯侧有一直径 1.5cm 溃疡, 边缘整齐, 溃疡周围黏膜呈放射状。应诊断为

- A. 溃疡型胃癌
- B. 胃黏膜糜烂
- C. 应激性溃疡
- D. 胃溃疡
- E. 腐蚀性胃炎

87. 男性, 20 岁, 发热一周伴腹泻, 便血 1 次, 入院经治疗一周后热退, 食欲好转, 中午进食量较多, 下午腹胀明显, 右下腹剧痛, 伴恶心呕吐, 压痛及反跳痛明显, 经外科手术治疗后痊愈出院。考虑术中见何种病变

- A. 肠伤寒, 回肠末端穿孔
- B. 化脓性阑尾炎, 穿孔
- C. 化脓性阑尾炎并局限性腹膜炎
- D. 急性细菌性痢疾, 化脓性阑尾炎
- E. 出血坏死性肠炎并发腹膜炎

88. 男, 59 岁。高血压病史 10 年, 合并糖尿病及胰岛素抵抗。对于该患者以下药物尤其适用的是

- A. 氨氯地平
- B. 依那普利
- C. 美托洛尔
- D. 氢氯噻嗪
- E. 卡维地洛



89. 男性, 5 岁。家中父母海上作业为主, 今日发热, 体温 38.5℃, 腹泻稀便。查体: 周身可见荨麻疹, 无黄疸, 肝肋下 1.0cm, 脾肋下 2.0cm。实验室检查白细胞  $15 \times 10^9/L$ , 嗜酸性粒细胞 40%。构成本病基本病理改变是

- A. 虫卵
- B. 成虫
- C. 毛蚴
- D. 尾蚴
- E. 童虫

90. 男, 20 岁, 大学生。不食、不语伴行为异常 6 个月。曾在当地医院就诊。此次入院检查: 神志清, 仰卧, 头颈悬空不动, 无自发言语, 面无表情, 拒绝服从医生的简单指令, 眼球活动自如。有时突然拍门或抢病友的东西。体格检查未见异常。能够最快缓解其症状的治疗措施是

- A. 改良电抽搐治疗
- B. 口服利培酮
- C. 肌注氟哌啶醇
- D. 肌注地西洋
- E. 静脉滴注氯丙嗪

91. 男, 25 岁。头痛 4 个月, 加重 3 周, 有时喷射性呕吐, 查体: P 59 次/分, BP 160/95mmHg, 双侧视神经乳头水肿, 进一步

(94~96 题共用题干)

女性, 32 岁。因不明原因发热两周来院门

检查和治疗措施为

- A. 胃镜检查与止吐药
- B. 头颅检查 CT/MRI 检查与甘露醇
- C. 心电图与降血压药
- D. 腰椎穿刺与甘露醇
- E. 头颅 X 线与止痛药

92. 女, 45 岁。2 周前发热、咳嗽、咳黄痰、胸闷、胸痛, 经抗炎治疗好转。现再次高热, 咳嗽无痰, 感胸闷。查体: T 38.5℃, P 115 次/分, R 25 次/分, 气管明显左移, 右肺语颤减弱、叩诊呈实音、呼吸音消失, 血 WBC  $22 \times 10^9/L$ , N 0.89。该患者首先考虑的诊断是

- A. 肺脓肿
- B. 肺炎链球菌肺炎
- C. 阻塞性肺炎
- D. 脓胸
- E. 肺不张

93. 男性, 24 岁。高热三天, 咳铁锈色痰, 血白细胞增高, 胸片右上叶片状阴影, 正确选用的抗生素为

- A. 青霉素
- B. 青霉素+链霉素
- C. 青霉素+庆大霉素
- D. 先锋 V
- E. 先锋 V+阿米卡星

诊, 体检: 心脏有杂音。拟诊感染性心内膜炎。

94. 为明确诊断, 抽血培养的最佳时间是

- A. 先用抗生素 3 天, 体温不退时抽取
- B. 停用原用的抗生素两天后, 抽取 3~5 次血培养
- C. 在抗生素应用前, 在 24 小时内, 于畏寒发热时抽 3 次血培养
- D. 原用抗生素可继续使用, 抽取 3 次血培养
- E. 停用抗生素 1~2 周后抽取血培养 3~5 次

95. 感染性心内膜炎最常发生于下列哪种情况

- A. 心脏正常的吸毒者
- B. 肺源性心脏病
- C. 先心病室间隔缺损
- D. 甲亢性心脏病
- E. 风湿性瓣膜病

96. 赘生物常位于以下哪个部位

- A. 二尖瓣关闭不全的瓣叶心房面
- B. 二尖瓣关闭不全的瓣叶心室面
- C. 主动脉关闭不全的瓣叶心房面
- D. 主动脉狭窄的瓣叶心房面
- E. 室间隔缺损的间隔左心室侧

(97~99 题共用题干)

女, 43 岁。右下腹持续性疼痛 5 天, 伴恶心、呕吐, 呕出物为胃内容物。T 38.5℃。体检发现右下腹 5cm×5.5cm 大小肿块, 触痛明显

97. 最可能的诊断是

- A. 粪块所致肠梗阻
- B. 盲肠肿瘤

C. 急性单纯性阑尾炎

D. 阑尾周围脓肿

E. 盲肠扭转

98. 此时较合适的处理是

- A. 急诊行阑尾切除术
- B. 急诊手术脓肿引流
- C. 肠道准备后行右半结肠切除术
- D. X 线钡灌肠
- E. 暂不手术, 保守治疗

99. 如果脓肿扩大, 无局限趋势, 最合适的手术方式是

- A. 脓肿引流
- B. 切除肿块
- C. 常规切除阑尾
- D. 右半结肠切除
- E. 一期肠吻合

(100~101 题共用题干)

男, 45 岁。肝炎病史 20 余年, 近 2 月来出现右侧季肋部持续胀痛, 伴厌食、乏力和腹胀。查体: 右侧肋缘下可触及肿大的肝脏, 质地坚硬, 边缘不规则; AFP>1000μg/L。

100. 首先考虑的疾病是

- A. 肝硬化
- B. 慢性肝炎活动期
- C. 原发性肝癌
- D. 细菌性肝脓肿
- E. 肝脏血管瘤

101. 有确定诊断意义的检查是

- A. 肝功能检查

B. CT

C. MRI

D. 肝穿刺针吸细胞学检查

E. 选择性肝动脉造影

(102~104 题共用题干)

男性患者, 75 岁, 主因排尿困难 5 年, 腰背痛 2 月来诊。查前列腺左叶有直径 1cm 质硬结节, PSA>100ng/ml。

102. 可能的诊断是

A. 良性前列腺增生症

B. 前列腺癌

C. 前列腺炎

D. 前列腺结节

E. 前列腺脓肿

103. 为明确诊断应采取何种措施

A. B 超

B. 全身骨扫描

C. 直肠指诊

D. 经直肠前列腺穿刺活检

E. 磁共振检查

104. 磁共振检查发现第 2、3、4 腰椎有成骨性病灶, 该患者治疗应采取

A. 理疗

B. 牵引

C. TURP

D. 前列腺癌根治术

E. 去势治疗

(105~106 题共用题干)

女性患者, 25 岁, 膀胱刺激症状 2 年 6 个

月, 尿常规检查显示, 尿中有大量红细胞、白细胞, 血生化检查发现尿素氮和肌酐明显升高, IVP 显示右肾不显影, 左肾重度积水, 膀胱显影不佳

105. 该患者最可能患的疾病是

A. 慢性肾盂肾炎

B. 慢性膀胱炎

C. 泌尿系统结核

D. 肾结石合并肾积水

E. 间质性膀胱炎

106. 如果上述诊断确立, 目前应选择何种治疗方案

A. 膀胱造瘘

B. 膀胱扩大

C. 立即血透

D. 左肾造瘘

E. 右肾切除

(107~108 题共用题干)

女, 50 岁。主诉排便时阴道脱出一块状物, 检查见用力时阴道前壁膨出, 宫颈延长, 宫颈外口露于阴道口外, 宫体仍在阴道内, 后倾屈, 附件未扪及。

107. 本例应诊断为

A. 子宫脱垂 I 度合并膀胱膨出

B. 阴道前壁膨出

C. 阴道后壁膨出

D. 子宫脱垂 II 度重

E. 子宫脱垂 II 度轻

108. 本例选择恰当的手术为

- A. Manchester 手术
- B. 阴道前后壁修补术
- C. 阴式子宫全切除术
- D. 阴式子宫全切除术+阴道壁修补术
- E. 经腹子宫全切除术

(109~111 题共用题干)

男性, 45 岁, 双侧股骨干骨折 3 小时。体温 36.5℃, 脉搏细弱, 血压 60/40mmHg, 四肢冰冷, 无尿。

109. 首先考虑的诊断是

- A. 感染性休克
- B. 轻度休克
- C. 中度休克
- D. 重度休克
- E. 过敏性休克

110. 首选的治疗措施是

- A. 静脉用强心药物
- B. 抗休克同时立即手术治疗
- C. 应用抗生素
- D. 利尿剂改善肾功能
- E. 大剂量应用糖皮质激素

111. 该病人应采取的体位是

- A. 平卧位
- B. 下肢抬高 10°
- C. 头和躯干抬高 10°
- D. 头、躯干抬高 20° ~ 30°, 下肢抬高 15° ~ 20°
- E. 头、躯干抬高 40° ~ 50°, 下肢抬高 30° ~ 40°

(112~113 题共用题干)

经产妇, 42 岁。近 5 年痛经并逐渐加重, 伴经量增多及经期延长, 届时需服强止痛药。查子宫增大, 质硬, 有压痛, 血红蛋白 75g/L, B 超子宫后壁肌层增厚, 回声不均。

112. 痛经逐渐加重的原因, 最可能的是

- A. 功能性痛经
- B. 子宫腺肌病
- C. 子宫内膜结核
- D. 子宫肌瘤
- E. 子宫黏膜下肌瘤

113. 本例确诊后的处置应选择

- A. 镇痛药物治疗
- B. 雌激素治疗
- C. 化学药物治疗
- D. 手术治疗
- E. 放射治疗

(114~115 题共用题干)

某医师在取得合法医师资格证书后, 擅自从事婚前医学检查、产前诊断。

114. 对此医师的处置, 正确的是

- A. 由县级以上卫生行政部门予以制止
- B. 可给予警告或处以 2000 元以上 10000 元以下罚款
- C. 责令停业整顿
- D. 终生禁止从事婚前医学检查、产前诊断
- E. 以上均不正确

115. 虽然卫生部门制止, 仍不改正, 并实施终止妊娠手术, 依据规定, 给予



- A. 吊销其执业证书
- B. 行政拘留
- C. 没收违法所得
- D. 没收非法财物
- E. 罚款

(116~117 题共用题干)

8 月, 某中学午餐食谱为: 火腿汉堡包、粥、煮鸡蛋、炒空心菜、萝卜干。部分同学在进食 4 小时后出现头痛、恶心、呕吐、食欲缺乏、腹泻、腹痛、个别有发热, 体温 38~40℃。

116. 引起食物中毒的可能病因是

- A. 沙门菌
- B. 副溶血性弧菌
- C. 葡萄球菌肠毒素
- D. 变形杆菌
- E. 肉毒素

117. 引起食物中毒的食品可能是

- A. 玉米粥
- B. 萝卜干
- C. 煮鸡蛋
- D. 炒空心菜
- E. 火腿汉堡包

(118~119 题共用题干)

崔某, 男, 43 岁, 近 20 年来每年发作一次鬼神附体, 以大仙口气说话, 要求父亲烧香拜佛, 持续数小时后痊愈, 一个半月前开始疲乏无力, 不认家人, 好忘事, 小便尿在裤内, 右侧轻偏瘫, 右手拿不住东西, 好跟别

人说话。既往史: 23 岁时有冶游史, 神经系统检查: 两侧瞳孔不等大, 右瞳孔边缘不整齐, 左侧椭圆形, 右侧瞳孔光反射消失。

118. 哪项检查最有必要

- A. 心理测验
- B. EEG
- C. CSF
- D. 康华试验
- E. 头部 CT

119. 最可能是哪个诊断

- A. 大脑梅毒所致精神障碍
- B. 老年性痴呆
- C. 精神分裂症
- D. 癔症
- E. 脑肿瘤

(120~121 题共用题干)

男性, 33 岁, 因头昏、头痛、多汗、呕吐、腹痛、腹泻半小时来诊。半小时前午餐曾吃青菜和肉类。查体: 呼吸 18 次/分, 脉搏 100 次/分, 血压 120/70mmHg, 多汗, 瞳孔缩小, 肺部偶有湿啰音, 心脏无杂音, 心律规则。

120. 最可能的诊断是

- A. 细菌性食物中毒
- B. 可溶性钡盐中毒
- C. 有机磷杀虫剂中毒
- D. 中暑
- E. 疟疾

121. 中间综合征常发生在有机磷中毒后

- A. 4~12 小时
- B. 24~48 小时
- C. 5~7 天
- D. 10~15 天
- E. 20~30 天

(122~124 题共用题干)

27 岁初产妇, 妊娠 39 周, 规律宫缩 2 小时, 枕右前位, 胎心良好, 骨盆外测量正常, B 超测胎头双顶径 9.3cm, 羊水平段 3.8cm。

122. 此时最恰当的处理应是

- A. 静脉滴注缩宫素加强宫缩
- B. 行剖宫产术
- C. 缓慢静注能量合剂
- D. 肌内注射维生素 K1
- E. 严密观察产程进展

123. 若产妇宫缩正常, 胎头降至+3, 宫口开大 4cm 最恰当的处理应是

- A. 人工破膜
- B. 静脉滴注缩宫素
- C. 行剖宫产术
- D. 行温肥皂水灌肠
- E. 吸氧

124. 若宫口开全, 宫缩减弱, S+4, 阴道检查胎头前囟在骨盆左前方, 此时的处理方法应是

- A. 待自然分娩
- B. 会阴侧切, 转正胎头, 产钳助娩
- C. 静脉滴注缩宫素加速产程进展, 经阴道自娩

- D. 吸氧同时, 静注地西洋 (安定)
- E. 静注葡萄糖液内加维生素 E 同时肌注哌替啶

(125~127 题共用题干)

患儿, 2 岁。低热, 盗汗, 乏力半个月余, 头痛, 间断抽搐 5 天, 体检精神萎靡, 颈强直。克氏征阳性。胸片正常, OT 试验 (+++), 脑脊液细胞数  $320 \times 10^6/L$ , 中性 0.4, 淋巴 0.6, 蛋白 (+), 诊断为结核性脑膜炎。

125. 该患儿强化治疗应选择

- A. 异烟肼+利福平+链霉素+强的松
- B. 异烟肼+利福平+乙胺丁醇+强的松
- C. 异烟肼+利福平+吡嗪酰胺+强的松
- D. 异烟肼+链霉素+吡嗪酰胺+强的松
- E. 异烟肼+利福平+链霉素+吡嗪酰胺+强的松

126. 应用强的松的目的不是为了

- A. 抑制炎症渗出
- B. 减轻脑水肿
- C. 降低颅内压
- D. 防止脑室孔道及颅底部纤维粘连
- E. 减轻症状, 缩短病程

127. 该患儿应用强的松的总疗程是

- A. 4~6 周
- B. 4~8 周
- C. 6~8 周
- D. 8~12 周
- E. 12~16 周

(128~130 题共用题干)

男性, 40 岁, 发现先天性室间隔缺损 20 年, 1 个月前拔牙后感心悸、乏力至今, 查体: 睑结膜苍白, 可见出血点, 心率 96 次/分, 律齐, 双肺呼吸音清, 脾肋下可及。

128. 首选治疗措施为使用

- A. 铁剂
- B. 洋地黄类药物
- C. 抗心律失常药物
- D. 抗生素类药物
- E. 血管紧张素转换酶抑制剂

129. 该患者最可能的诊断为

- A. 心肌炎
- B. 左心衰竭
- C. 心包炎
- D. 感染性心内膜炎
- E. 心房颤动

130. 最有助于确诊的检查为

- A. 血培养
- B. 胸部 X 线
- C. 心电图

#### 四、B 型题

(133~135 共用选项题)

- A. 肺炎球菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 立克次体
- D. 表皮葡萄球菌
- E. 草绿色链球菌

133. 急性感染性心内膜炎

134. 亚急性感染性心内膜炎

D. 血心肌酶浓度

E. 超声心动图

(131~132 题共用题干)

1 岁男孩。母乳喂养, 近 3 个月来面色渐苍黄, 间断腹泻, 原可站立, 现坐不稳, 手足常颤抖。体检面色苍黄, 略浮肿, 表情呆滞, 血红蛋白 80g/L, 红细胞  $2.0 \times 10^{12}/L$ , 白细胞  $6.0 \times 10^9/L$ 。

131. 确诊需做的检查是

- A. 脑 CT
- B. 脑电图检查
- C. 血清铁检查
- D. 血清维生素 B<sub>12</sub>、叶酸测定
- E. 血清钙、磷、碱性磷酸酶测定

132. 该患儿可能的诊断是

- A. 大脑发育不全
- B. 营养性缺铁性贫血
- C. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症
- D. 维生素 D 缺乏性佝偻病
- E. 营养性巨幼红细胞性贫血

135. 人工瓣膜性心内膜炎早期

(136~139 共用选项题)

- A. 冠状动脉及心室造影检查
- B. 放射性核素心肌灌注显像
- C. 动态心电图监测
- D. 心电图运动试验
- E. 漂浮导管检查

136. 患者发作性心悸伴头晕, 为明确诊断,

应选用的检查措施是

137. 患者冠心病史 10 年, 为明确冠状动脉病变的位置及程度应选用的检查措施是

138. 心肌梗死后, 为明确存活心肌状况, 应选用的检查措施是

139. 对左心功能判断最有价值的是

(140~141 共用选项题)

- A. 胎方位
- B. 胎先露
- C. 骨盆轴
- D. 胎姿势
- E. 胎产式

140. 胎体纵轴与母体纵轴的关系

141. 胎儿先露部的指示点与母体骨盆关系

(142~144 共用选项题)

- A.  $M_1$  型
- B. 急性早幼粒细胞白血病
- C. 急性单核细胞白血病
- D. 急性粒细胞白血病
- E. 急性淋巴细胞白血病

142. 常可导致牙龈肿胀、口腔溃疡的是

143. 可导致弥漫性血管内凝血(DIC)的是

144. 易导致肝脾淋巴结明显肿大的是

(145~146 共用选项题)

- A. 24 小时尿糖定量测定
- B. 餐后 2 小时血糖测定
- C. 糖化血红蛋白测定
- D. 口服葡萄糖耐量试验
- E. 胰岛素释放试验

145. 对糖尿病诊断首选

146. 对糖尿病分型首选

(147~148 共用选项题)

- A. 唐氏综合征(21-三体综合征)
- B. 软骨发育不良
- C. 先天性甲状腺功能减低症
- D. 佝偻病
- E. 苯丙酮尿症

147. 智能低下, 四肢短, 手指粗短, 通贯手, 免疫功能低下, 白血病发生率增高多见于

148. 患儿为过期产, 头大, 皮肤粗糙, 面色苍黄, 表情淡漠, 常有脐疝多见于

(149~150 共用选项题)

- A. 脊椎呈竹节样
- B. 骨膜反应呈三角形
- C. 骨端膨胀呈肥皂泡样
- D. 长管骨干骺区有骨性疣状突起
- E. 有死骨形成并有包壳

149. 骨巨细胞瘤

150. 强直性脊柱炎