

护士执业资格考试必备知识点（4）

必备知识点 76：小量血胸（ $<500\text{ml}$ ）、中等量血胸（ $500\sim 1500\text{ml}$ ）和大量血胸（ $>1500\text{ml}$ ）。

必备知识点 77：麻疹患者传染时间段：出疹前 5 天至出疹后 5 天均有传染性，如合并肺炎，传染性可延长至出疹后 10 天。

必备知识点 78：甲类：为强制管理的传染病，共 2 种（鼠疫、霍乱），要求发现后 2 小时内上报。

必备知识点 79：乙脑患儿特异性 IgM 抗体在病后 3~4 日即可出现，2 周达到高峰，有早期诊断价值。

必备知识点 80：烈日暴晒下 2~7 小时或煮沸 100°C 5 分钟结核菌能被杀死，70%乙醇接触 2 分钟，亦可杀死结核菌。

必备知识点 81：胎盘剥离征象：子宫体变硬呈球形，子宫底升高达脐上；阴道突然流出大量血液；阴道口外露的一段脐带自行延长；用手掌尺侧在产妇耻骨联合上方轻压子宫下段，子宫体上升而外露的脐带不再回缩。

必备知识点 82：难免流产：阴道流血量增多，阵发性腹痛加重。子宫大小与停经周数相符或略小，宫颈口已扩张，但组织尚未排出。晚期难免流产可见胚胎组织或胎囊堵于宫口。

必备知识点 83：早产是指妊娠满 28 周至不满 37 足周之间分娩者。早产儿出生体重多小于 2500g。

必备知识点 84：异位妊娠中，输卵管妊娠最为常见。输卵管炎症是最主要原因。

必备知识点 85：妊娠 28 周后，胎盘附着于子宫下段，甚至胎盘下缘达到或覆盖宫颈内口，其位置低于胎儿先露部，称为前置胎盘。

必备知识点 86：先兆子宫破裂的四大主要临床表现是：子宫形成病理性缩复环、下腹部压痛、胎心率改变及血尿出现。

必备知识点 87：正常足月儿：37 周 \leq 胎龄 $<$ 42 周，2500g \leq 出生体重 \leq 4000g，无畸形或疾病的活产婴儿。

必备知识点 88：低出生体重儿：出生体重 $<$ 2500g 的新生儿。

必备知识点 89：新生儿沐浴时，室温在 $26\sim 28^{\circ}\text{C}$ 以上，关闭门窗，水温 $39\sim 41^{\circ}\text{C}$ 左右，先放凉水，后放热水。

必备知识点 90：大部分新生儿在生后 2~3 日出现黄疸，4~5 日最重。足月儿 2 周内，早产儿可延迟到 3~4 周消退，一般情况良好，食欲正常。

必备知识点 91：新生儿脐炎轻者可用安尔碘或 0.5%碘伏及 75%酒精，每日 2~3 次；重度感染者，遵医嘱应用抗生素。

必备知识点 92：全血血糖 $<$ 2.2mmol/L（40mg/dl）应诊断为新生儿低血糖，而不考虑出生体重、胎龄和日龄。

必备知识点 93：患儿发生惊厥，遵医嘱静脉缓慢注射或滴注稀释的 10%葡萄糖酸钙。如心率低于 80 次/分，应暂停注射。

必备知识点 94：成人体表面积中国九分法

部位	成人各部位面积（%）	小儿各部位面积（%）
头颈	$9\times 1=9$ （发部 3 面部 3 颈部 3）	$9+$ （12-年龄）
双上肢	$9\times 2=18$ （双手 5 双前臂 6 双上臂 7）	9×2

躯干	$9 \times 3 = 27$ (腹侧 13 背侧 13 会阴 1)	9×3
双下肢	$9 \times 5 + 1 = 46$ (双臀 5 双大腿 21 双小腿 13 双足 7)	$46 - (12 - \text{年龄})$

必备知识点 95: 第一个 24 小时补液量 = 体重 (kg) \times 烧伤面积 (II ~ III 度烧伤) $\times 1.5\text{ml}$ (成人 1.5ml, 小儿 1.8ml, 婴儿 2ml) 加每日生理需水量 2000ml, 即为补液总量。

必备知识点 96: 电解质和胶体溶液的比例一般为 2:1, 深度烧伤为 1:1, 伤后第二个 24 小时补液量为第一个 24 小时计算量的一半, 日需量不变。

必备知识点 97: 若破伤风毒素已与神经组织结合, 则难以起效, 故应尽早使用破伤风抗毒素。用药前应作过敏试验。

必备知识点 98: 破伤风患者的治疗、护理等各项操作尽量集中, 可在使用镇静剂 30 分钟内进行, 以免刺激打扰病人而引起抽搐。

必备知识点 99: 预防破伤风最有效、最可靠的方法是注射 TAT 抗毒素, 一般伤后 12 小时内注射 1500U (1ml), 成人、儿童剂量相同, 如就医较晚或伤口污染严重剂量加倍, 必要时 2~3 天后可重复注射。

必备知识点 100: 手术治疗是胃癌的首选治疗方法; 化疗是最主要的辅助治疗方法。

