

【中医诊断学】

脾阳已绝的患者其唇的形态可见

A. 口唇糜烂

B. 唇干而裂

C. 人中满唇反

D. 唇内溃烂, 其色淡红

E. 人中短缩, 唇卷缩不能覆齿

学员提问: 为什么选 C?

答案与解析: 本题答案为 C。

唇干而裂: 为津液已伤, 见于外感【医学教育网原创】燥热伤津, 脾热或阴虚液亏。口唇糜烂: 多为脾胃积热上蒸所致。唇内溃烂, 其色淡红: 多为虚火上炎。人中满唇反: 为脾阳已绝。人中短缩, 唇卷缩不能覆齿: 为脾阴已绝。

故本题答案选 C。

【诊断学基础】

二尖瓣狭窄时的听诊特点是

A. 心尖部收缩期吹风样杂音

B. 心尖部舒张期隆隆样杂音

C. 主动脉瓣区舒张期叹气样杂音

D. 胸骨左缘 3、4 肋间粗糙的收缩期杂音

E. 肺动脉瓣区舒张期杂音


学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案为 B。

二尖瓣狭窄时, 心尖部可闻及舒张中晚期隆隆样杂音, 呈递增型, 音调较低而局限, 左侧卧位呼气末时较清楚, 常伴有第一心音亢进、二尖瓣开放拍击音及舒张期震颤, 肺动脉瓣

第二心音亢进、分裂; 主动脉瓣关闭不全所致的【医学教育网原创】相对性二尖瓣狭窄的杂音, 称为奥-弗杂音 (Austin-Flint 杂音), 性质柔和, 不伴有第一心音亢进、开瓣音, 无震颤。

此题的正确选项是 B。



【中医儿科学】




诊断 3 月至 6 岁小儿贫血, 其末梢血血红蛋白值应

A. $<90\text{g/L}$



B. $<100\text{g/L}$



C. $<110\text{g/L}$



D. $<120\text{g/L}$

E. $<130\text{g/L}$

学员提问: 为什么选 C?



答案及解析: 本题答案为 C。

3 个月~6 岁血红蛋白 $<110\text{g/L}$, 6 岁以上血红蛋白 $<120\text{g/L}$ 。
故本题答案选 C。



【中医妇科学】



产后三急是指

A. 产后血晕、产后痉病、产后腹痛

B. 产后发热、产后大便难、产后郁冒

C. 产后小便不通、产后恶露不绝、产后小便淋痛

D. 产后呕吐、泄泻、盗汗

E. 产后冲心、冲肺、冲胃



学员提问: 为什么选 D?



答案及解析: 本题答案选 D。

产后三急: 产后诸病, 惟呕吐、盗汗、【医学教育网原创】泄泻为急, 三者并见必危。

故本题答案选 D。

【方剂学】

下列各项中, 不属于苏子降气汤组成药物的是

A. 前胡、甘草

B. 生姜、苏叶

C. 杏仁、白前

D. 半夏、厚朴

E. 当归、肉桂

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题选 C。

苏子降气汤的组成是紫苏子、半夏、川当归、【医学教育网原创】炙甘草、前胡、厚朴、肉桂、生姜、枣子、苏叶。

方歌: 苏子降气半夏归, 前胡桂朴草姜随; 上实下虚痰嗽喘, 或加沉香去肉桂。

故本题答案选 C。

医学教育网中医执业医师《答疑周刊》2019 年第 20 期 (PDF 版下载)