

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2019 年第 30 期

1. 【问题】不同类型的咳嗽所代表的疾病是什么？

【解答】

性质	干性咳嗽	多见于咽炎、上呼吸道炎症、肺炎等
	湿性咳嗽	慢支及支扩最常见
时间	夜间咳嗽明显	左心衰竭、肺结核
音色	嘶哑性咳嗽	声带发炎、喉炎、喉结核等
	金属音	纵隔肿瘤、支气管肿物
体位	变体位加剧	清晨或变动体位时加剧多见于慢支、支扩、肺脓肿

2. 【问题】胎儿宫内缺氧表现有哪些？

【解答】羊水混有胎粪呈黄绿色，表示胎儿宫内缺氧，应积极处理。

胎儿窘迫是指胎儿在宫内有缺氧征象，危及胎儿健康和生命者。胎儿窘迫的主要表现为胎心率改变、胎动异常及羊水胎粪污染或羊水过少，严重者胎动消失。

3. 【问题】直腿抬高试验阳性，患者下肢抬高的度数是

- A. 60 度内
- B. 65 度内
- C. 70 度内
- D. 75 度内
- E. 80 度内

【解答】选择 A。当抬高至 60° 以内即出现放射痛，为直腿抬高试验阳性，是由于神经根受压或粘连使移动范围减小或消失，坐骨神经受牵拉所致。

4. 【问题】婴儿生理性流涎常发生于什么时候？

【解答】应该是 3~4 个月。问的是开始的时间。新生儿涎腺发育不成熟，3~4 个月时唾液分泌逐渐增多，5~6 个月时更为显著，但婴儿口底浅，尚不能及时吞咽所有分泌的唾液，故常出现生理性流涎。

5. 【问题】肺癌术后采取哪种体位？

【解答】(1) 肺叶切除者，采用平卧或左右侧卧位。(2) 肺节切除术或楔形切除术者，应避

免手术侧卧位，最好选择健侧卧位，以促进患侧肺组织扩张。(3) 全肺切除术者，避免过度侧卧，可采取 1/4 侧卧位，以预防纵隔移位和压迫健侧肺而导致呼吸循环功能障碍。

