

【常见病与多发病: 泌尿与生殖系统】

尿毒症患者发生纤维囊性骨炎的主要原因是

- A. 尿钙排泄增多
- B. 继发性甲状旁腺功能亢进
- C. 尿磷排泄减少
- D. 营养不良和低蛋白血症
- E. 活性维生素 D 合成障碍

【正确答案】 B

【答案解析】 纤维囊性骨炎主要由于 PTH 过高引起, 其破骨细胞过度活跃, 引起骨盐溶化, 骨质重吸收增加, 骨的胶原基质破坏, 而代以纤维组织, 形成纤维囊性骨炎, 易发生肋骨骨折。

【八纲辨证】

表证与里证最主要的鉴别点是

- A. 寒热是否并见
- B. 是否有汗
- C. 舌苔是黄是白
- D. 是否头身疼痛
- E. 是否咳嗽有痰

【正确答案】 A

【答案解析】 恶寒发热是表证的特征性症状, 故可作为表里证的主要鉴别点。辨别表证与里证, 多依据病史的询问, 病证的寒热及舌苔、脉象的变化。一般地说, 新病、病程短者, 多见于表证; 久病、病程长者, 常见于里证。发热恶寒者, 为表证; 发热不恶寒或但寒不热者, 均属里证。表证舌苔常无变化, 或仅见于舌边尖红; 里证常有舌苔的异常表现, 脉浮者, 为表证; 脉沉者, 为里证。

【急诊与急救: 急、危、重症】

关于硝普钠治疗高血压急症描述错误的是

- A. 连续使用不宜超过 3 天
- B. 常用剂量 $3\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$
- C. 最大剂量不超过 $10\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$
- D. 不良反应为心动过速、恶性、呕吐、肌颤
- E. 以上均不正确

【正确答案】 E

【答案解析】 高血压急症控制血压首选使用静脉降压药物。硝普钠初始剂量 $0.25\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$, 常用剂量 $3\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$, 极量 $10\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 。需避光使用, 药物滴注超过 6 小时应该重新配制液体; 连续使用不宜超过 3 天; 不良反应为心动过速、恶性、呕吐、肌颤。

【中成药应用】

桂枝茯苓丸的主治不包括

- A. 妇人宿有癥块
- B. 血瘀经闭
- C. 行经腹痛
- D. 产后恶露不尽

E. 阴部瘙痒

【正确答案】E

【答案解析】桂枝茯苓丸【主治】妇人宿有癥块，或血瘀经闭，行经腹痛，以及产后恶露不尽等。



乡村全科助理医师考试:《答疑周刊》2019年第35期(word版下载)

【医学教育网版权所有,转载务必注明出处,违者将追究法律责任】

