

【儿童口腔医学】

患牙X线根尖片显示髓室壁边缘不规则, 根管中1/3呈椭圆形扩大, 可以诊断为

- A. 急性牙髓炎
- B. 慢性溃疡性牙髓炎
- C. 牙内吸收
- D. 牙髓钙化
- E. 慢性增生性牙髓炎

【正确答案】C

【答案解析】

牙内吸收的乳牙一般无自觉症状。常常是在X线片来鉴别。牙内吸收的典型表现为髓室壁出现边缘不规则的透射区, 根管内某部位呈圆形扩大, 大范围的吸收显示出穿通牙齿的透射区或窝状透射区。

【儿童口腔医学】

下列关于乳牙牙髓炎临床表现的特点叙述不正确的是

- A. 深龋感染是引起乳牙牙髓病的唯一原因
- B. 乳牙牙髓病以慢性炎症为主
- C. 临床上往往见到深龋洞
- D. 龋蚀未去净露髓, 往往说明牙髓已经感染
- E. 乳牙牙髓感染可伴发牙根吸收

【正确答案】A

【答案解析】

乳牙牙髓病临床表现特点: 乳牙牙髓病包括牙髓炎症、牙髓坏死和牙髓变性。乳牙牙髓病多由深龋感染引起, 为龋病的并发症。除龋病感染外, 牙齿外伤也可引起。

乳牙牙髓病临床症状不明显, 以慢性炎症为主, 急性炎症往往是慢性炎症急性发作引起。临床上往往见到深龋洞, 一定要进行深龋和慢性牙髓炎的鉴别。龋蚀未去净露髓, 往往说明牙髓已经感染。没有疼痛并不能说明牙髓没有感染, 一定要结合临床检查综合判断。乳牙牙髓感染可伴发牙根吸收, 感染波及根髓时可有叩痛。

【牙周病学】

龈上洁治术通常将全口牙分为若干区段洁治, 常见区段数为

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

E. 以上均可

【正确答案】 C

【答案解析】

在洁治过程中, 常将患者的全口牙分为上颌、下颌的前牙及后牙左右侧 6 个区段, 逐区进行洁治。

【牙周病学】

特用于后牙洁治的器械有

A. 直角洁治器

B. 锄形洁治器

C. 大镰刀形洁治器

D. 弯镰刀形洁治器

E. 以上均是

【正确答案】 D

【答案解析】

弯镰刀形洁治器, 成对, 其颈部形成一定角度, 使工作端适应后牙外形, 因其形似牛角形, 也称牛角形洁治器。特用于后牙洁治。