

一、最佳选择题

- 以下所列“全球药师追求的目标”中，最正确的是
 - 实施全程化药学服务
 - 及时保障临床药品供给
 - 提高药师在医疗体系中的地位
 - 实施以患者为中心的药学服务
 - 参与临床用药实践，促进合理用药
- “四查十对”的内容不包括
 - 查处方，对科别、姓名、年龄
 - 查药品，对药名、剂型、规格、数量
 - 查用药合理性，对临床诊断
 - 查配伍禁忌，对药品性状、用法用量
 - 查药物相互作用，对药品包装、使用方法
- 以下关于处方调剂资格的叙述正确的是
 - 具有中专（药学专业）以上学历即可从事处方调剂
 - 具有专科（药学或相关专业）以上学历即可从事处方调剂
 - 具有本科（药学或相关专业）以上学历即可从事处方调剂
 - 具有执业药师资格或取得药学专业技术职务任职资格者可从事处方调剂
 - 具有执业医师资格者从事处方调剂
- “每晚用药”的处方缩写为
 - qid.
 - qd.
 - qs.
 - pc.
 - qn.
- 以下用药，属于“禁忌证用药”的是
 - 黄体酮用于输尿管结石
 - 治疗感冒、咳嗽给予抗菌药
 - 无治疗指征盲目补钙

- D. 脂肪乳用于急性肝损伤、脂质肾病、脑卒中
- E. 联合毒性较大的药物，且未减量应用
6. 一位巨幼细胞贫血患儿肌内注射维生素 B₁₂ (0.5mg/ml)，一次适宜剂量为 25~50μg，应抽取的药液是
- A. 0.05ml~0.10ml
- B. 0.049ml~0.20ml
- C. 0.15ml~0.30ml
- D. 0.25ml~0.40ml
- E. 0.025ml~0.05ml
7. 下列“给药时间是依据生物钟规律而设定”的叙述中，最正确的是
- A. 睡前服用驱虫药
- B. 睡前服用血脂调节药
- C. 餐前服用氢氧化铝凝胶
- D. 餐后服用非甾体类抗炎药
- E. 早、晚餐中服用熊去氧胆酸
8. 使尿液呈碱性，可增加抗菌活性、减轻肾毒性，食醋则会加重其毒性作用的是
- A. 林可霉素类
- B. 氨基糖苷类
- C. 头孢菌素类
- D. 大环内酯类
- E. 碳青霉烯类
9. 氯化钾注射液的正确给药方法是
- A. 直接静脉注射
- B. 稀释后静脉滴注
- C. 直接肌内注射
- D. 稀释后肌内注射
- E. 以上都可以
10. 静脉滴注氯化钾注射液适宜浓度为

A. 0.2%~0.4%

B. 0.1%~0.3%

C. 0.1%~0.2%

D. 0.2%~0.5%

E. 0.3%~0.5%

11. 下列药品中，不宜选用氯化钠注射液溶解的是

A. 氟罗沙星

B. 头孢菌素

C. 苯妥英钠

D. 瑞替普酶

E. 阿昔洛韦

12. 乳汁中药物的浓度与下列哪种因素无关

A. 脂溶性

B. 药物剂型

C. 母体中的药物浓度

D. 药物与母体血浆蛋白结合率

E. 药物的酸碱度

13. 可能导致癫痫发作的药物是

A. 异烟肼

B. 白消安

C. 利血平

D. 氟哌啶醇

E. 甲氧氯普胺

14. 计算儿童用药剂量的方法中比较合理的是

A. 根据儿童年龄计算

B. 根据儿童体重计算

C. 根据儿童病情计算

D. 根据体表面积计算

E. 根据成人剂量折算

15. 用体重计算年长儿童的剂量时，一般应选择
- A. 剂量的下限
 - B. 剂量的上限
 - C. 剂量的 $1/2$
 - D. 剂量的 $1/3$
 - E. 剂量的 $2/3$
16. 肝病患者慎用的药物，其中是由于导致剂量依赖性肝细胞坏死的药物是
- A. 异烟肼
 - B. 对氨基水杨酸
 - C. 对乙酰氨基酚
 - D. 利尿药
 - E. 可卡因
17. 以下有关“循证医学的证据分级”的叙述中，正确的是
- A. A 级为不确定的结论
 - B. B 级为 V 级临床研究的结论或任何级别多个研究有矛盾或不确定的结论
 - C. C 级为 IV 级临床研究的结论或 II、III 级临床研究的推论
 - D. D 级为结果一致的 II、III 级临床研究结论或 I 级临床研究的推论
 - E. E 级为结果一致的 I 级临床研究结论
18. 出现粪便显黑色，有光泽，且粪隐血呈阳性症状时，首先考虑的疾病是
- A. 阿米巴痢疾
 - B. 过敏性肠炎
 - C. 痔疮，肛裂
 - D. 胃、十二指肠溃疡伴出血
 - E. 抗生素相关性腹泻
19. 缓泻药中，可单独使用，又可与山梨醇或甘油配伍使用的非处方药是
- A. 乳果糖
 - B. 比沙可啶
 - C. 硫酸镁
 - D. 莫沙必利

- E. 酚酞
20. 属于治疗寻常痤疮的非处方药的是
- A. 米诺环素
- B. 维胺酯
- C. 异维 A 酸
- D. 酞丁安
- E. 过氧化苯甲酰
21. 治疗发热成人服对乙酰氨基酚，每隔 4~6 小时重复用药 1 次；1 日用量不宜超过
- A. 2.0g
- B. 3.0g
- C. 4.0g
- D. 4.5g
- E. 5.0g
22. 具有球后视神经炎不良反应的药物是
- A. 异烟肼
- B. 利福平
- C. 链霉素
- D. 乙胺丁醇
- E. 吡嗪酰胺
23. 关于单纯性收缩期高血压正确的是
- A. 收缩压 \geq 140 舒张压 $<$ 90
- B. 收缩压 $>$ 140 舒张压 $<$ 90
- C. 收缩压 $>$ 130 舒张压 $<$ 100
- D. 收缩压 $>$ 130 舒张压 $<$ 90
- E. 收缩压 \geq 130 舒张压 $<$ 90
24. 抑制脂肪酸氧化和增加葡萄糖代谢，提高氧的利用效率而治疗心肌缺血的药物是
- A. 硝酸甘油

- B. 依那普利
- C. 辛伐他汀
- D. 硝苯地平
- E. 曲美他嗪
25. 对于慢性房颤控制心室率，一般用地高辛的剂量为
- A. 0.2~0.4mg/d
- B. 0.125~0.25mg/d
- C. 5~10mg/d
- D. 3~7mg/kg
- E. 75~150mg/d
26. 原发性蛛网膜下腔出血的最常见病因是
- A. 颅内动脉瘤
- B. 脑血管畸形
- C. 高血压
- D. 动脉硬化
- E. 动脉炎
27. 下列关于脑梗死急性期药物治疗的说法，正确的是
- A. 急性缺血性卒中溶栓治疗的时间窗是 12h
- B. 脱水治疗使用甘露醇的疗程为 3~5d
- C. 收缩压 > 150mmHg 的患者不得进行溶栓治疗
- D. 溶栓后 24h 内不主张使用抗凝治疗
- E. 阿司匹林等抗血小板药物应在溶栓后 24h 内开始使用
28. 伴有焦虑症的抑郁症患者宜选用
- A. 地西洋
- B. 帕罗西汀
- C. 普萘洛尔
- D. 氯苯那敏
- E. 曲唑酮+吗氯贝胺
29. 匹维溴铵治疗胆石症的作用机制是

- A. 可增加胆汁酸分泌
- B. 可溶解胆固醇结石
- C. 拮抗钾离子，降低肌张力
- D. 阻断 M 受体，松弛胆道平滑肌
- E. 拮抗钙离子，解除消化道平滑肌痉挛
30. 秋水仙碱治疗痛风容易蓄积中毒，严重中毒的前驱症状是
- A. 疼痛
- B. 发热
- C. 皮疹
- D. 骨髓抑制
- E. 胃肠道反应
31. 未开启的胰岛素注射剂的保存条件为
- A. $\leq 0^{\circ}\text{C}$
- B. $0^{\circ}\text{C} \sim 2^{\circ}\text{C}$
- C. $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$
- D. $10^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$
- E. 不超过 25°C
32. 骨质疏松症的临床表现不正确的是
- A. 指（趾）甲变软、变脆和易裂
- B. 脊柱变形
- C. 下肢肌肉痉挛
- D. 易发生病理性骨折
- E. 胸、背、腰、膝等部位疼痛，其中下肢痛最多见
33. 丙硫氧嘧啶治疗甲状腺功能亢进时，必须监测的实验室指标是
- A. 血肌酐计数
- B. 血尿素氮计数
- C. 血红蛋白计数
- D. 红细胞计数
- E. 白细胞计数

34. 急性膀胱炎的短程疗法药物不包括

- A. 喹诺酮类
- B. 磺胺类
- C. 半合成青霉素
- D. 大环内酯类
- E. 头孢菌素类

35. 可促进铁剂吸收的不包括

- A. 氨基酸
- B. 果糖
- C. 维生素 C
- D. 肉类
- E. 牛奶

36. 属于作用于 DNA 化学结构的抗肿瘤药物是

- A. 甲氨蝶呤
- B. 氟尿嘧啶
- C. 丝裂霉素
- D. 放线菌素 D
- E. 阿克拉霉素

37. 骨性关节炎治疗的关键为

- A. 早期预防
- B. 遵医嘱用药
- C. 早期就诊
- D. 减少运动
- E. 避免不良姿势

38. 首选用于乙肝治疗的核苷酸类药物是

- A. 聚乙二醇干扰素
- B. 阿德福韦
- C. 替比夫定
- D. 拉米夫定

- E. 替诺福韦
39. 哺乳期避孕首选
- A. 复方短效口服避孕药
- B. 长效避孕药
- C. 避孕栓
- D. 阴茎套
- E. 避孕薄膜
40. 三环类抗抑郁药的致死量通常高于
- A. 1g
- B. 1.5g
- C. 2g
- D. 2.5g
- E. 3g

二、配伍选择题

[41~43] (处方颜色)

- A. 白色
- B. 淡黄色
- C. 淡绿色
- D. 淡红色
- E. 淡蓝色
41. 第二类精神药品处方印刷用纸为
42. 急诊处方印刷用纸为
43. 麻醉药品处方印刷用纸为
- [44~45] A. 超适应证给药
- B. 有禁忌证用药
- C. 不合理联合用药
- D. 撒网式给药
- E. 过度治疗用药
44. 脂肪乳用于脂质肾病患者，属于

45. 二甲双胍用于非 2 型糖尿病减肥

[46~48] (固有性质不稳定的药物)

- A. 胃蛋白酶
- B. 阿朴吗啡、水杨酸钠
- C. 牛痘疫苗
- D. 青霉素类、头孢菌素类
- E. 硫酸阿托品、硫酸可待因

46. 容易水解的药物是

47. 容易氧化的药物是

48. 容易引湿的药物是

[49~51] (联合用药作用相加或增加疗效的机制)

- A. 硫酸阿托品联用解磷定解除有机磷中毒
- B. 维生素 C 与铁剂同服
- C. 亚胺培南-西司他丁复方制剂
- D. 磷霉素联用其他抗菌药物
- E. 普萘洛尔联用硝苯地平降血压

49. 作用不同的靶位，产生协同作用是

50. 促进机体的利用的联合用药是

51. 延缓或降低抗药性，以增加疗效的是

[52~54] A. 宜少饮水

B. 宜多饮水

C. 忌用热水送服

D. 禁吸烟

E. 宜多食脂肪

52. 服用磺胺甲噁唑时

53. 服用抗利尿药时

54. 服用小儿麻痹症糖丸时

[55~56] A. 青霉素

B. 两性霉素 B

C. 维生素 K

D. 盐酸万古霉素

E. 硫酸庆大霉素

55. 在配制静脉输液时，不宜用葡萄糖注射液溶解的药品是

56. 在配制静脉输液时，不宜用氯化钠注射液溶解的药品是

[57~60] A. 产生有利的药物相互作用

B. 抑制乙醛脱氢酶

C. 造成听神经和肾功能不可逆损害

D. 抑制代谢反应，生物利用度增加

E. 抑制肾肽酶

57. 利血平+氢氯噻嗪

58. 乙醇+呋喃唑酮

59. 葡萄柚汁+非洛地平

60. 亚胺培南+西司他汀钠

[61~64] A. 氯霉素

B. 阿奇霉素

C. 米诺环素

D. 庆大霉素

E. 左氧氟沙星

61. 牙齿黄染及牙釉质发育不全

62. 动物承重关节发育不良

63. 耳蜗神经损伤及耳毒性

64. 因体内肝酶不足，可引起灰婴综合征

[65~66] A. 右美沙芬

B. 咖啡因

C. 双氯芬酸

D. 氯苯那敏

E. 伪麻黄碱

65. 收缩鼻腔黏膜血管，减轻鼻充血

66. 对以打喷嚏、流鼻涕为主的患者，有一定镇静作用

[67~69]（治疗发热的药物选择）

- A. 布洛芬
- B. 贝诺酯
- C. 阿司匹林
- D. 对乙酰氨基酚
- E. 20%安乃近溶液

67. 适于 5 岁以下儿童高热时紧急退热的是

68. 晚期妊娠使用可使孕期延长，孕妇及哺乳期妇女不宜用的是

69. 尤其适于老年人和儿童退热的是

[70~72]关于腹泻的处方药治疗

- A. 氧氟沙星
- B. 阿昔洛韦
- C. 硝苯地平
- D. 山莨菪碱片
- E. 洛哌丁胺

70. 病毒性腹泻可使用

71. 非感染性的急慢性腹泻首选

72. 腹泻伴腹痛剧烈时可服

[73~74]下列关于急性结膜炎的处方药治疗

- A. 金霉素眼膏
- B. 0.1%酞丁安
- C. 多黏菌素 B、磺苄西林滴眼剂
- D. 1%强的松滴眼剂
- E. 两性霉素 B、克霉唑滴眼剂

73. 铜绿假单胞性结膜炎常用

74. 对真菌性角膜炎宜用

[75~76] A. 赛庚啶

B. 异丙嗪

C. 依巴斯汀

D. 氯苯那敏

E. 维生素 C

75. 有引起尖端扭转型室速或 Q-T 间期延长的危险的抗过敏药是

76. 长期服用明显能促进食欲和体重增加的抗过敏药是

[77~78] (抗慢性阻塞性肺病药的用药监护)

A. 氨茶碱

B. 多索茶碱

C. 色甘氨酸

D. 二羟丙茶碱

E. 茶碱缓释片

77. 禁用于急性心肌梗死, 并不得与其他黄嘌呤药同时使用的是

78. 禁用于未经控制的惊厥性疾病患者的是

[79~81] A. 异丙托溴铵气雾剂

B. 孟鲁司特钠咀嚼片

C. 茶碱片

D. 沙丁胺醇气雾剂

E. 倍氯米松吸入剂

79. 尤其适用于阿司匹林哮喘、运动型哮喘治疗的药物是

80. 与西咪替丁有相互作用, 合并使用时应做血药浓度监测的药物是

81. 用药后应告知患者用清水漱口的药物是

[82~83] A. 维拉帕米

B. 哌唑嗪

C. 多沙唑嗪

D. 卡托普利

E. 硝酸甘油

82. 有双侧肾动脉狭窄的高血压患者禁用

83. 合并 3 度房室传导阻滞的高血压患者不宜选用

[84~85] (治疗消化性溃疡的胃黏膜保护剂)

- A. 氢氧化铝
- B. 雷贝拉唑
- C. 米索前列醇
- D. 碳酸镁
- E. 瑞巴派特

84. 传统的抗酸剂, 既可中和胃酸, 又具有黏膜保护作用的是

85. 属于前列腺素类似物的是

[86~87] (毒物及药物中毒解救)

- A. 水银中毒
- B. 吗啡中毒
- C. 有机磷中毒
- D. 氰化物中毒
- E. 硫酸铜中毒

86. 二巯丙醇用于解救

87. 烯丙吗啡用于解救

[88~90] (在乳汁中排泄的药物)

- A. 呈弱碱性
- B. 呈弱酸性
- C. 脂溶性高
- D. 在脂肪与水中都有一定溶解度
- E. 血浆蛋白结合率高

88. 华法林较少进入乳汁的机制是

89. 青霉素较难在乳汁中出现的机制是

90. 地西洋可分布在乳汁中的机制是

三、综合分析选择题

[91~93] 用药咨询是药师应用所掌握的药学知识和药品信息，承接公众对药物治疗和合理用药的咨询服务，对临床合理用药有关键性作用。根据药物咨询对象的不同，可以将其分为患者、医师、护士和公众的用药咨询。

91. 下列药师承接的用药咨询内容中，多由患者提出的是

- A. 自我保健
- B. 新药信息
- C. 药品适应证
- D. 治疗药物监测
- E. 注射剂配制溶媒、浓度

92. 药师应告知医师“血药浓度监测是安全实施该治疗的重要措施”的事例是

- A. 利巴韦林可致畸与肿瘤
- B. 阿昔洛韦可致急性肾衰竭
- C. 替加色罗存在心绞痛风险
- D. 地高辛用于肾功不全患者
- E. 含钆造影剂用于肾功不全者

93. 药师应告知护士“静脉滴注两性霉素B的时间应该控制6小时以上”的机制是避免

- A. 引发静脉炎
- B. 出现过敏反应
- C. 出现急性肾衰竭
- D. 出现红人综合征
- E. 引起心室颤动和心跳骤停

[94~96] 药品不良反应按照程度分为轻度、中度、重度三级。

94. 轻度药品不良反应是指

- A. 没有临床症状，无需治疗
- B. 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无需治疗
- C. 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害
- D. 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害
- E. 指重要器官或系统功能有严重损害，缩短或危及生命

95. 中度药品不良反应是指

- A. 没有临床症状，无需治疗
- B. 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无需治疗
- C. 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害
- D. 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害
- E. 指重要器官或系统功能有严重损害，缩短或危及生命

96. 重度药品不良反应是指

- A. 没有临床症状，无需治疗
- B. 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无需治疗
- C. 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害
- D. 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害
- E. 指重要器官或系统功能有严重损害，缩短或危及生命

[97~100] 美国国家用药错误报告及预防协调委员会制定的分级标准，即根据用药错误发生程度和发生后可能造成危害的程度，将用药错误分为 A 至 I 九级。

97. 患者已使用，需要监测差错对患者的后果，并根据后果判断是否需要采取措施预防和减少伤害的情况属于

- A. A 级
- B. D 级
- C. F 级
- D. G 级
- E. H 级

98. 差错导致患者生命垂危，需要应用维持生命的措施的情况属于

- A. A 级
- B. D 级
- C. F 级
- D. G 级
- E. H 级

99. 差错导致患者永久性伤害的情况属于

- A. A 级
- B. D 级
- C. F 级
- D. G 级
- E. H 级

100. 差错对患者的伤害可导致患者住院或延长住院时间的情况属于

- A. E 级
- B. F 级
- C. G 级
- D. H 级
- E. I 级

[101~102] 患者，男，33 岁。主诉：口腔反复溃疡 8 年，近 4 天溃疡复发，舌尖小溃疡，灼痛明显，影响说话、进食，口内唾液黏稠。

诊断：复发性口腔溃疡（轻型）；

治疗：局部使用冰硼咽喉散，吹敷患处，一日 2~3 次；

补充维生素，一日 3 次；

左旋咪唑一次 50mg，一日 3 次，每周服用 2 次。

101. 对于反复发作的口腔溃疡患者还可以使用的药物是

- A. 甲硝唑含漱液
- B. 地塞米松粘贴片
- C. 达克罗宁液
- D. 口服泼尼松
- E. 10%硝酸银

102. 口服维生素可维持正常的代谢功能，促进病损愈合，患者补充的是下列哪种维生素

- A. 维生素 A 和维生素 C
- B. 维生素 B 和维生素 E
- C. 维生素 K 和维生素 E
- D. 维生素 B 和维生素 C

E. 维生素 A 和维生素 D

[103~104] 患者病情简介：女性患者，30 岁，上呼吸道感染，伴有喷嚏、流泪、鼻塞、流涕、并有咳嗽，但无痰，体温 38.9℃，诊断为感冒。

用药：复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊，1 粒 bid 口服。

103. 根据患者体温可知，患者发热，若选用治疗药物，不可使用的是

- A. 阿司匹林
- B. 对乙酰氨基酚
- C. 谷维素
- D. 贝诺酯
- E. 布洛芬

104. 患者用药中，可以缓解其喷嚏、流泪、流涕等卡他症状，是由于复方药物中含有

- A. 伪麻黄碱
- B. 右美沙芬
- C. 对乙酰氨基酚
- D. 阿司匹林
- E. 布洛芬

[105~107] 患者，女性，42 岁，高血压 5 年，血压最高达 160/110 mmHg。近两年服用珍菊降压片 1 粒/次，3 次/日；吲达帕胺 2.5mg/次，1 次/日。半年前发现双下肢乏力并反复痛风来医院就诊。检查发现：血钾 3.0mmol/L；尿酸 870 μ mol/L。建议患者停用珍菊降压片，加用贝那普利 10mg/次，1 次/日。两周后患者血压降至 135/85 mmHg，血钾 3.8mmol/L，痛风未再发作。

105. 停用珍菊降压片的原因是珍菊降压片中含有

- A. 氢氯噻嗪
- B. 吲达帕胺
- C. 比索洛尔
- D. 卡托普利
- E. 可乐定

106. 贝那普利属于

- A. 血管紧张素转换酶抑制剂
- B. 血管紧张素 II 受体拮抗剂
- C. 利尿剂
- D. 钙通道阻滞剂
- E. 醛固酮受体拮抗剂

107. 换药初期，患者最可能发现的不良反应是

- A. 血钾降低
- B. 血尿酸升高
- C. 支气管痉挛
- D. 直立性低血压
- E. 持续性干咳

[108~110] 患者 25 岁，于 3 年前开始有发作性意识丧失，全身抽搐，持续 5~6 分钟恢复，发作当时面色青紫，有时伴尿失禁，舌咬伤，有时夜间睡眠中发作。体检及各项检查均正常。患者叔父有与患者相同的病史，该患者诊断为全面强直-阵挛发作。

108. 患者癫痫发作时，以下措施错误的是

- A. 尽量让其慢慢躺下，以免跌伤
- B. 抽搐后呼吸未能及时恢复应做人工呼吸
- C. 趁患者齿唇未紧闭之前，把缠有纱布的压舌板垫在上下牙列之间
- D. 患者抽搐停止进入昏睡期后，应让患者面朝上保持仰卧位
- E. 保持周围安静

109. 患者癫痫发作入院后宜采用的给药方式为

- A. 口服给药
- B. 直肠给药
- C. 肌肉给药
- D. 静脉给药
- E. 喷雾给药

110. 癫痫持续状态时可使用的治疗药物是

- A. 地西洋

- B. 卡马西平
- C. 丙戊酸钠
- D. 苯巴比妥
- E. 托吡酯

四、多项选择题

111. 与患者的沟通技巧包括

- A. 开放式提问
- B. 认真聆听
- C. 尽量使用专业术语
- D. 注意掌握时间
- E. 注意观察对方的表情变化

112. 处方的用药适宜性的审核包括

- A. 审核药物的剂量、用法
- B. 审核药物的剂型和给药途径
- C. 审核处方用药与临床诊断的相符性
- D. 审核处方是否有重复给药现象
- E. 审核处方中对规定必须做皮试的药物, 处方医师是否注明过敏试验及结果的判定

113. 以下叙述中, 处方审核结果可判为超常处方的是

- A. 无适应证用药
- B. 无正当理由开具高价药
- C. 无正当理由超说明书用药
- D. 未按照抗菌药物临床应用管理规定开具抗菌药物
- E. 无正当理由为同一患者开具 2 种以上药理作用机制相同的药物

114. 兴奋剂包括的种类有

- A. 精神刺激剂
- B. 具有蛋白同化作用的药物
- C. 药品类易制毒化学品
- D. β -受体阻断剂与利尿剂

E. 肽激素类

115. 以下药品中，由权威性文献规定应该做皮肤敏感试验的是

- A. 链霉素注射液
- B. 头孢菌素注射液
- C. 甲氧西林钠注射液
- D. 胰蛋白酶
- E. 磷酸组胺注射液

116. 宜在餐前服用的药物包括

- A. 多潘立酮
- B. 格列本脲
- C. 阿司匹林
- D. 噻氯匹定
- E. 氢氯噻嗪

117. 有关缓、控释制剂的叙述正确的是

- A. 所有的药物都可制成缓、控释制剂
- B. 药物的外文药名中如带有 SR、ER 时，则属于缓释制剂
- C. 缓、控释制剂一般应整片或整丸吞服
- D. 缓、控释制剂的服药时间宜固定
- E. 缓、控释制剂可以一日 3 次给药

118. 氟西汀与下列药物合用，容易引起 5-羟色胺综合征的是

- A. 异烟肼
- B. 司来吉兰
- C. 呋喃唑酮
- D. 酮康唑
- E. 克拉霉素

119. 可能引起驾驶员视力模糊或辨色困难的药物是

- A. 东莨菪碱
- B. 丙戊酸钠
- C. 硝酸甘油

D. 利培酮

E. 二氢麦角碱

120. 属于妊娠危险性B级的药物是

A. 青霉素

B. 美洛西林

C. 多黏菌素 B

D. 阿卡波糖

E. 红霉素

