

一、最佳选择题

(共 40 题, 每题 1 分。每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意)


1. 某女, 38 岁。自觉咽中不适, 如有物梗塞; 胸闷, 经前乳房胀痛; 舌苔白腻, 脉弦滑。辨证为痰气互结证。所谓“证”是指(B)

- A. 症状表现
- B. 病理概括
- C. 诊断方法
- D. 疾病名称
- E. 疾病过程

名称	范围	内容	举例
症	个别现象	疾病的外在表现, 即症状	鼻塞流涕、肢冷、肾阴
证	某一阶段	机体在疾病发展过程中某一阶段的病理概括, 包括部位、原因、性质、邪正关系	感冒、感冒滞
病	完整的全过程	有特定的致病因素, 发病规律和病理演变的异常病变过程。具有特定的症状和体征	

2. 某女, 50 岁。月经淋漓不断, 色淡质稀, 食少便溏, 畏寒肢冷, 少气懒言头晕乏力; 舌淡, 脉细弱。基于气的生理功能分析, 该病证属于(D)

- A. 推动作用失常
- B. 温煦作用失常
- C. 防御作用失常
- D. 固摄作用失常
- E. 气化作用失常




3.某男, 30岁。发热喜凉,面红目赤,伴有口臭, 牙龈肿痛,大便干燥,小便短赤, 舌红,苔黄,脉数。中医辨证是(A)

- A.实热
- B.虚热
- C.虚实错杂
- D.实寒
- E.里寒表热.

4.某男,49岁。虚烦失眠,心悸健忘,手足心热;头晕耳鸣,腰酸梦遗;舌红,无苔,脉细数。中医辨证是(C)

- A.心阴虚
- B.心火亢盛
- C.心肾不交
- D.心脾两虚
- E.肝肾阴虚



5.某男,28岁。突然发热,高热不退,周身酸痛,咽喉疼痛;舌红, 苔黄,脉浮数。自诉有多位同事出现类似症状。中医诊断是(E)

- A. 风寒感冒
- B. 风热感冒
- C. 暑湿感冒
- D. 体虚感冒
- E. 时行感冒

续表

辨证	症状	治法	方剂	中成药
时行感冒	突然发热, 高热不退, 甚则寒战, 周身酸痛, 无汗, 咳嗽, 口干, 咽喉疼痛, 伴明显全身症状, 呈流行性发作。舌红, 苔黄, 脉浮数	清热解毒	清瘟解毒丸	清开灵 (口服)
体虚感冒	发热, 恶寒较甚, 无汗, 头痛鼻塞, 身楚倦怠, 咳嗽, 咳痰无力。舌淡, 苔白, 脉浮无力	益气解表, 宣肺化痰	参苏饮	

6. 某男, 68岁。长期吸烟, 干咳3个月, 近日咳嗽加重, 午后咳甚, 少痰, 痰中带血, 颧红潮热, 五心烦热, 耳鸣; 舌红, 少苔, 脉细数。中医辨证是(D)

- A. 风寒犯肺
- B. 风热犯肺
- C. 燥邪伤肺
- D. 肺肾阴虚
- E. 痰热壅肺

续表


辨证	症状	治法	方剂	中成药
燥邪伤肺	干咳无痰, 或痰少而黏, 不易咳出, 或痰中带血, 并见鼻燥咽干。舌红少津, 脉细数	辛凉清润	桑杏汤	母宁嗽丸, 蜜炼川贝枇杷露
痰热壅肺	咳嗽气粗, 痰多黄稠, 烦热口渴, 舌红, 苔黄腻, 脉滑数	清热痰	清气化痰丸	复方胆川椒, 川贝枇杷露
肺肾阴虚	干咳少痰, 或痰中带血, 午后咳甚, 或伴五心烦热, 颧红, 耳鸣。舌红少苔, 脉细数	滋阴润肺	百合固金汤	清肺固本丸

7. 中药雷公藤制剂广泛用于类风湿关节炎、肾病综合征等疾病的治疗。国家药品不良反应监测中心病例报告显示, 雷公藤制剂可引起肝、肾、血液系统和生殖系统等损害。执业药师在进行雷公藤制剂用药指导时, 用药建议错误的是(D)

- A. 患者服用该类药物时应从最小剂量开始
- B. 严格控制用药剂量和疗程, 一般连续用药不宜超过 3 个月
- C. 心、肝、肾功能不全者禁用, 老年有严重心血管病者慎用
- D. 育龄期有孕育要求者, 用药时应严格控制剂量和疗程, 并密切监测不良反应
- E. 用药期间应定期随诊并注意检查血、尿常规, 加强心电图和肝肾功能的监测

8. 含有毒成分的中成药联合应用时, 应注意有毒成分的“叠加”, 以免引起不良反应。因药物组成含附子, 不宜与大活络丸联用的中成药是(A)

- A. 天麻丸
- B. 苏合香丸
- C. 天王补心丸
- D. 牛黄清心丸
- E. 牛黄醒消丸



9. 某女, 23 岁。风热感冒, 服用银翘解毒丸。为增强药物疗效, 服用时可使用药引。正确的药引和服用方法是(B)

- A. 焦三仙煎汤送服
- B. 鲜芦根煎汤送服
- C. 清茶送服
- D. 米汤送服
- E. 姜汤送服

2. 中成药的用法用量 *必考(必考)*

(1) 中成药的内服

药引	药引功效	中成药举例
黄酒	温通经络、活血散瘀	大活络丸、牛黄醒消丸、跌打丸
姜汤	散寒、温胃止呕	藿香正气丸、附子理中丸
淡盐水	引药入肾	六味地黄丸、大补阴丸
焦三仙煎汤	增强消导之功	至宝锭
鲜芦根煎汤	清热透表生津	银翘解毒丸
清茶	清热	川芎茶调散
米汤	保护胃气	四神丸、更衣丸

10. 某男, 38岁。因口腔溃疡、疼痛明显来医院就诊, 兼见口渴, 心烦, 小便短赤, 大便干结; 查体: 口腔黏膜多处溃疡, 基底覆以黄苔, 周围黏膜色红; 舌红, 苔黄腻, 脉数有力。宜选用的中成药是(C)

- A. 加味逍遥丸
- B. 当归龙荟丸
- C. 清胃黄连丸
- D. 连蒲双清片
- E. 口炎清颗粒



第07讲 积滞、厌食、便秘、口渴、咽喉肿痛

正保医学教育网 www.med66.com

口疮

辨证	症状	治法	方剂	中成药
心脾积热	口腔黏膜溃疡, 灼痛明显, 常因过食煎炒辛辣或寐少而发, 伴口渴心烦, 失眠, 溲短黄, 大便秘结; 检查见黏膜表面有黄白色假膜, 周边红肿。舌红, 苔黄或腻, 脉数有力	清心泻脾, 消肿止痛	凉膈散	内服清胃黄连片、万应胶囊、牛黄解毒丸(片、胶囊)、栀子金花丸、导赤丸、黄片; 外用口腔溃疡散、珠黄散、锡类散、桂林西瓜霜、复珠散

11. 国家药品不良反应监测中心病例报告显示, 莲必治注射液不良反应表现为急性肾功能损害、皮疹、疹、头晕、胃肠道反应、过敏样反应等, 并在药品不良反应信息通报中进行了相关报告。关于莲必治注射液相关用药指导的说法, 错误的是(B)


- A. 有肾脏疾患的患者应避免使用该药
- B. 老年人、儿童、哺乳期妇女禁用
- C. 应避免与氨基糖苷类等有毒性药物联合使用
- D. 严格掌握适应症, 加强对用药患者肾功能的监测



E. 如患者用药后出现腰痛、腰酸等, 应立即到医院就诊, 检查 肾功能情况

12. 某女, 57 岁。因上呼吸道感染, 给予 10%葡萄糖注射液 250ml, 加入注射用双黄连 36g 静脉滴注。约输入 150ml 时, 患者出现皮肤瘙痒, 继之全身出现红色皮疹、呼吸困难、大汗、血压 75/50mmHg, 立即停用注射用双黄连, 给予生命体征监护, 并经静脉推注地塞米松, 皮下注射肾上腺素 3 小时后症状逐渐消失。根据《药品不良反应报告和检测管理办法》要求, 报告该病例不良反应最迟应不超过 (B)

- A. 5 个工作日
- B. 15 个工作日
- C. 10 个工作日
- D. 20 个工作日
- E. 30 个工作日



13. 某男, 40 岁。3 年前头部曾受外伤, 经住院治疗症状改善。近 6 个月反复头痛, 部位固定在左颞部, 痛如锥刺: 舌紫暗, 苔薄白, 脉涩。宜选用的方剂是 (D)

- A. 羚角钩藤汤加減
- B. 川芎茶调散加減
- C. 补阳还五汤加減
- D. 通窍活血汤加減
- E. 桃仁承气汤加減

第03讲 泄泻、便秘、中风、头痛、眩晕、消渴

续表

辨证	症状	治法	方剂	中成药
瘀血阻络	头痛经久不愈, 痛处固定不移, 痛如锥刺, 或有头部外伤史。舌紫, 苔薄白, 脉细或细涩	祛瘀通络	通窍活血汤	通天口服液

14. 某男, 56岁。喘促日久, 动则喘甚, 舌淡, 苔薄, 辨证为肾不纳气, 给予金匮肾气丸治疗, 但久治不愈, 且见咽干烦躁, 医师决定加中号成药。宜与金匮肾气丸联用的中成药是 (C)

- A. 四君子丸
- B. 通宣理肺丸
- C. 生脉胶囊
- D. 小青龙剂
- E. 清肺化痰丸



第01讲 中药的合理应用 (一)

续表

配伍	配伍举例	作用
一种药物能够明显抑制或消除另一种中成药的偏性或副作用	舟车丸+四君子丸 金匮肾气丸+麦味地黄丸 (生脉散/参蛤散)	峻下而不伤正气 用于肾虚作喘久治不愈兼见咽干烦躁者, 防止金匮肾气丸伤阴, 降低副作用
部分疾病的治疗必须采用不同治疗方法	内服艾附暖宫丸, 外贴十香暖脐膏 内服六神丸, 外用冰硼散吹喉	用于妇女宫冷不孕。两药合用, 能温宫散寒, 奏养血调经、暖宫散寒之功 用于咽喉肿痛, 两者合用, 能清热解毒、消肿利咽之功

15. 某女, 25岁。妊娠7周, 近日脘腹胀满, 噯腐吞酸, 不欲饮食: 舌苔薄白. 脉滑。直选用的中成药是 (C)

- A. 清宁丸
- B. 开胸顺气丸
- C. 保和丸
- D. 槟榔四消丸
- E. 山楂化滞丸



续表

辨证	症状	治法	方剂	中成药
肾阴亏虚	尿频量多, 浊如膏脂, 腰酸膝软, 头晕耳鸣, 多梦遗精, 乏力肤燥, 舌红少苔, 脉细数	滋养肾阴	杞菊地黄丸	杞菊地黄丸
阴阳两虚	小便频数, 甚则饮一溲一, 咽干舌燥, 面容憔悴, 耳轮干枯, 腰膝酸软, 畏寒肢冷, 舌淡苔白乏津, 脉沉细无力	温阳滋肾	金匱肾气丸	

18. 某女, 31岁。每年春天皮肤起风团, 色鲜红, 灼, 热剧痒, 症状加重时伴有发热, 恶寒, 咽喉疼痛不适: 舌红, 苔薄黄, 脉浮数。宜选用的方剂是(D)

- A. 香薷饮加减
- B. 防风汤加减
- C. 杏苏散加减
- D. 消风散加减
- E. 银翘散加减

第05讲 疮疖、乳癖、疔疮、癰疽、痔瘡、跌打损伤

中医一证方 癰疹

辨证	症状	治法	方剂	中成药
胃肠湿热	风团大片色红, 瘙痒剧烈; 发疹同时伴脘腹疼痛, 恶心呕吐, 神疲纳呆, 大便秘结或泄泻。舌质红, 苔薄白或黄, 脉弦滑数	通腑泄热, 疏风解表	防风通圣散	防风通圣丸; 外用三黄洗剂或青油调敷
风热犯表	风团鲜红, 灼热剧痒, 遇热则剧, 得冷则减; 伴有发热, 恶寒, 咽喉肿痛。舌质红, 苔薄白或薄黄, 脉浮数	疏风清热, 解表止痒	消风散	消风止痒颗粒

19. 鞣质可分为缩合鞣质和可水解鞣质。研究表明, 缩合鞣质的毒性较低, 对肝脏无毒或只有轻度损害, 可水解鞣质的毒性较高, 长期大量应用可引起肝小叶中央坏死、脂肪肝、肝硬化。因含有大量可水解鞣质, 进入机体后几乎全部被分解成倍酸与焦酸, 极大量时可引起灶性肝细胞坏死的中药是(B)

- A. 川楝子
- B. 五倍子
- C. 苍耳子
- D. 黄药子
- E. 蓖麻子

20. 《神农本草经》是现存最早的本草学专著, 载药 365 种, 包括(C)


- A. 上品 120 种, 中品 125 种, 下品 120 种
- B. 上品 125 种, 中品 120 种, 下品 120 种
- C. 上品 120 种, 中品 120 种, 下品 125 种
- D. 上品 120 种, 中品 115 种, 下品 130 种
- E. 上品 115 种, 中品 130 种, 下品 120 种

21. 某女, 44 岁。与同事争吵后出现胃脘胀痛, 连及肋助, 暖气时作, 食欲不振, 嘈杂吞酸; 舌淡红, 苔薄白, 脉弦。宜选用的方剂是(B)

- A. 丹栀逍遥散加减
- B. 柴胡疏肝散加减
- C. 二陈汤加减
- D. 保和丸加减
- E. 良附丸加减


22. 中西药联用得当、合理, 相互为用, 可取长补短, 使疗效增强, 病程缩短, 药物的毒副作用减少。具有协同增效作用的中西药联用药组是(A)

- A. 四逆汤与地高辛
- B. 磁朱丸与诺氟沙星
- C. 急支糖浆与地高辛
- D. 参茸片与格列本脲
- E. 健胃消食片与红霉素



23. 中成药有很多剂型, 不同剂型采用的贮藏养护方法各不相同。一般而言, 应置于阴凉、干燥处, 并密闭贮藏、防止受潮的剂型是 (D)

- A. 软膏剂
- B. 酒剂
- C. 颗粒剂
- D. 胶剂
- E. 胶囊剂



24. 某男, 6岁。不思饮食, 腹满喜按, 神疲肢倦, 大便稀溏腥臭, 夹有不消化食物, 面色萎黄; 舌淡, 苔白, 脉濡细。宜选用的方剂是 (D)

- A. 保和丸加減
- B. 理中丸, 加減
- C. 枳术丸加減
- D. 健脾丸加減
- E. 良附丸加減

第07讲 积滞、厌食、便秘、口疮、咽喉肿痛

正保医学教育网
www.med66.com

续表

辨证	症状	治法	方剂	中成药
脾虚 夹积	面色萎黄, 形体消瘦, 神疲肢倦, 不思乳食, 腹硬喜按, 大便稀溏腥臭, 夹乳片或不消化食物残渣。舌质淡, 苔白腻, 脉濡细而滑, 或指纹淡滞	健脾助运, 消食化滞	健脾丸	健胃消食片、健脾丸、开胃健脾

学教育网
www.med66.com

25. 某男, 69岁。因肛门有脱出物且大便带血到医院就诊。患者常年肛门松弛, 时有痔核脱出, 需手法还纳, 便血色淡, 面白, 乏力, 纳呆; 舌淡, 边有齿痕, 脉弱。宜选用的方剂是 (B)

- A. 槐花散加减
- B. 补中益气汤加减
- C. 脏连丸加减
- D. 止痛如神汤加减
- E. 凉血地黄汤加减

26. 某男, 68岁。因感冒、发热、头痛、鼻塞流涕四肢乏力等不适症状就诊, 测体温 39°C, 医师开具吲哚美辛栓退热。不宜与该药联用的中成药是 (C)

- A. 清开灵胶囊
- B. 感冒软胶囊
- C. 新癍片
- D. 连花清瘟颗粒
- E. 疏风解毒胶囊

27. 某女, 5岁。母亲诉患儿饭量比同龄孩子少, 但饮水较多, 且常说口干, 平时容易发脾气, 手足心热, 大便偏干, 小便黄。诊察见患儿毛发皮肤失于润泽, 舌红, 舌苔花剥, 脉细数。中医辨证是 (C)

- A. 脾失健运
- B. 脾胃气虚
- C. 胃阴不足
- D. 脾胃湿热
- E. 肝胃不和

(六) 六腑病变主要证候的临床表现及辨证要点

证型	临床表现	辨证要点
胃寒	胃脘疼痛, 轻则绵绵不已, 重则拘急剧痛, 阵阵发作, 遇寒则重, 得热则缓, 呕吐清水, 舌苔白滑, 脉沉迟或沉弦	胃脘同见寒象
胃热(火)	胃脘灼热而疼痛, 烦渴多饮或渴欲冷饮, 消谷善饥, 牙龈肿痛, 口臭, 泛酸嘈杂, 舌红苔黄, 脉滑数	
食滞胃脘	脘腹胀满, 呕吐酸腐, 暖气反酸, 或酸臭, 不思饮食, 大便泄泻或秘结。厚腻, 脉滑	
胃阴虚	口咽发干, 多以睡后明显, 不思饮食, 知饥不食, 并有心烦、低热、大便不调、干呕作呃, 舌红少苔或无苔, 脉细数	

28. 大黄虻虫丸处方组成为大黄、土鳖虫、水蛭、虻虫、蛭螭、干漆、桃仁、地黄、白芍、黄芩、苦杏仁、甘草。方中大黄宜选用的炮制品是(D)

- A. 生大黄
- B. 酒大黄
- C. 醋大黄
- D. 熟大黄
- E. 大黄炭

29. 某男, 32岁。因银屑病来医院就诊, 医师辨证为血虚风燥, 开具的处方为: 土茯苓半枝莲、龙葵、生地黄、当归、白芍、徐长卿、牡丹皮、紫草、水牛角、炒槐花、北豆根、生侧柏、白鲜皮、地肤子、鬼箭羽。煎煮时需要后下的饮片是(B)

- A. 牡丹皮
- B. 徐长卿
- C. 土茯苓
- D. 炒槐花
- E. 白鲜皮

第04讲 处方调配与复核、发药、中药调剂、特殊中药处方的调剂

(三) 特殊煎药方法

中药的特殊煎药方法 (香豆)

煎煮方法	内容
先煎	①矿物、动物骨甲类饮片: 生蛤壳、生龙骨、生龙齿、生紫石英、生寒水石、生石膏、生石决明、生珍珠母、生瓦楞子、鳖甲、龟甲、鹿角霜、生磁石、生牡蛎、生赭石、自然铜等 ②有毒饮片: 生川乌、生草乌、制附子等
后下	①气味芳香类: 降香、沉香、薄荷、砂仁、白豆蔻、鱼腥草等 ②久煎后有效成分易被破坏的饮片: 钩藤、苦杏仁、徐长卿、生大黄、番泻叶等
包煎	①含粘液质较多的饮片: 车前子、葶苈子等 ②富含绒毛的饮片: 旋覆花、枇杷叶等 ③花粉等微小饮片: 蒲黄、海金沙、蛤粉、六一散等

30. 含有砷、汞等矿物类成分的中成药, 长期服用可造成血尿、蛋白尿等肾功能损害肾功能不全患者应慎用。同时含有砷、汞等矿物类成分的中成药是 (C)

- A. 人参再造丸
- B. 苏合香丸
- C. 安宫牛黄丸
- D. 天王补心丸
- E. 牛黄解毒丸

31. 属于配伍禁忌, 斗谱排列时不能装于一斗及上、下斗的饮片是 (D)

- A. 当归与独活
- B. 天葵子与冬葵子
- C. 藜芦与漏芦
- D. 甘草与芫花
- E. 法半夏与川贝母

第04讲 处方调配与复核、发药、中药调剂、特殊中药处方的调剂

续表

斗谱编排的基本原则	可同放于一个斗中——同一处方中经常一起配伍应用的“药对”药物, 如麻黄、桂枝; 酸枣仁、远志; 射干、北豆根; 党参、黄芪; 桃仁、红花; 杜仲、续断; 陈皮、青皮; 泽泻、猪苓; 山药、薏苡仁、板蓝根、大青叶; 辛夷、苍耳子; 火麻仁、郁李仁; 羌活、独活; 苍术、白术; 麦冬、天冬; 川乌、草乌; 知母、浙贝母; 蒲公英、紫花地丁; 篇蓄、瞿麦; 三棱、莪术; 乳香、没药; 小茴香、橘核
谱编排时还应参考的其他原则	属于配伍禁忌的药物, 不能装于一斗或上下药斗中, 如乌头类与半夏的各种炮制品、瓜蒌; 甘草与京大戟、甘遂、芫花; 藜芦与丹参、南沙参、玄参、苦参、白芍、赤芍、细辛; 丁香与郁金; 芒硝与京三棱; 肉桂与石脂均不宜放在一起

32. 某男, 52岁。胃脘隐痛 10 余年, 噎气, 无烧心反酸, 时便秘; 舌淡红, 苔白, 脉沉缓。胃镜检查结果为萎缩性胃炎。宜选用的藏药方剂是 (D)

- A. 六味安消散
- B. 二十五味松石丸
- C. 坐珠达西丸
- D. 仁青芒觉胶囊
- E. 三十五味沉香丸

续表	药物名称	功能	主治病证
	仁青常觉	清热解毒, 调和滋补	... 萎缩性胃

33. 某男, 75岁。患中风 3 年。现左侧肢体僵硬拘挛活动不遂, 头痛头晕, 面赤耳鸣; 舌红, 苔薄黄, 脉弦。宜选用的中成药是 (B)

- A. 消栓颗粒
- B. 天麻钩藤颗粒
- C. 脑心通胶囊
- D. 醒脑再造胶囊
- E. 通天口服液

半身不遂				
辨证	症状	治法	方剂	中成药
气虚血瘀	半身不遂, 肢软无力, 患侧手足浮肿, 面色少华, 语言蹇涩, 舌体不正。舌色淡紫或有瘀斑, 苔薄白, 脉细涩无力	益气活血	补阳还五汤	消栓颗粒、脑心通胶囊、通心络胶囊、参芍片合三七胶囊 (或合三七粉)
肝阳上亢	半身不遂, 患侧僵硬拘挛, 兼见头痛头晕, 面赤耳鸣。舌红, 苔薄黄, 脉弦或弦涩	平肝潜阳	天麻钩藤饮	心脑静片、天麻钩藤颗粒、脑血栓片 (主治血阳亢证)

34. 某男, 55岁。患痹证 20 余年, 肢体关节疼痛, 屈伸不利, 关节肿大、僵硬、变形, 筋脉拘急, 腰膝酸软; 骨蒸潮热: 舌红, 少苔, 脉细数。中医辨证是 (C)

- A. 行痹
- B. 痛痹
- C. 尪痹
- D. 热痹
- E. 着痹



第04讲 淋证、癃闭、阳虚、郁证、虚劳、痹证、中暑

续表

辨证	症状	治法	方剂	中成药
着痹	肢体关节酸痛、重着, 患处肿胀, 痛有定处, 手足沉重, 活动不利, 肌肤麻木不仁。苔白腻, 脉濡滑	除湿 通络, 祛风 散寒	薏苡仁汤	选风湿痹痛
尪痹	痹证日久不愈, 肢体、关节疼痛, 屈伸不利, 关节肿大僵硬、变形, 甚则肌肉萎缩, 筋脉拘急, 肘膝不伸, 或以尻代踵, 以背代头, 伴腰膝酸软, 骨蒸潮热, 自汗、盗汗, 舌红或淡, 脉细数	化痰 祛瘀, 滋养 肝肾		

正保医学教育网 www.med66.com

35. 某女, 48岁。经血量多, 非时而下, 淋漓不净, 血色紫暗有块, 小腹疼痛; 舌紫暗, 脉弦涩有力。中医辨证是. (D)

- A. 气血两虚
- B. 脾不统血
- C. 肝肾不足
- D. 瘀血阻络
- E. 冲任不固



第06讲 月经不调、痛经、崩漏、带下过多、绝经前后诸症

续表

辨证	症状	治法	方剂	中成药
肝肾不足	经血非时而下, 出血量多, 淋漓不尽, 色淡质稀, 两目干涩, 腰酸膝软, 面色晦暗, 舌淡暗, 苔薄白, 脉沉弱	补益肝肾, 固冲止血	调肝汤	鹿角胶颗粒、育丸 (主治气血肝肾不足证)、止血灵
瘀血阻络	经血非时而下, 量多或少, 淋漓不净, 血色紫暗有块, 小腹疼痛拒按, 舌紫暗或有瘀点, 脉涩或弦涩有力	活血祛瘀, 温经止血	逐瘀 止崩 汤	坤灵丹、足、肾内阻

正保医学教育网 www.med66.com

36. 某男, 52岁。平素脾胃虚弱。近 3 日因目赤肿痛; 自行服用黄连. 上清丸, 出现胃脘不适, 大便稀溏等。针对该患者体征, 其适宜的服药时间是 (A)

- A. 饭后
- B. 空腹
- C. 饭前
- D. 睡前
- E. 餐中

第03讲 处方审核(二)

正保医学教育网 www.med66.com

(三) 处方的用法用量

1. 饮片处方的服用

(1) 内服汤剂

名称	具体内容	
药液温度	温而不凉时服用, 热病冷服, 寒病热服	
服用次数	2次, 重病急病可隔4小时服药一次	
服药时间	饭后服	一般药、健胃药、对胃肠刺激性
	饭前服	滋补药
	空腹服	驱虫药、泻下药
	睡前服	安眠药
抗疟药宜在发作前1~2小时服用		

37. 某女, 29岁。小便频数短涩, 灼热刺痛, 尿色黄赤少腹拘急胀痛, 发热, 口苦, 大便秘结: 舌红, 苔黄腻, 脉滑数。宜采用的治法是(A)

- A. 清热利湿通淋
- B. 清热养阴生津
- C. 清热排石通淋
- D. 滋补肝肾利尿
- E. 补肾健脾利湿

第04讲 淋证、癃闭、阳痿、郁证、虚劳、痹证、中暑

正保医学教育网 www.med66.com

淋证

辨证	症状	治法	方剂
热淋	小便频数短涩, 灼热刺痛, 溺色黄赤, 少腹拘急胀痛, 或寒热, 口苦, 呕恶, 或腰痛拒按, 或大便秘结。舌红, 苔黄腻, 脉滑数	清热利湿通淋	八正散
石淋	尿中有砂石, 排尿涩痛, 或排尿时突然中断, 尿道窘迫疼痛, 少腹拘急, 往往突发一侧腰腹绞痛难忍, 甚则牵及外阴, 尿中带血。舌红, 苔薄黄, 脉弦或弦数	清热利湿, 排石通淋	石韦

38. 中药在贮藏过程中, 由于受到诸多因素的影响, 其质量润德教育 整理也会不断发生变化。对中药质量变异有影响的自身因素是(B)

- A. 水分、虫害、油脂

- B. 油脂、淀粉、色素
- C. 日光、淀粉、色素
- D. 虫害、霉菌、容器
- E. 空气、水分、包装

第01讲 中药的贮藏与养护

因素	变异现象
水分	含水量高于饮片本身应有的含水量时: 易发生虫蛀、霉烂、解、粘连等 含水量低于饮片本身应有的含水量时: 易发生风化、气味散失、泛油、干裂、脆化等
淀粉	虫蛀、霉变
黏液质	发霉、生虫, 如枸杞子、天冬等
油脂	产生异味、引起酸败, 如桃仁、杏仁、刺猬皮、狗脊等
挥发油	气味散失, 如白芷、当归、荆芥、薄荷、肉桂、山柰等
色素	发霉变色, 如月季花、玫瑰花等

速记: 油脂挥发, 水粉黏色。

39. 毒性中药药性峻烈, 治疗剂量与中毒剂量相近, 使用不当会致人中毒甚则死亡, 因此掌握毒性中药饮片的正确用法尤为重要。下列毒性中药不可内服的是(B)

- A. 雄黄
- B. 白降丹
- C. 生藤黄
- D. 砒石
- E. 蟾酥

第04讲 处方调配与复核、发药、中药调剂、特殊中药处方的调剂

名称	用法用量	注意事项
白降丹	外用适量	不可内服, 具腐蚀性
生草乌	炮制后用	生品内服宜慎, 孕妇禁用, 注意“三棱、莪术、攻乌”禁忌
生川乌	炮制后用	生品内服宜慎, 孕妇禁用, 注意“三棱、莪术、攻乌”禁忌
生附子	3~15g	孕妇慎用, 注意“半夏贝母”禁忌
生白附子	3~6g	生品内服宜慎, 孕妇慎用
生半夏	炮制后用	不宜与乌头类药材同用,
生巴豆	外用适量	不宜与牵牛子同用, 孕妇禁用

40. 某男, 36岁, 因感冒初起, 咽喉肿痛就诊。医师处方金银花、蒲公英、连翘、薄荷、甘草, 代茶饮。代茶饮的服用方法是(A)。

- A. 不拘时频服
- B. 1次顿服

- C. 每日服 2 次
- D. 每 日服 3 次
- E. 4 小时服 1 次

二、配伍选择题

[41-43]

- A. 血府逐瘀汤加减
- B. 附子汤加减
- C. 补阳还五汤加减
- D. 乌头赤石脂丸加减
- E. 生脉散加减

41. 某男, 65 岁。胸痛胸闷, 胸胁胀满, 心悸;唇舌紫暗, 脉涩。宜选用的方剂是(A)
42. 某男。50 岁。胸痛隐隐, 遇劳则发, 神疲乏力, 气短懒言, 心悸自汗;舌淡暗, 脉弱而涩。宜选用的方剂是(C)
43. 某女, 53 岁。胸痛彻背, 感寒痛甚, 胸闷气短, 心悸, 形寒肢冷;舌淡, 苔薄白, 脉沉迟。宜选用的方剂是(D)

第02讲 感冒、咳嗽、喘证、胸痹、不寐、胃痛

辨证	症状	治法	方剂	中成药
气虚血瘀	胸痛隐隐, 遇劳则发, 神疲乏力, 气短懒言, 心悸自汗, 舌胖有齿痕, 色淡暗, 苔薄白, 脉弱而涩, 或结、代	益气活血	补阳还五汤 补阳	通心络胶囊、舒心口服液、芪参胶囊、芪参益气滴丸、参茸药片
气滞血瘀	胸痛胸闷, 胸胁胀满, 心悸。唇舌紫暗, 脉涩	行气活血	血府逐瘀汤	血府逐瘀汤、复方丹参滴丸、速效救心丸、心可舒片

Handwritten notes: 气虚血瘀, 胸痹, 气滞, 气短, 补阳, 补阴

续表

辨证	症状	治法	方剂	中成药
痰瘀痹阻	胸闷痛如窒, 痛有定处, 形体肥胖, 肢体沉重, 纳呆, 痰多, 舌色暗, 苔浊腻, 脉滑, 或有结、代	豁痰化瘀	瓜蒌薤白半夏汤合丹参饮	丹参片
寒凝心脉	胸痛彻背, 感寒痛甚, 胸闷气短, 心悸, 形寒肢冷, 面白, 舌苔白, 脉沉迟或沉紧	温阳散寒	乌头赤石脂丸	冠心苏宽胸气

[44-45]

- A: 面黄红润

- B. 面黄萎黄
- C. 面黄如橘
- D. 面黄虚胖
- E. 面黄晦暗

- 44. 肝胆湿热、内蕴脾胃, 常见的面色特征是(C)
- 45. 脾气虚衰、湿邪内阻, 常见的面色特征是(D)

[46-47]

- A. 肺司呼吸失常
- B. 脾主运化失常
- C. 肾主藏精失常
- D. 心主血脉失常
- E. 肝主疏泄失常


- 46. 某男, 50岁。胸痛连背, 背痛彻胸, 气短, 劳则尤甚; 舌紫暗, 脉沉涩。基于五脏的生理功能分析, 其病变属于(D)
- 47. 某女, 35岁。胸胁胀痛, 咽中异物感; 时咳, 痰少黏稠; 舌淡红脉沉弦。基于五脏的生理功能分析, 其病变属于(E)

[48~50]

- A. 后下
- B. 对服
- C. 包煎
- D. 先煎
- E. 冲服

某男, 75岁。近日入睡困难, 心烦, 口干, 舌燥, 小便短赤, 大便干燥; 舌尖红, 脉数。医师诊断为不寐, 证属心火炽盛, 治以清心泻火。开具的处方为黄连、生地黄、当归、生大黄、甘草、珍珠母、羚羊角粉。执业药师对患者进行煎药、服用方法的指导。

- 48. 珍珠母应采用的方法是(D)
- 49. 生大黄应采用的方法是(A)
- 50. 羚羊角粉应采用的方法是(E)



正保医学教育网
www.med66.com

(三) 特殊煎药方法

中药的特殊煎药方法 (香豆)

煎煮方法	内容
先煎	①矿物、动物骨甲类饮片: 生蛤壳、生龙骨、生龙齿、生紫石英、生寒水石、生石膏、生石决明、生珍珠母、生瓦楞子、鳖甲、龟甲、鹿角霜、生磁石、生牡蛎、生赭石、自然铜等 ②有毒饮片: 生川乌、生草乌、制附子等
后下	①气味芳香类: 降香、沉香、薄荷、砂仁、白豆蔻、木香等 ②久煎后有效成分易被破坏的饮片: 钩藤、苦杏仁、生大黄、番泻叶等
包煎	①含粘液质较多的饮片: 车前子、葶苈子等 ②富含油脂的饮片: 旋覆花、枇杷叶等 ③花粉等微小饮片: 蒲黄、蛤粉、六一散等

第04讲 处方调配与复核、发药、中药汤剂、特殊中药处方的调剂

续表

煎煮方法	内容
冲服	一些用量少, 贵细中药宜先研成粉末再用群... 服, 避免因与他药同煎而导致其成分被药渣吸附而影响... 如雷丸、蕲蛇、羚羊角、三七、琥珀、鹿茸、紫河车、白花蛇等
煎汤代水	对于质地松泡、用量较大, 或泥土类... 先煎15~25分钟, 去渣取汁, 再与其... 灶心土等
用时捣碎	一些果实种子类中药, 由于外壳坚硬... 时捣碎”的临方炮制常用药有: 牛... 子、豆蔻、苦杏仁、葶苈、草豆蔻... 仁、益智仁、酸枣仁等

[51~ 53]

- A. 小青龙合剂
- B. 养阴清肺丸
- C. 清气化痰丸
- D. 七味都气丸
- E. 百合固金丸

51. 某男, 78岁。喘促日久, 呼多吸少, 气不得续, 动则喘甚, 形瘦神疲, 汗出肢冷; 舌淡, 苔薄脉沉。宜选用的中成药是 (D)
52. 某男, 43岁。有慢性支气管炎病史, 7日前因患感冒, 现症状加重, 咳嗽气粗, 胸部胀痛, 痰黏稠色黄, 胸中烦闷, 身热, 有汗, 口渴喜冷饮急咽干, 面红, 尿赤, 便秘; 舌红, 苔黄腻, 脉滑数。宜选用的中成药是 (C)
53. 某女, 35岁。受凉后出现喘咳气逆呼吸急促, 胸部胀闷, 痰多色白稀薄而带泡沫, 兼头痛鼻塞, 无汗, 恶寒, 发热; 舌苔薄白而滑, 脉浮紧。宜选用的中成药是 (A)

第03讲 感冒、咳嗽、喘证、胸痹、不寐、胃痛

喘证

辨证	症状	治法	方剂	中成药
风寒闭肺	喘咳气逆, 呼吸急促, 胸部胀闷, 痰多色白稀薄而带泡沫, 兼头痛鼻塞, 无汗、恶寒、发热。舌苔薄白而滑, 脉浮紧	宣肺散寒	麻黄汤	小青龙合剂、桂龙咳喘宁、胶...
痰热郁肺	喘咳气涌, 胸部胀痛, 痰稠黏色黄, 或夹血痰, 伴胸中烦闷, 身热, 有汗, 口渴喜冷饮, 咽干, 面红, 尿赤, 便秘。舌质红, 苔薄黄腻, 脉滑数	清热化痰, 宣肺止咳	桑白皮汤	清肺、清肺消痰...

第02讲 感冒、咳嗽、喘证、胸痹、不寐、胃痛

续表

辨证	症状	治法	方剂	中成药
肾不纳气	喘促日久, 呼多吸少, 气不得续, 动则喘甚, 小便常因咳甚而失禁, 或尿后余沥, 形瘦神疲, 汗出肢冷, 面唇青紫, 或有跗肿, 舌淡苔薄, 脉沉弱; 或见喘咳, 面红烦躁, 口咽干燥, 足冷, 汗出如油, 舌红少津, 脉细	补肾纳气	金匱肾气丸	七味都气丸

学教育网
www.med66.com

[54-56]

- A. 斑蝥
- B. 麻黄
- C. 罂粟壳
- D. 大黄
- E. 艾叶

54. 属于医疗用毒性药品的中药是 (A)
55. 须按麻醉药品管理的中药是 (C)
56. 根据 2015 年版《中国药典》，有小毒的中药是 (E)

[57-58]

- A. 盐知母
- B. 蜜知母
- C. 醋知母
- D. 生知母
- E. 姜知母

57. 白虎汤用于外感热病, 调配时知母应给付的是。(D)
- 58 大补阴丸用于阴虚火旺, 调配时知母应给付的是 (A)

[59-60]

- A. 真武汤
- B. 小青龙汤
- C. 桂枝汤
- D. 四物汤
- E. 芍药甘草汤

59. 中西药联用时, 可与皮质激素类药联用而减轻其副作用的是 (C)
60. 中西药联用时, 可与利尿药联用而减轻其口渴副作用的是 (A)

第02讲 中药的合理应用(二)

木防己汤、真武汤、越婢加术汤、分消汤等	利尿药	减轻因应用西药利尿药致的口渴等副作用
含甘草类的中药复方	排钾性利尿药	不宜联用, 以避免乙型醛固酮增多症
桂枝汤类、人参类方剂	皮质激素类药	减少激素的用量和
八味地黄丸、济生肾气丸、人参汤	降血糖药	使糖尿病患者的性和肾功能障碍减轻

正保医学教育网
www.med66.com

第02讲 中药的合理应用(二)

桂枝茯苓丸、当归四逆加吴茱萸生姜汤等	血管扩张药	增强作用, 有利于微循环
黄连解毒汤、大柴胡汤等	抗动脉粥样硬化、降血脂剂	增强疗效
木防己汤、真武汤、越婢加术汤、分消汤等	利尿药	增强利尿效果
枳实	庆大霉素	枳实能松弛胆道括约肌, 使庆大霉素进入胆道, 增强疗效
小青龙汤、柴朴汤等	氨茶碱、色甘酸钠等	提高对支气管哮喘的疗效
麦门冬汤、滋阴降火汤等	磷酸可待因	可提高对老年人咳嗽的疗效

正保医学教育网
www.med66.com

[61-63]

- A. 急性肾功能损害、皮疹、头晕、胃肠道反应、过敏样反应
 - B. 肝肾功能异常、粒细胞、白细胞和血小板减少精子数量减少
 - C. 肝损害、剥脱性皮炎
 - D. 胰腺炎、低钾血症、低氯血症、低钠血症
 - E. 过敏性休克、急性喉头水肿、过敏性哮喘、过敏性间质性肾炎。
61. 服用克银丸发生严重不良反应时可见(C)
62. 使用清开灵注射液发生严重不良反应时可见(E)
63. 服用珍菊降压片发生严重不良反应时可见(D)

第02讲 中药不良反应(二)

正保医学教育网
www.med66.com

(二) 克银丸

方面	具体内容
不良反应	肝损害、剥脱性皮炎
用药指导	①严格控制剂量和疗程, 避免超量、长期使用 ②在治疗过程中注意肝功能监测 ③儿童、老年人、孕妇及哺乳期妇女慎用 ④有克银丸过敏史、肝功能不全患者禁用, 对过敏者慎用

学教育网
www.med66.com

第02讲 中药不良反应(二)

正保医学教育网
www.med66.com

(一) 清开灵注射液

方面	具体内容
不良反应	过敏反应, 严重时会出现过敏性休克
用药指导	①医护人员应充分了解清开灵注射剂的功能主治及其适应证, 权衡患者的治疗利弊, 谨慎用药 ②医护人员应在用药前仔细询问患者的过敏史(对药品曾发生过不良反应的患者、过敏体质患者、对药品易产生过敏反应的患者), 不宜使用 ③清开灵注射剂应单独使用, 禁忌与其他药物联合用药, 如确需联合其他药品时应注意联合用药与清开灵注射液的时间间隔以及药物相互作用

学教育网
www.med66.com

第02讲 中药的合理应用(二)

正保医学教育网
www.med66.com

关于“珍菊降压片”的总结

- 1.含有的西药成分是: 盐酸可乐定、氢氯噻嗪。
- 2.使用珍菊降压片降低血压, 盐酸可乐定比单用剂量减少60%。
- 3.氢氯噻嗪引起的不良反应最常见为低血钾。
- 4.含麻黄的中成药忌与降血压的中成药(比如珍菊降压片)合用。

学教育网
www.med66.com

[64-66]

A. 六味地黄丸

- B. 薯蓣丸
- C. 龟龄集
- D. 龟鹿二仙膏
- E. 生脉饮

老年人因脏腑生理功能衰退, 常感体力不济, 记忆力不如以前, 想服用滋补药增强体质, 但需辨证选药, 合理使用。

- 64. 阴阳两虚者宜用 (D)
- 65. 肾阴虚者宜用 (A)
- 66. 肾阳虚者宜用 (C)

第01讲 特殊人群的中药应用

老年人合理服用滋补药的注意事项

老年患者的辨证	宜选用的药物
肺阴虚 (慢性支气管炎日久)	西洋参、沙参等益气养阴清热的药物
阴虚	清补型滋补剂: 生脉饮
阳虚	温补型滋补剂: 龟龄集
肾阴虚	六味地黄丸
心脾两虚	人参归脾丸

学教育网
www.med66.com

[67-69]

- A. 微脉
- B. 弱脉
- C. 缓脉
- D. 细脉
- E. 虚脉

67. 某男, 70岁。患消渴病多年饮食减少, 神疲乏力, 四肢倦怠; 舌淡, 苔白, 脉来三部举按皆无力, 隐隐蠕动指下, 此脉象是 (E)

68. 某男, 80岁。久病, 不耐寒热, 头晕神疲乏力; 自汗盗汗, 脉来沉细, 应指无力, 此脉象是 (B)

69. 某男, 74岁。久病泄泻, 气短汗出, 神情淡漠, 面色苍白, 手足逆冷; 舌淡, 苔白, 脉来若有若无, 按之欲绝, 此脉象是 (A)

[70-72]

- A. 清茶送服
- B. 生姜煎汤送服
- C. 黄酒送服
- D. 米汤送服
- E. 淡盐水送服

70. 某女, 75岁。大便干结难下 2月余, 脘腹胀满, 口干口苦, 心烦不宁; 舌苔黄腻, 脉弦。诊断为便秘, 给予更衣丸。为增强疗效, 执业药师建议可使用的药引和服用方法是 (D)。

71. 某女, 65岁。恶寒重, 发热轻, 头身疼痛, 鼻塞, 流清涕; 舌淡, 苔白, 脉浮紧。给予正柴胡饮颗粒。为增强疗效, 执业药师建议可使用的药引和服用方法是(B)

72. 某男, 25岁。踝关节扭伤, 活动受限; 舌暗, 苔白, 脉弦。给予活血止痛胶囊。为增强疗效, 执业药师建议可使用的药引和服用方法是(C)

2. 中成药的用法用量 *※※(必考)*

(1) 中成药的内服

药引	药引功效	中成药举例
黄酒	温通经络、活血散瘀	大活络丸、牛黄醒消丸、跌打丸
姜汤	散寒、温胃止呕	藿香正气丸、附子理中丸
淡盐水	引药入肾	六味地黄丸、大补阴丸
焦三仙煎汤	增强消导之功	至宝锭
鲜芦根煎汤	清热透表生津	银翘解毒丸
清茶	清热	川芎茶调散
米汤	保护胃气	四神丸、更衣丸

[73-75]

- A. 湿热内蕴
- B. 脾肾阳虚
- C. 肝气乘脾
- D. 食伤肠胃
- E. 脾胃气虚

73. 某男, 46岁。常年泄泻, 大便时溏时泻, 水谷不化, 迁延反复, 食少, 食后脘闷不适, 稍进油腻之物则便次明显增多, 面色萎黄, 肢倦乏力; 舌淡, 苔薄白, 脉细弱。中医辨证是(E)

74. 某男, 32岁。泄泻腹痛, 泻下急迫, 粪色黄褐, 气味臭秽, 肛门灼热, 小便短黄, 烦热口渴; 舌红; 苔黄腻, 脉滑数。中医辨证是(A)

75. 某男, 29岁。3天前饱食后出现腹痛肠鸣, 泻下粪便臭如败卵, 夹有不消化食物, 泻后痛减, 脘腹胀满, 嗳腐吞酸; 舌苔厚腻, 脉滑。中医辨证是(D)

泄泻

辨证	症状 <i>B</i>	治法	方剂
食伤肠胃	腹痛肠鸣, <i>泻下粪便臭如败卵</i> , 泻后痛减, <i>泻下伴有不消化食物</i> , <i>脘腹胀满, 嗳腐吞酸</i> , 不思饮食。舌苔垢浊或厚腻, 脉滑	消食导滞	保和丸
湿热内蕴	泄泻腹痛, 泻下急迫, 或泻而不爽, 粪色黄褐, 气味臭秽, <i>肛门灼热</i> , 小便短黄, 烦热口渴。舌质红, <i>苔黄腻</i> , 脉滑数	清热利湿	葛根汤

续表

辨证	症状	治法	方剂	成药
脾胃气虚	大便时溇时泻, 水谷不化, 迁延反复, 食少, 食后脘闷不适, 稍进油腻之物, 则便次明显增多, 面色萎黄, 肢倦乏力, 舌质淡, 苔薄白, 脉细弱	健脾益气, 化湿止泻	参苓白术散	健脾丸、参苓白术散
脾肾阳虚	黎明之前, 脐腹作痛, 肠鸣即泻, 泻后则安, 腹部喜温, 形寒肢冷, 腰膝酸软。舌淡苔白, 脉沉细	温肾健脾, 固涩止泻		



[76-77]

- A. 金银花、首乌藤
- B. 金银花、金银藤
- C. 金银花、海风藤
- D. 款冬花、金银藤
- E. 款冬花、首乌藤

76. 处方中的并开药“忍冬花藤”, 执业药师在调配时应付(B)

77. 处方中的并开药“金银花藤”, 执业药师在调配时应付(B)

[78-79]

- A. 乌鸡白凤丸
- B. 加味道遥丸
- C. 益母丸
- D. 妇科调经片
- E. 艾附暖宫丸

78: 某女, 35岁。因月经不调就诊, 诊断为月经先期, 辨证属肝经郁热证, 宜选用的中成药是(B)

79. 某女, 42岁。因月经不调就诊, 诊断为月经后期, 辨证属气滞血瘀证, 宜选用的中成药是(C)

续表

辨证	症状	治法	方剂	中成药
脾胃气虚	大便时溏时泻, 水谷不化, 迁延反复, 食少, 食后脘闷不适, 稍进油腻之物, 则便次明显增多, 面色萎黄, 肢倦乏力, 舌质淡, 苔薄白, 脉细弱	健脾益气, 化湿止泻	参苓白术散	健脾丸、参苓白术散
脾肾阳虚	黎明之前, 脐腹作痛, 肠鸣即泻, 泻后则安, 腹部喜温, 形寒肢冷, 腰膝酸软。舌淡苔白, 脉沉细	温肾健脾, 固涩止泻		

第06讲 月经不调、痛经、崩漏、带下过多、绝经前后诸症

续表


证候	辨证	症状	治法	方剂	中成药
月经后期		经期错后, 量少色淡, 经质清稀, 腰膝酸软, 头晕耳鸣, 肾虚带下清稀, 心悸失眠, 面色血少晦暗, 或面部暗斑。舌淡暗, 苔薄白, 脉沉细无力	补肾益气, 养血调经	归肾丸合四物汤	乌鸡白凤丸 (胶囊、片)、归芍地黄丸、春血安胶囊
		经期延后, 经量偏少, 经色暗红, 或有血块, 小腹胀痛, 血瘀精神抑郁, 胸闷不舒。舌苔正常, 脉弦	活血行气, 化瘀止痛	膈下逐瘀汤	调经丸、益母丸、调经活血片

[80-81]

- A. 阳盛
- B. 阳
- C. 亡阳
- D. 阴盛
- E. 阴虚

80. 某男, 27岁。壮热口渴, 烦躁不安, 面红目赤; 舌红, 苔黄; 脉洪大。分析该病机是(A)

81. 某男, 84岁, 久病, 近患感冒, 因发汗过多, 出现精神疲惫, 肌肤手足逆冷冷汗淋漓, 脉微欲绝。分析该病机是(C)




[82~ 83]

- A. 归脾丸
- B. 八珍颗粒
- C. 小金丸.
- D. 双黄连口服液
- E. 枣仁安神胶囊

妊娠期妇女使用中成药时要慎重选择, 以免损伤胎儿及母体。

82. 根据 2015 年版《中国药典》, 孕妇应禁用的中成药是 (C)

83. 根据 2015 年版《中国药典》, 孕妇应慎用的中成药是 (E)



[84~85]

- A. 泽泻
- B. 吴茱萸
- C. 牡丹皮
- D. 灯心草
- E. 细辛

84. 按照对抗贮存法, 宜与冰片同贮的中药是 (D)

85. 按照对抗贮存法, 宜与蛤蚧同贮的中药是 (B)

传统养护技术	具体内容
高温养护法	温度一般高于40℃, 但必须注意的是, 含挥发油的饮片烘烤时温度不宜超过60℃, 以免影响饮片的质量
对抗贮存法	采用两种或两种以上药物同贮, 相互克制起到防止虫蛀、霉变的养护方法。一般适用于数量不多的药物。如牡丹皮与泽泻、山药同贮, 蛤蚧与花椒、吴茱萸或荜澄茄同贮, 蕲蛇或白花蛇与花椒或大蒜瓣同贮, 土鳖虫与大蒜同贮, 人参与细辛同贮, 冰片与灯心草同贮, 硼砂与绿豆同贮, 藏红花与冬虫夏草同贮。用与具有特殊气味的物质密封同贮, 如山苍子油、花椒、大蒜、白酒等, 有时也可达到良好的防蛀、防霉效果

[86~ 87]

- A. 2~10℃
- B. 10~25℃
- C. 2~5℃
- D. 不超过 20℃
- E. 10~30℃

根据 2015 年版《中国药典》“凡例”[贮藏]项下对药品贮藏与保管基本要求的规定

86. 阴凉处的温度应控制在 (D)

87 冷处的温度应控制在 (A)

5. 阴凉处: 不超过20℃
6. 凉暗处: 避光并不超过20℃
7. 冷处: 2~10℃
8. 常温: 10~30℃

[88~ 90]

- A. 气滞血瘀
- B. 气不摄血
- C. 气随血脱

D. 气虚血瘀

E. 气血两虚

88. 某女, 57岁。胸胁胀满, 走窜疼痛, 性情急躁; 舌紫暗, 有瘀斑, 脉涩。中医辨证是(A)

89. 某女, 48岁。月经出血量多, 大汗淋漓, 四肢厥冷; 唇舌色淡, 脉微细, 中医辨证是(C)

90. 某女, 51岁。少气懒言, 乏力自汗, 面色苍白; 舌淡而嫩, 脉细弱, 中医辨证(E)

(三) 气血同病常见证候的临床表现及辨证要点

证型	临床表现	辨证要点
气滞血瘀	胸胁胀满走窜疼痛(气滞), 性情急躁, 兼见痞块刺痛拒按, 舌紫暗或有瘀斑等(血瘀)。妇女还可见月经闭止, 或痛经、经色紫暗有块(血瘀), 乳房胀痛(气滞)	病程较长, 循行部位固定
气血两虚	少气懒言, 乏力自汗(气虚), 面色苍白或萎黄(血虚), 心悸失眠, 舌淡而嫩, 脉细弱	病程较长, 兼有气虚和血虚表现
气不摄血	出血的同时, 见有气短, 倦怠乏力, 面色苍白, 脉软弱细微、舌淡等气虚的症状	兼有气虚表现
气随血脱	大量出血的同时, 见面色晄白, 四肢厥冷, 汗淋漓, 甚至晕厥, 脉微细或弱	兼有气虚表现

三、综合分析选择题

某女, 67岁, 大便秘结, 二三日一行, 量少, 排出不畅, 面色无华, 头晕目眩心悸, 口干; 舌淡, 苔少, 脉细涩。

91. 四诊合参, 中医辨证是(A)

A. 津亏肠燥

B. 热结肠胃

C. 气滞郁结

D. 胃肠积滞

E. 阳虚寒凝

92. 宜采用的治法是(A)

A. 养血润燥

B. 清热润肠

C. 顺气行滞

D. 温通开秘

E. 泻下导滞

93. 宜选用的中成药是(D)

A. 清宁丸

B. 当归芦荟丸

C. 补中益气丸

D. 麻仁

E. 槟榔四消丸

第09讲 泄泻、便秘、中风、头痛、眩晕、消渴

续表

辨证	症状	治法	方剂	中成药
津亏 肠燥	大便秘结, 面色无华, 头晕目眩, 心悸, 口干, 舌淡, 苔少, 脉细涩	养血润燥	润肠丸	麻仁润肠丸、麻仁丸、麻仁滋脾丸、通乐颗粒
阳虚 寒凝	大便艰涩, 排便困难, 小便清长, 畏寒喜暖, 面色(白光)白, 唇淡口和, 或兼腹冷腹痛, 舌淡苔白, 脉沉迟	温通开秘	半硫丸或附桂八味丸	桂附地黄丸与麻仁滋脾丸合用

学教育网
www.med66.com

(二)

某女, 35岁。因银屑病口服复方青黛丸, 每日3次, 每次6g。服药23天后; 出现乏力、恶心、腹胀、纳差。检查结果显示患者肝功能异常, 临床诊断为药物性肝损伤。排除了其他因素后, 停用复方青黛丸, 肝功能逐步恢复正常。查阅患者病历, 患者2年前服用该药20天, 也曾出现相同症状。

94. 该患者肝功能异常的不良反与复方青黛丸之间的因果关系应评价为(D)

- A. 很可能
- B. 可能
- C. 可能无关
- D. 肯定
- E. 无法评价

95. 复方青黛丸常见的不良反应不包括(C)

- A. 头晕
- B. 腹痛腹泻
- C. 肾功能损伤
- D. 胃肠道出血
- E. 肝功能异常

第02讲 中药不良反应 (二)

(九) 复方青黛丸 (胶丸、胶囊、片)
《中国药典》中规定, 复方青黛丸为妊娠慎用中成药。

方面	具体内容
不良反应	腹泻、腹痛、肝炎、肝功能异常、头晕、 <u>药物性肝损害和胃肠出血</u>
用药指导	①患者在医师指导下严格按照说明书用法用量用药, 用药期间注意监测肝生化指标、血象及患者临床表现, 若出现肝生化指标异常、便血及腹泻等, 应立即停药, 及时就医。 ②孕妇和对本品过敏者禁用, 肝脏生化指标异常、痒、白细胞低者禁用

(三)
某女, 25岁。月经延迟, 小腹胀痛拒按, 经血量少, 血色紫暗有块, 经行不畅, 经前胸胁、乳房胀痛, 饮食可, 二便调; 舌暗, 苔白, 脉弦。

96. 根据中医诊法理论与实践; 本病例所见小腹胀痛, 经前胸胁、乳房胀痛的病机分析是 (B)

- A. 气虚
- B. 气滞
- C. 血虚
- D. 血瘀
- E. 气逆

97. 四诊合参, 本病例的中医辨证是 (A)

- A. 气滞血瘀
- B. 阳虚内寒
- C. 瘀血阻络
- D. 寒滞肝脉
- E. 寒凝气滞

第06讲 月经不调、痛经、崩漏、带下过多、绝经前后诸症

续表

证候	辨证	症状	治法	方剂	中成药
月经后期		经期错后, 量少色淡, 经质清稀, 腰膝酸软, 头晕耳鸣, 肾虚带下清稀, 心悸失眠, 面色血少晦暗, 或面部暗斑。舌淡暗, 苔薄白, 脉沉细无力	补肾益气、养血调经	归肾丸合四物汤	乌鸡白凤丸 (胶囊、片)、归苻地黄丸、春血安胶囊
		经期延后, 经量偏少, 经色暗红, 或有血块, 小腹胀痛, 精神抑郁, 胸闷不舒。舌苔正常, 脉弦	活血行气, 化瘀止痛	膈下逐瘀汤	调经丸、益母丸、调经活血片

(四)
某男, 48岁。因口渴多饮、多食、多尿、腰膝酸软、四肢乏力等不适症状就诊, 近2月来体重下降5kg, 相关检查显示随机血糖 15mmol/L, HbA1c 8.5%, 临床诊断为2型糖尿病。

98. HbA1c 是目前临床诊断糖尿病常用检测指标之一, 其水平反映近2~3月的平均血糖水平, 正常参考值应为(B)

- A. 3.5%~6%
- B. 4%~6%
- C. 5%~7.1%
- D. 5%~7.8%
- E. 5%~8%



名称	具体内容
参考值	4%~6%
临床意义	①评价糖尿病控制程度: HbA1c水平与血糖浓度呈正相关, 可作为糖尿病长期控制状况的良好观察指标; ②鉴别高血糖: 糖尿病高血糖时HbA1c水平升高, 高血糖的HbA1c水平正常; ③预测血管并发症: 糖尿病患者HbA1c > 10%, 并发症严重; ④HbA1c降低: 贫血, 或红细胞更新率增加

99. 医师开具格列本脲, 执业药师进行用药指导时, 建议不要自行同服含有相同西药成分的中成药。下列药物中含有格列本脲的是(C)

- A. 十味玉泉胶囊
- B. 金芪降糖片
- C. 消糖灵胶囊
- D. 糖脉康胶囊
- E. 渴乐宁胶囊



第02讲 中药的合理应用(二)

四、含西药组分的中成药品种及使用注意事项

(一) 含西药组分的中成药

分类	西药成分	中成药品种
抗感冒药	马来酸氯苯那敏	速感康胶囊、维C银翘片、感冒清片、速感宁胶囊、感冒灵胶囊、感特灵胶囊、治感佳片、复方感冒灵片、感冒安片等
	对乙酰氨基酚	感冒灵胶囊、感特灵胶囊、复方感冒灵片、新复方大青叶片、感冒安片
	咖啡因	重感冒灵片
	安乃近	小儿解热栓
儿科用药	安乃近	小儿解热栓
止咳、平喘、化痰药	盐酸麻黄碱	安嗽糖浆、苏菲咳糖浆、舒肺糖浆、散痰宁糖浆、天一止咳糖浆、镇咳宁糖浆、消咳宁片
糖尿病药	格列本脲	消渴丸、消糖灵胶囊
其他类用药	吡哆美辛	新痕片
	对乙酰氨基酚	腰息痛胶囊
降压药	盐酸可乐定、氢氯噻嗪	珍菊降压片

100. 该患者近期偶患感冒, 发热, 头痛, 咳嗽, 咽痛, 不宜选用的中成药是 (B)

- A. 桑菊感冒丸
- B. 感冒清热颗粒
- C. 银翘解毒胶囊
- D. 双黄连胶囊
- E. 复方金黄连颗粒

第03讲 感冒、咳嗽、喉证、胸痹、不寐、胃痛

感冒

辨证	症状	治法	方剂	中成药
风寒感冒	恶寒重, 发热轻, 无汗头痛, 肢体酸痛, 或鼻塞声重, 或鼻痒喷嚏, 流涕清稀, 咽痒, 咳嗽, 痰吐稀白。舌苔薄白, 脉浮紧	辛温解表, 宣肺散寒	荆防败毒散	感冒清热颗粒、正柴胡饮颗粒、表实感冒颗粒
风热感冒	身热较著, 微恶风, 头胀痛, 或咳嗽少痰, 或痰出不爽, 咽痛咽红, 口渴。舌边尖红, 苔薄白或微黄, 脉浮数	清热宣肺解表	银翘散	银翘解毒片、方金黄连颗粒、桑菊感冒片

(五)

某男, 57岁。自诉眩晕, 动则加剧, 常因劳累而加重, 心悸少寐入睡困难, 神疲懒言, 食欲不振, 面色无华; 舌淡, 脉细弱。

101. 中医辨证是 (C)

- A. 痰浊上蒙
- B. 气阴两虚
- C. 气血两虚
- D. 肝肾阴虚
- E. 脾胃气虚

102. 宜采用的治法是 (B)

- A. 滋肾柔肝
- B. 益气养血
- C. 涤痰宣窍
- D. 益气养阴
- E. 益气健脾

103. 宜选用的方剂是(C)

- A. 朱砂安神丸加减
- B. 涤痰汤加减
- C. 八珍汤加减
- D. 杞菊地黄丸加减
- E. 生脉散加减

104. 宜选用的中成药是(D)

- A. 半夏天麻丸
- B. 左归丸
- C. 养血安神丸
- D. 归脾丸
- E. 补中益气丸

辨证	症状	治法	方剂	中成药
肝火上扰	眩晕耳鸣, 头胀目痛, 每因恼怒或疲劳而头晕、头痛加剧, 急躁易怒, 少寐多梦, 时颜面潮红, 口苦便秘, 舌红, 苔黄, 脉弦	清肝泻火	龙胆泻肝汤	龙胆泻肝丸、当归龙荟丸
气血亏虚	眩晕动则加剧, 劳累即发, 面色(白光)白, 唇甲无华, 心悸少寐, 神疲懒言, 饮食减少, 舌淡, 脉细弱	益气养血	八珍汤	归脾丸、八珍颗粒、十全大补丸

(六)

某女, 36 岁。平素汗出较多, 易患感冒; 因近日鼻塞不通、常流脓涕、前额头痛等不适症状就诊。医师诊断为鼻渊, 辨证为风热蕴肺兼表虚不固, 开具饮片处方如下:

XX 医院处方笺

就诊卡号: XXXXXX

就诊科室: 中医科门诊

姓名: XXx

性别: 女

年龄: 36

费用别: 医保

临床诊断: 鼻渊

黄芪 15g	炒苍耳子 15g	青蒿 10g
炒白术 15g	防风 10g	白芷 128g
辛夷 10g	黄芩 12g	薄荷 5g
菊花 10g	龙胆草 9g	甘草 6g

7剂, 水煎服

医师签名(签章): xxx

xxx年X月X日

金额: xxx 审核/调配签名(签章): xx 核对/发药签名(签章): xx

105. 该患者服用7剂后, 出现恶心、呕吐、食少等症状, 相关检查显示血ALT、AST显著升高, 处方中最可能引起该不良反应的中药是(B)

- A. 黄芩
- B. 苍耳子
- C. 龙胆草
- D. 白芷
- E. 青蒿

106. 该中药中引起肝损伤的主要化学物质属于(A)

- A. 毒蛋白类
- B. 多肽类
- C. 黄酮类
- D. 生物碱类
- E. 萜类

大分类	小分类	具体药物
植物类	生物碱类	千里光属(千里光、菊三七)、款冬属、泽兰属、紫草属、天芥菜属
	皂苷类	三七、商陆、黄药子
	毒蛋白类	苍耳子、蓖麻子、望江南子、相思豆
	多肽类	毒蕈伞
	萜与内酯类	川楝子、黄药子、艾叶
	鞣质类	五倍子、石榴皮、诃子

某男, 45岁。平素喜饮浓茶, 嗜好烟酒; 经常熬夜。现入睡困难, 且多梦易醒心悸健忘, 虚烦不安, 时有盗汗; 舌淡, 苔薄, 脉细。医师诊断为不寐。

107. 中医辨证是(D)

- A. 心火炽盛
- B. 肝气郁结
- C. 心脾两虚
- D. 阴血亏虚
- E. 心肾不交

108. 宜采用的治法是(B)

- A. 交通心肾

- B. 滋阴养血
- C. 清心泻火
- D. 疏肝解郁
- E. 健脾养心

109. 宜选用的方剂是(D.)

- A. 逍遥散加减
- B. 温胆汤加减
- C. 朱砂安神丸加减
- D. 天王补心丹加减
- E. 交泰丸加减

110. 对该患者的健康指导, 正确的是(D)

- A. 晚餐不宜过饱, 不饮浓茶, 睡前推荐阅读; 11 点前入睡.
- B. 晚餐尽量饱食, 不饮浓茶; 睡前避免阅读, 11 点后入睡
- C. 晚餐不宜过饱, 不饮浓茶, 睡前推荐阅读, 11 点后入睡
- D. 晚餐不宜过饱, 不饮浓茶, 睡前避免阅读, 11 点前入睡
- E. 晚餐尽量饱食不饮浓茶, 睡前避免阅读, 11 点前入睡

续表

辨证	症状	治法	方剂	中成药
阴血亏虚	不寐, 健忘, 心悸怔忡, 虚烦不安, 甚则盗汗, 梦遗等。舌偏淡, 苔薄少, 脉细或细数	滋阴养血	天王补心丹	天王补心丸、养血安神丸
心脾两虚	不易入睡, 多梦易醒, 心悸健忘, 神疲食少, 四肢倦怠, 腹胀便溏, 面色少华, 舌淡苔薄, 脉细无力	健脾养心	归脾汤	归脾丸、心宁

四、多项选择题

111. 盐酸麻黄碱有较强的兴奋中枢神经作用, 大剂量使用可引起失眠、头痛、心悸、心动过速等不良反应, 故高血压、动脉硬化、心绞痛患者应禁用。含盐酸麻黄碱成分的中成药有(

ABDE)

- A. 安嗽糖浆
- B. 舒肺糖浆
- C. 川贝枇杷糖浆
- D. 苏菲咳糖浆
- E. 镇咳宁糖浆

第02讲 中药的合理应用(二)

四、含西药组分的中成药品种及使用注意事项

(一) 含西药组分的中成药

分类	西药成分	中成药品种
抗感冒药	马来酸氯苯那敏	速感康胶囊、维C银翘片、感冒清片、速感宁胶囊、感冒灵胶囊、感特灵胶囊、治感佳片、复方感冒灵片、感冒安片等
	对乙酰氨基酚	感冒灵胶囊、感特灵胶囊、复方感冒灵片、新复方大青叶片、感冒安片
	咖啡因	重感冒灵片
	安乃近	小儿解热栓
儿科用药	安乃近	小儿解热栓
止咳、平喘、化痰药	盐酸麻黄碱	安嗽糖浆、苏菲咳糖浆、舒肺糖浆、散痰宁糖浆、天一止咳糖浆、镇咳宁糖浆、消咳宁片
糖尿病药	格列本脲	消渴丸、消糖灵胶囊
其他类用药	吲哚美辛	新癢片
	对乙酰氨基酚	腰息痛胶囊
降压药	盐酸可乐定、氢氯噻嗪	珍菊降压片

112. 婴幼儿患者合理应用中药的原则有(ABCE)


- A: 用量宜轻
- B. 宜用轻清之品
- C. 宜用健脾和胃之品
- D. 宜用滋补之品
- E. 宜佐凉肝定惊之品

第三节 婴幼儿患者的中药应用

考点精讲


一、婴幼儿患者合理应用中药的原则

婴幼儿患者合理应用中药的原则	具体的原因和可选用的药物
用药及时, 用量宜轻	用药及时: 小儿得病急, 变化快 用量宜轻: 小儿脏腑娇嫩, 对药物敏感, 用量宜轻
宜用轻清之品	小儿脏气清灵, 对大苦、大辛、大寒和药性峻烈的药物要慎用
宜佐健脾和胃之品	原因: 小儿脾气不足, 消化能力弱 所用药物: 需使用消食导滞的药物, 如山楂、陈皮、六神曲、麦芽、鸡内金等



113. 根据未病先防的原则, 培养正气, 提高抗病能力的方法有(BCD)

- A. 讲究卫生
- B. 注意起居
- C. 锻炼身体
- D. 人工免疫
- E. 避免病邪



114. 某女, 75岁。形体较瘦, 头晕耳鸣, 眼目干涩, 口燥咽干, 潮热颧红, 五心烦热盗汗, 小便短黄, 大便干结: 舌红, 无苔, 脉细数。可选用的中成药有(ABC)

- A. 左归丸
- B. 六味地黄丸
- C. 杞菊地黄丸
- D. 右归丸
- E. 济生肾气丸

第04讲 淋证、癃闭、阳痿、郁证、虚劳、痹证、中暑

虚劳

辨证	症状	治法	方剂	中成药
气虚	神疲乏力, 少气懒言, 声音低微, 头晕, 自汗, 不思饮食, 活动后诸症加重。舌质淡, 或有齿痕, 苔薄白, 脉虚无力	益气补虚	四君子汤	四君子丸、玉屏风颗粒、补中益气丸、参芪口服液
血虚	头晕眼花, 心悸多梦, 手足发麻, 面色萎黄, 口唇、爪甲色淡, 妇女月经量少。舌质淡, 脉细	补血养肝	四物汤	四物颗粒、当归补血口服液、八珍颗粒、十全大补膏(丸)
阴虚	形体消瘦, 口燥咽干, 潮热盗汗, 五心烦热, 盗汗, 小便短黄, 大便干结。舌质红, 舌面少津, 苔少或无苔, 脉细数	养阴生津	沙参麦冬汤	六味地黄丸、大补阴丸、知柏地黄丸、左归丸、麦味地黄丸

115. 某女 45 岁, 自觉畏寒, 腰膝冷痛, 面白; 舌淡, 脉沉迟。辨证为阳虚证, 可采用的治法有 (CDE)

- A. 阳病治阴
- B. 阳中求阴
- C. 阴阳双补
- D. 阴病治阳
- E. 阴中求阳

116. 中药饮片斗谱的编排是否科学、合理, 直接影响配方效率和质量。处方中常以药对出现可放于同一斗中的饮片有 (ABDE)

- A. 射干、北豆根
- B. 盐杜仲、盐续断
- C. 姜半夏、淡附片
- D. 羌活、独活
- E. 知母、浙贝母

续表

斗谱编排的基本原则	可同放于一个斗中——同一处方中经常一起配伍应用的“药对”药物, 如麻黄、桂枝; 酸枣仁、远志; 射干、北豆根; 党参、黄芪; 桃仁、红花; 杜仲、续断; 陈皮、青皮; 泽泻、猪苓; 山药、薏苡仁; 板蓝根、大青叶; 辛夷、苍耳子; 羌活、独活; 麻仁、郁李仁; 羌活、独活; 苍术、白术; 麦冬、天冬; 乌、草乌; 知母、浙贝母; 蒲公英、紫花地丁; 藜芦、三棱、莪术; 乳香、没药; 小茴香、橘核
谱编排时还应参考的其他原则	属于配伍禁忌的药物, 不能装于一斗或上下药斗中。类与半夏的各种炮制品、瓜蒌; 甘草与京大戟、甘遂; 藜芦与丹参、南沙参、玄参、苦参、白芍、赤芍; 香与郁金; 芒硝与京三棱; 肉桂与石脂均不宜放在

117. 某男, 35岁。大便干结, 面红身热, 口臭口干, 腹胀腹痛; 活红, 苔黄, 脉滑, 数医师给予大承气汤, 效果显著。该方剂体现的治法有(CE)

- A. 塞因塞用
- B. 热因热用
- C. 实则泻之
- D. 通因通用
- E. 热者寒之



第01讲 治则与治法

正保医学教育网 www.med66.com

(二) 正治与反治 → 难 → 不补

治则	治法	治法用药	适应	适应症分类
正治 (逆治)	寒者热之	寒性病证出现寒象, 用温热方药进行治疗	实寒证	用辛温解表药
	热者寒之	热性病证出现热象, 用寒凉方药进行治疗	实热证	用辛热温里药
	虚则补之	虚损性病证出现虚象, 用补益作用的方药进行治疗	虚证	用辛凉解表药
	实则泻之	实性病证出现实象, 用攻逐邪实的方药进行治疗	实证	用寒凉泻里药

学教育网 www.med66.com

118. 药学咨询服务是执业药师应用所学专业面向患者、医护人员、公众等提供直接的、负责任的、与药品使用有关的服务, 润德教育整理以期增强患者用药的依从性, 减少药物不良反应, 提高药物治疗的安全性、有效性与经济性。执业药师在用药咨询过程中的沟通技巧包括(ABCE)

- A. 认真倾听
- B. 注意语言表达
- C. 注意非语言的运用
- D. 咨询时间宜长不宜短
- E. 提供的信息不宜过多



第01讲 中药文献信息与咨询服务


正保医学教育网 www.med66.com

三、咨询技巧

(一) 沟通技巧

1. 认真聆听: 药师要仔细听取揣摩患者表述信息的内容
2. 注意语言的表达: 药师在与患者沟通时注意多使用通俗易懂的语言。
3. 注意非语言的运用: 药师与患者交谈时, 眼对方, 观察对方的表情变化。

学教育网 www.med66.com



119. 某男, 78岁。患多种慢性病, 因腰腿疼痛、头晕失眠等不适症状就诊。医师开具中成药处方如下:

xx 医院处方笺

就诊卡号: xxxx 就诊科室: 中医科门诊

姓名: XX 性别: 男 年龄: 78 费别: 医保

临床诊断:	风湿骨痛胶囊 0.3gX32	3盒	3粒	口服	一日两次
痹症	松龄血脉康胶囊 0.5gX24	2盒	3粒	口服	一日三次
眩晕	养血安神片 0.25gX100	2盒	5片	口服	一日三次
不寐	乌灵胶囊 0.33gX36	5盒	3粒	口服	一日三次
	金匱肾气丸 0.2gX360	2盒	20粒	口服	一日两次

医师签名(签章): xxx
xxx 年 X 月 X 日

金额: xxx 审核/调配签名(签章): xx 核对/发药签名(签章): xx

执业药师审方时, 发现该处方中多种中成药均含有乌头类药, 可能加大患者发生不良反应的风险。该处方中含有乌头类药的中成药有(BD)

- A. 乌灵胶囊
- B. 金匱肾气丸
- C. 养血安神片
- D. 风湿骨痛胶囊
- E. 松龄血脉康胶囊

第四节 医疗用毒性中药的中毒反应和基本救治原则

一、乌头类药物

名称	具体内容	
含乌头的中药材	川乌、草乌、附子、雪上一枝蒿等	
中成药	追风丸、追风透骨丸、三七伤药片、附子理中丸、金匱肾气丸、小金丸、风湿骨痛胶囊、祛风止痛片、祛风舒筋丸、归丸等	
中毒机理	主要有毒成分: 乌头碱, 中毒量为0.2mg, 致死量为0.5-1.0mg	
中毒表现	神经系统	口舌、四肢及全身麻木、头痛、头晕、视力模糊或小便失禁, 继而四肢抽搐、牙关紧闭、呼吸衰竭等
	循环系统	心悸气短、心律失常、血压下降、面色苍白、四肢厥冷等
	消化系统	流涎、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、肠鸣音亢进等

120. 含汞的药物服用过量或长期服用会出现腹痛腹泻, 口中有金属味, 流涎牙龈肿胀溃烂, 少尿, 蛋白尿, 严重者可发生急性肾功能衰竭。含汞的中药有(ACDE)

- A. 朱砂
- B. 雄黄
- C. 轻粉
- D. 银朱
- E. 红粉