

【内科学】

痛风急性发作期首发症状为

- A. 急性关节炎
- B. 痛风肾病
- C. 痛风石
- D. 慢性关节炎
- E. 尿路结石

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案为 A

急性发作期常因高蛋白高嘌呤饮食、饮酒、劳累、【医学教育网原创】感染、创伤等诱因诱发，表现为急性关节炎，多是首发症状。

故本题答案选 A。

【中医妇科学】

调经散用于治疗产后抑郁的病证为

- A. 肝经郁热证
- B. 气血虚弱证
- C. 肝郁气结证
- D. 心脾两虚证
- E. 瘀血内阻证

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

产后抑郁之瘀血内阻证

主要证候：产后抑郁寡欢，默默不语，失眠多梦，神【医学教育网原创】志恍惚；恶露淋漓日久，色紫黯有块，面色晦暗；舌暗有瘀斑，苔白，脉弦或涩。

治法：活血逐瘀，镇静安神。

方药：调经散或芎归泻心汤

故最佳的选项是 E。

【中医诊断学】

下列不属于肝阳上亢证临床表现的是

- A. 眩晕耳鸣
- B. 面红目赤
- C. 急躁易怒
- D. 腰膝酸软
- E. 大便秘结

**答案及解析：**本题答案为 E。

肝阳上亢证临床表现：眩晕耳鸣，头目胀痛，【医学教育网原创】面红目赤，急躁易怒，失眠多梦，头重脚轻，腰膝酸软，舌红少津，脉弦有力或弦细数。选项 E 中大便秘结见于肝火炽盛证。故根据题干要求，此题的正确选项是 E。

故本题答案为 E。

### 【中医儿科学】

治疗小儿遗尿肾气不足证的首选方剂为

- A. 缩泉丸
- B. 导赤散
- C. 菟丝子散
- D. 金匱肾气丸
- E. 桑螵蛸散

**学员提问：**为什么选 C？

**答案及解析：**本题答案为 C。

遗尿肾气不足证

证候：寐中多遗，可达数次，小便清长，面白少华，神疲乏力，智力较同龄儿稍差，肢冷畏寒，舌质淡，苔白滑，脉沉无力。

治法：温补肾阳，固涩膀胱。

代表方剂：菟丝子散。

故本题答案选 C。

**【中医妇科学】**

与面瘫关系密切的经筋是

- A. 足太阳、足阳明经筋
- B. 手阳明、足太阳经筋
- C. 足阳明、手太阳经筋
- D. 足厥阴、手阳明经筋
- E. 手少阳、足太阳经筋

**学员提问：**为什么选 C？

**答案及解析：**本题答案 C。

病位在面部，与太阳、阳明经筋有关。手足阳经均上行头【医学教育网原创】面部，当邪气阻滞面部经络，尤其是手太阳和足阳明经筋功能失调，可导致面瘫的发生。

故本题答案选 C。