

中西医医师

中西医妇科学练习题

主讲：江行桐

时长：180 分钟

一、A 型题

1. 子宫峡部的上界为

- A. 组织学内口
- B. 组织学外口
- C. 解剖学内口
- D. 解剖学外口
- E. 宫颈内口

2. 子宫最狭窄的部分是

- A. 组织学内口
- B. 解剖学内口
- C. 子宫颈管
- D. 子宫峡部
- E. 子宫外口

3. 古籍中有关子宫的名称错误的是

- A. 胞宫
- B. 女子胞
- C. 子处
- D. 子门
- E. 血室

4. 中医对外生殖器的描述中，不包括

- A. 子门
- B. 产户
- C. 阴户

- D. 玉门
- E. 胞门

5. 子宫内膜从增生期变成分泌期, 其最直接原因是

- A. 促性腺激素释放激素的作用
- B. 促性腺激素的作用
- C. 雌激素的作用
- D. 孕激素的作用
- E. HCG 的作用

6. 孕激素的生理作用下述正确的是

- A. 使子宫肌肉对催产素的敏感性增强
- B. 使阴道上皮角化, 糖原增加
- C. 单独使子宫内膜呈分泌期变化
- D. 使宫颈口闭合, 黏液减少变稠, 拉丝度减少
- E. 促进骨中钙的沉积

7. 月经初潮的年龄多在

- A. 9~10 岁之间
- B. 11~12 岁之间
- C. 13~14 岁之间
- D. 15~16 岁之间
- E. 17~18 岁之间

8. 肾气、天癸、气血、冲任在产生月经的机理中各有其重要作用, 但均需通过何处来完成

- A. 天癸
- B. 经络
- C. 胞宫

- D. 胞脉
- E. 胞络

9. 孕妇开始自觉胎动的时间是

- A. 妊娠 12~16 周
- B. 妊娠 16~20 周
- C. 妊娠 22~24 周
- D. 妊娠 25~26 周
- E. 妊娠 27 周以上

10. 中医学认为，受孕机理在于

- A. 肾气充盛，天癸成熟
- B. 冲任二脉正常
- C. 胞宫功能正常
- D. 氤氲之时的候
- E. 以上都是

11. 关于人绒毛膜促性腺激素的叙述，下列哪项正确

- A. 绒毛细胞滋养细胞产生
- B. 受精后 10 日开始分泌
- C. 为诊断早孕的最敏感方法
- D. 为糖蛋白激素，产后 1 周内消失
- E. 至妊娠 14~16 天达高峰，持续 1~2 周后下降

12. 做产前检查应常规每周 1 次的是

- A. 孕 20~24 周
- B. 孕 25~28 周
- C. 孕 29~32 周
- D. 孕 33~36 周

E. 孕 37~41 周

13. 预产期的计算是从

- A. 末次月经结束那天算起
- B. 受孕前月排卵期算起
- C. 末次性生活算起
- D. 末次月经第 14 天算起
- E. 末次月经来潮第 1 天算起

14. 对于妊娠期的妇女，下列何种药物应慎用

- A. 桃仁
- B. 牛膝
- C. 干姜
- D. 木通
- E. 以上都是

15. 枕先露肛诊检查时，胎头下降程度为+2 是指

- A. 胎头最低点在坐骨棘平面下 2cm
- B. 胎儿头部最低在坐骨结节平面下 2cm
- C. 胎头颅骨最低点在坐骨棘平面下 2cm
- D. 胎儿顶骨在坐骨棘平面上 2cm
- E. 胎儿顶骨在坐骨结节平面上 2cm

16. 观察产程时关于胎心监护的注意事项，下列何项错误

- A. 听诊胎心应在宫缩间歇期进行
- B. 每次听诊时间为 1 分钟
- C. 潜伏期应每 1~2 小时一次
- D. 活跃期应每 30 分钟一次
- E. 第二产程每 20 分钟一次

17. 临产的主要标志是

- A. 见红，规律宫缩，胎头下降
- B. 规律宫缩，破膜，胎头下降
- C. 见红，破膜，宫口扩张
- D. 规律宫缩，胎头下降，宫口扩张
- E. 见红，破膜，规律宫缩

18. 正常分娩时最主要的产力是

- A. 子宫收缩力
- B. 肛提肌收缩力
- C. 腹肌收缩力
- D. 膈肌收缩力
- E. 骨骼肌收缩力

19. 正常枕先露分娩机制，下述哪项正确

- A. 下降，衔接，内旋转，俯屈，仰伸复位，外旋转
- B. 衔接，俯屈，内旋转，下降，仰伸复位，外旋转
- C. 衔接，下降，俯屈，内旋转，仰伸复位，外旋转
- D. 下降，俯屈，衔接，内旋转，仰伸复位，外旋转
- E. 衔接，下降，内旋转，俯屈，仰伸复位，外旋转

20. 产后泌乳热持续时间通常为

- A. 1~4 小时
- B. 2~8 小时
- C. 4~16 小时
- D. 5~20 小时
- E. 6~24 小时

21. 产后子宫恢复至孕前大小是在

- A. 产后 1 周
- B. 产后 10 天
- C. 产后 15 天
- D. 产后 4 周
- E. 产后 6 周

22. 子宫下降入盆腔内是在

- A. 胎盘娩出后
- B. 产后第 1 日
- C. 产后 1 周
- D. 产后 10 日
- E. 产后 4 周

23. 引起妇科病中医病因中, 生活失调的病因不包括的是

- A. 饮食不节
- B. 劳逸失度
- C. 内伤七情
- D. 房劳多产
- E. 跌仆损伤

24. 妇科常见情志致病因素为

- A. 喜、怒、忧
- B. 怒、思、恐
- C. 忧、恐、惊
- D. 喜、忧、恐
- E. 喜、悲、惊

25. 肾阴亏损, 精血不足, 胞脉失养则可出现

A. 经行先后无定期

B. 经行后期，月经过少

C. 月经先期，崩中漏下

D. 经行泄泻，宫寒不孕

E. 带下

26. 下列除哪项外，余则皆是热伤冲任所致病证

A. 月经先期

B. 月经过多

C. 月经过少

D. 崩漏

E. 经行吐衄

27. 妇科疾病的发病机理，可概括为

A. 脏腑功能失常，气血失调，冲任督带损伤以及胞宫、胞脉、胞络受损

B. 先天肾气不足，后天房劳多产损伤肾精，肾为冲任之本，肾虚，冲任不固

C. 情志内伤，肝气郁结，血为气滞，冲任失调

D. 忧思劳倦，饮食不节，损伤脾气，脾失统摄，气随血陷，冲任不固

E. 忧愁思虑，心阴暗耗，营血不足，冲任虚损

28. 易出现月经先期、经期延长、漏下、胎漏等病的是

A. 素体阴虚者

B. 素体阳虚者

C. 体质强健者

D. 偏脾虚者

E. 偏肝郁者

29. 伴随症状在平时持续存在，经期加重者属于

A. 肝郁脾虚

- B. 湿热蕴结
- C. 肝郁气滞
- D. 脾肾阳虚
- E. 气血虚弱

30. 下列哪项不是气肿的特点

- A. 肿胀部位不定
- B. 按之明显凹陷
- C. 随按随起
- D. 为气滞湿阻所致
- E. 肿胀程度不重

31. 下列哪项属于产后三急

- A. 恶心
- B. 头痛
- C. 盗汗
- D. 自汗
- E. 腹痛

32. 脾虚失运致经行泄泻，治宜

- A. 益气养阴
- B. 温阳行水
- C. 祛痰化湿
- D. 健脾益气，升阳除湿
- E. 温肾健脾，温阳行水

33. 脾胃虚弱，化源不足，血海不盈所致的月经后期选用的代表方为

- A. 白术散
- B. 举元煎

C. 完带汤

D. 四君子汤

E. 苏叶黄连汤

34. 以下哪项不可以用宫腔注药法

A. 阴道流血

B. 输卵管炎

C. 输卵管阻塞

D. 子宫内膜炎

E. 以上都是

35. 妊娠 12 周以内，胚胎自然殒堕者，称为

A. 小产

B. 半产

C. 暗产

D. 堕胎

E. 滑胎

36. 前置胎盘患者终止妊娠的指征不包括

A. 反复大量流血甚至休克者

B. 胎龄达 35 周以上

C. 胎儿成熟度检查提示胎儿肺成熟

D. 胎龄未达 36 周，出现胎儿窘迫征象

E. 胎儿出现难以存活的畸形

37. 以下不属于子痫治疗原则的是

A. 开放呼吸道

B. 控制抽搐

C. 控制血压

D. 纠正缺氧和酸中毒

E. 抽搐控制后终止妊娠

38. 关于异位妊娠的临床表现说法错误的是

A. 有 6~8 周的停经史

B. 突感下腹一侧撕裂样剧痛

C. 阴道少量不规则流血

D. 腹腔内大出血而致晕厥

E. 阴道后穹隆常不饱满

39. 输卵管妊娠最主要的病因是

A. 输卵管炎症

B. 辅助生殖技术

C. 输卵管手术史

D. 输卵管发育不良

E. 盆腔内肿瘤压迫

40. 治疗妊娠剧吐肝胃不和证，应首选的方药是

A. 香砂六君子汤加生姜

B. 生脉散合增液汤

C. 逍遥散

D. 橘皮竹茹汤加黄连

E. 柴胡疏肝散

41. 胎膜早破的西医病因有

A. 生殖道感染

B. 胎膜受力不均

C. 创伤

D. 羊膜腔压力增高

E. 以上都是

42. 产后出血的常见病因是

- A. 胎盘因素
- B. 软产道裂伤
- C. 凝血功能障碍
- D. 子宫收缩乏力
- E. 以上都是

43. 产后三冲是指

- A. 冲心、冲胃、冲肺
- B. 冲心、冲肺、冲肝
- C. 冲心、冲脾、冲肺
- D. 冲脾、冲肝、冲肾
- E. 冲心、冲肝、冲肾

44. 外阴慢性单纯性苔藓皮肤损害特点除外下列哪项

- A. 皮肤颜色黯红或粉红
- B. 皮肤色白
- C. 皮肤增厚似皮革
- D. 皮肤表面光滑润泽
- E. 皮损常呈对称性

45. 盆腔炎性疾病的中医病因病机为

- A. 气虚和肾虚
- B. 肾虚和血瘀
- C. 热毒炽盛、湿热瘀结
- D. 肝郁气滞和湿热下注
- E. 气虚、肾虚、血瘀、气滞

46. 为确定排卵和黄体功能，诊刮的最佳时间为

- A. 可随时诊刮
- B. 月经第 5 天
- C. 在经前 1-2 日或月经来潮 6 小时内
- D. 月经来潮 24 小时内
- E. 月经来潮 12 小时内

47. 排卵障碍性异常子宫出血常见的中医病因病机不包括

- A. 肾虚
- B. 脾虚
- C. 虚寒
- D. 血热
- E. 血瘀

48. 宫颈癌的转移途径最常见的是

- A. 直接蔓延
- B. 淋巴转移
- C. 血行转移
- D. 浸润播散
- E. 肺肝转移

49. 确诊子宫内膜癌的主要依据是

- A. CT
- B. MRI
- C. 宫腔镜检查
- D. B 型超声检查
- E. 诊断性刮宫

50. 下述诊断葡萄胎最常用而又比较准确的方法是

- A. 出现卵巢黄素化囊肿
- B. 妊娠试验
- C. 超声诊断
- D. 子宫大于孕月
- E. 停经后阴道出血

51. 葡萄胎的随访时间第一次 HCG 阴性后共计为

- A. 3 个月
- B. 6 个月
- C. 1 年
- D. 2 年
- E. 3 年

52. 下列哪项不是盆腔子宫内膜异位症的主症

- A. 痛经
- B. 性交痛
- C. 白带量多，色黄
- D. 不孕
- E. 月经不调

53. 最容易被子宫内膜异位症侵犯的器官是

- A. 卵巢
- B. 输卵管
- C. 肠管
- D. 输尿管
- E. 膀胱

54. 经期或经后腹痛，喜温喜按，月经色淡质稀，神疲乏力，下腹积块，腹腔镜

检查诊断为子宫内膜异位症，首选方剂为

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 桃红四物汤
- E. 理冲汤

55. 子宫脱垂最主要的病因是

- A. 慢性咳嗽
- B. 大量腹水
- C. 分娩损伤
- D. 经常超重负荷
- E. 长期排便困难

56. 下列关于放置宫内节育器的叙述，错误的是

- A. 自愿要求以 IUD 避孕者均可放置
- B. 禁忌症为生殖道急性炎症
- C. 禁忌症为妊娠或妊娠可疑
- D. 禁忌症为宫颈内口过松者
- E. 禁忌症为有生殖器肿瘤者

57. 新婚期避孕一般不选用

- A. 避孕套
- B. 宫内节育器
- C. 口服短效避孕药
- D. 女性外用避孕药
- E. 以上均非

58. 若月经周期是 25 天，估计排卵应在月经周期的第几天

- A. 5 天
- B. 8 天
- C. 11 天
- D. 14 天
- E. 18 天

59. 不孕症的常见病因病机不包括

- A. 肾虚
- B. 脾虚
- C. 肝气郁结
- D. 痰湿壅阻
- E. 瘀滞胞宫

二、A2

1. 25 岁妇女, 月经规律, 6/35 天一次, 末次月经 8 月 20 日, 推算其排卵期应在

- A. 9 月 11 日左右
- B. 9 月 4 日左右
- C. 9 月 7 日左右
- D. 9 月 5 日左右
- E. 8 月 30 日左右

2. 女, 停经 45 天, 疑为早孕, 下列哪项与之不符

- A. 胃脘部略胀, 乏力
- B. 乳房胀感
- C. 检查发现子宫偏软略大
- D. 宫颈黏液检查黄体期见羊齿植物叶状结晶
- E. 阴道分泌物增多

3. 患者, 女, 31 岁, 以往有多次刮宫史, 妊娠 33 周出现无诱因、无痛性反复阴

道流血，该患者可考虑诊断为

- A. 胎膜早破
- B. 胎动不安
- C. 前置胎盘
- D. 异位妊娠
- E. 胎盘早剥

4. 患者，女，24 岁，孕后阴道下血，色黯红，腰酸腹痛下坠；舌边有瘀点，脉弦滑。选用的治法是

- A. 补肾益气，固冲安胎
- B. 补气养血，固肾安胎
- C. 清热凉血，固冲安胎
- D. 活血消癥，补肾安胎
- E. 补肾益气，调固冲任

5. 初孕妇，28 岁，妊娠 34 周，睡眠中突然出现大量阴道流液，起床后又有持续流液，因胎膜早破收入院。入院后诊断胎膜早破的检查方法有

- A. 阴道酸碱度检查
- B. 阴道液涂片检查
- C. 羊膜腔感染检查
- D. 超声检查
- E. 以上都有

6. 患者，女，32 岁，新产后，突然阴道大量下血，色黯红，夹有血块，小腹疼痛拒按，血块下后腹痛减轻；舌紫黯，脉沉涩。治疗首选

- A. 保阴煎
- B. 化瘀止崩汤
- C. 补中益气汤
- D. 升举大补汤

E. 生化汤合失笑散

7. 患者，女，26岁，新产后，突然阴道大量出血，血色鲜红，头晕目花，心悸怔忡，气短懒言，肢冷汗出，面色苍白；舌淡，脉虚细。选用的治法为

- A. 活血化瘀，调冲止血
- B. 活血化瘀，理血归经
- C. 补气固冲，摄血止崩
- D. 补脾益气，固冲摄血
- E. 养阴清热，安冲止血

8. 患者，女，23岁，产后乳汁甚少，乳汁浓稠，乳房胀硬，情志抑郁，食欲不振；舌质正常，苔微黄，脉弦。治疗首选

- A. 通乳丹
- B. 生化汤
- C. 独活寄生汤
- D. 下乳涌泉散
- E. 黄芪桂枝五物汤

9. 患者，女，30岁，已婚。产后20天，乳汁甚少而清稀，乳房小而柔软。分娩时曾出血过多，面色少华，食欲不振，神疲乏力，头晕心悸。舌淡白，脉虚细。其中医证型是

- A. 气血虚弱证
- B. 肝郁气滞证
- C. 脾肾两虚证
- D. 肝胃不和证
- E. 肝经郁热证

10. 患者，女，28岁，产后小便不通，小腹胀急疼痛，腰膝酸软，面色晦暗；舌淡，脉沉细迟弱。选用的治法是

- A. 益气生津，宣肺利水
- B. 补肾温阳，化气利水
- C. 养血活血，祛瘀利尿
- D. 理气行滞，行水利尿
- E. 温阳化气，补肾固脬

11. 女，28 岁，月经干净后开始出现外阴奇痒，灼热疼痛，带下量多，色黄气秽，局部皮肤黏膜粗糙肥厚或破损溃疡，渗流黄水，胸闷烦躁，口苦口干，溲赤便秘；舌红，苔黄腻，脉弦数。主方选用

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 五味消毒饮
- C. 易黄汤
- D. 萆薢胜湿汤
- E. 二妙散

12. 患者，女，45 岁，已婚。外阴干燥瘙痒三年，夜间尤甚，伴腰酸乏力，双目干涩，检查：双侧大阴唇及阴唇后联合处色素减退，局部皮肤薄膜粗糙。治疗应首选的方剂是

- A. 归肾丸合二至丸
- B. 归脾汤
- C. 黑逍遥散
- D. 右归丸
- E. 人参养荣汤

13. 患者，女，35 岁，已婚，半年前出现阴道分泌物增多，并伴有性交后出血。妇科检查：宫颈中度糜烂，颗粒状，接触性出血（+）。宫颈细胞学检查：轻度炎症。应首先考虑的治疗措施是

- A. 口服中药治疗
- B. 手术切除子宫

C. 局部物理治疗

D. 口服抗生素

E. LEEP 刀技术治疗

14. 患者，女，28 岁。外阴肿痛瘙痒伴有灼热感，带下增多，色黄质稠，气味秽臭，伴烦躁易怒，口干口苦；舌苔黄腻，脉弦数。其治疗首选方为

A. 萆薢渗湿汤

B. 龙胆泻肝汤

C. 五味消毒饮

D. 大黄牡丹汤

E. 仙方活命饮

15. 患者，女，27 岁，经间期少量出血，血色紫黯，有块，小腹疼痛拒按；舌紫黯，脉涩有力。治疗首选

A. 归脾汤

B. 逐瘀止血汤

C. 清肝止淋汤

D. 加减一阴煎

E. 桃红四物汤合失笑散

16. 患者，女，28 岁，经期或经后小腹绵绵作痛，经色淡，量少，腰膝酸软，头晕耳鸣；舌质淡，脉沉细弱。最佳诊断为

A. 痛经，气滞血瘀证

B. 痛经，寒湿凝滞证

C. 痛经，湿热瘀阻证

D. 痛经，气血虚弱证

E. 痛经，肝肾亏虚证

17. 患者，女，59 岁，小腹包块，小腹空坠，月经量多，经期延长，色淡有块，

神疲乏力，气短懒言，纳少便溏，面色无华；舌淡黯，边尖有瘀点，脉细涩。西医诊断为子宫肌瘤。选用的治法是

- A. 温经散寒，活血消癥
- B. 化痰除湿，活血消癥
- C. 补肾活血，消癥散结
- D. 益气养血，消癥散结
- E. 清热利湿，活血消癥

18. 女性，35 岁，2 年前剖宫产，近 1 年腹部瘢痕处肿块，伴周期性疼痛。检查：腹部手术瘢痕处下段扪及直径为 4cm 肿块，质地硬，触痛，尤以经期为甚。其诊断考虑为

- A. 腹部瘢痕感染
- B. 腹部陈旧性出血
- C. 腹部缝线异物反应
- D. 腹部子宫内膜异位症
- E. 腹部瘢痕疙瘩

19. 女性，30 岁，婚后 5 年不孕，近 6 年开始痛经，进行性加重，曾做子宫输卵管碘油造影，提示双侧输卵管通而不畅。妇科检查：阴道后穹隆扪及触痛结节，子宫大小正常，右附件扪及 4cm×4cm×3cm 大小不活动的囊性包块。为明确诊断，首选的检查应为

- A. 腹腔镜检查
- B. 宫腔镜检查
- C. B 超检查
- D. 剖腹产检查
- E. 盆腔 CT 检查

20. 患者，女，38 岁，痛经 6 年，每于经前小腹冷痛，经血有块，形寒肢冷，B 超发现左附件有低回声区。中医治疗的最佳方剂是

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 桃红四物汤
- E. 理冲汤

21. 女患者，结婚 3 年未孕，月经先期，量少色淡，头晕耳鸣，腰酸腿软，五心烦热。舌红，苔少，脉细数。检查排卵功能不良。治疗选方

- A. 开郁种玉汤
- B. 十全大补汤
- C. 启宫丸合四物汤
- D. 归肾丸合五子衍宗丸
- E. 养精种玉汤合清骨滋肾汤

22. 女患者，结婚 4 年未孕，月经周期不规律，经来腹痛，月经量少，色暗有小血块，经前乳胀，烦躁易怒。舌质暗红，舌苔薄白，脉弦。应首选

- A. 启宫丸
- B. 养精种玉汤
- C. 开郁种玉汤
- D. 少腹逐瘀汤
- E. 归肾丸

23. 女性，25 岁，结婚两年，因漏服避孕药后停经 50 天，尿妊娠试验阳性，阴道流血 1 周，少于月经量，间有腹痛，下列哪种处理措施最为理想

- A. 注射大量的安宫黄体酮保胎
- B. 镇静，卧床休息
- C. 人工流产
- D. 经保胎无效再人流
- E. 注射绒毛膜促性腺激素保胎

24. 一农妇，诉阴道脱出一物 3 年，查体：宫颈已脱出至阴道口外，宫体在阴道内，双附件无异常，诊断为子宫脱垂。其程度应属于

- A. I 度轻
- B. I 度重
- C. II 度轻
- D. II 度重
- E. III 度

三、A3/A4

1. 初孕妇，既往体健，孕 37 周突发头痛，呕吐，入院查：神志清，瞳孔等大，对光反应好，血压 150 / 110mmHg，浮肿（++），蛋白尿（++）。近日倦怠无力，气短，食欲不振，下肢逆冷，腰酸膝软，小便短少；舌淡胖边有齿痕，苔白滑，脉沉滑无力。

1) 首先考虑的诊断是

- A. 妊娠期高血压
- B. 子痫前期
- C. 子痫
- D. 慢性高血压并发子痫前期
- E. 妊娠合并慢性高血压

2) 该患者中医辨证为

- A. 脾虚肝旺
- B. 痰火上扰
- C. 气滞湿阻
- D. 脾肾两虚
- E. 肝风内动

3) 对应的方药首选

- A. 天仙藤散
- B. 白术散合五苓散

C. 羚角钩藤汤

D. 牛黄清心丸

E. 半夏白术天麻汤

2. 患者，女，29 岁，已婚。剖宫产后 6d，腹痛，高热寒战，小腹疼痛拒按，恶露增多，色紫黯，有臭味。烦躁口渴，尿少色黄，大便燥结；舌红，苔黄而干，脉数有力。

1) 首先考虑的诊断为

A. 上呼吸道感染

B. 急性肾盂肾炎

C. 急性乳腺炎

D. 产褥感染

E. 子痫

2) 首选药物治疗为

A. 氨基糖苷类

B. 大环内酯类

C. 喹诺酮类

D. 林可霉素类

E. 青霉素类

3) 中医治疗原则为

A. 清热解毒，凉血化瘀

B. 清营解毒，散瘀泄热

C. 清心开窍

D. 养阴清热，安冲止血

E. 辛凉透表，清热解毒

3. 48 岁，已婚妇女，因为肝脓肿服用抗生素 20 天，近 1 周来外阴骚痒明显，白

带呈凝乳状或豆渣状，臭秽。检查发现阴道黏膜发红，有白色膜状物，擦除后露出红肿黏膜面。心烦少寐，胸闷呃逆，口苦咽干，小便黄赤；舌红，苔黄腻，脉滑数。

1) 首先考虑的诊断为

- A. 滴虫阴道炎
- B. 外阴阴道假丝酵母菌病
- C. 细菌性阴道病
- D. 萎缩性阴道炎
- E. 外阴炎

2) 对应的西医治疗可用

- A. 口服甲硝唑
- B. 口服伊曲康唑、氟康唑
- C. 口服己烯雌酚
- D. 2%克林霉素软膏
- E. 口服尼尔雌醇

3) 中医治疗首选方是

- A. 龙胆泻肝汤加减
- B. 知柏地黄汤加减
- C. 五味消毒饮加减
- D. 仙方活命饮加减
- E. 萆薢渗湿汤加减

4. 患者，女，患病初期月经先后无定期，量多或少，曾停经 3 个半月后突然阴道大量出血，治疗后经量减少，但仍淋漓不净，经血色紫黑有块，小腹疼痛拒按。舌紫黯或有瘀斑，苔薄白，脉涩。

1) 首先考虑的诊断为

- A. 月经先后无定期
- B. 崩漏
- C. 闭经

- D. 崩中
- E. 痛经

2) 该患者中医辨证为

- A. 肾虚证
- B. 脾虚证
- C. 血瘀证
- D. 血热证
- E. 气虚证

3) 对应的方剂首选

- A. 清热固经汤加沙参、麦冬
- B. 逐瘀止血汤
- C. 保阴煎合生脉散加阿胶
- D. 固本止崩汤合举元煎
- E. 左归丸去牛膝合二至丸

5. 女性，55 岁。白带多，接触性出血 3 个月余，3 年前曾因宫颈糜烂行宫颈冷冻治疗，妇科检查：外阴阴道未见异常，宫颈肥大糜烂、质脆，子宫及双附件未见异常。

1) 首先考虑的诊断为

- A. 宫颈炎症
- B. 宫颈癌
- C. 子宫肌瘤
- D. 卵巢肿瘤
- E. 子宫内膜癌

2) 为明确诊断，首选检查项目应是

- A. 分段诊刮

B. 宫腔镜检查

C. 腹腔镜检查

D. 宫颈锥切术

E. 宫颈活组织病理检查

3) 以下属于此疾病早期症状的是

A. 血水样阴道分泌物

B. 不规则阴道流血

C. 脓性恶臭白带

D. 贫血、恶病

E. 输尿管梗阻、肾盂积水及尿毒症

6. 患者，女，27 岁，停经 40 天，用早早孕试纸自测怀孕，不规则少量出血 15 天，阴道有水泡状组织排出，超声检查：宫腔内未见胎囊结构，可见 72mm×82mm × 27mm 低回声区，内可见密集小囊性无回声区。

1) 首先考虑的诊断为

A. 先兆流产

B. 葡萄胎

C. 妊娠滋养细胞肿瘤

D. 异位妊娠

E. 子宫肌瘤

2) 该病最常用且较准确的辅助诊断手段是

A. CT 检查

B. β -hcg

C. 阴道检查

D. 宫腔镜检查

E. B 超检查

3) 随访期间需严格避孕

- A. 3 个月
- B. 半年
- C. 9 个月
- D. 1 年
- E. 2 年

三、B

- 1. A. 宫颈管柱状上皮
- B. 复层鳞状上皮
- C. 柱状上皮
- D. 柱状上皮与鳞状上皮交界处
- E. 鳞状上皮

- 1) 宫颈阴道部为何种组织覆盖
- 2) 宫颈癌好发部位是

- 2. A. 阴户
- B. 子门
- C. 玉门
- D. 龙门
- E. 胞门

- 1) 相当于少女阴道口部位的是
- 2) 相当于阴蒂、阴唇系带及阴道前庭部位的是

- 3. A. 雌激素
- B. 雄激素
- C. 孕激素
- D. 类固醇激素
- E. 促性腺激素

- 1) 能促进子宫内膜增生与修复的是
- 2) 能使增生期内膜转化为分泌期的是

4. A. 并月
- B. 居经
- C. 暗经
- D. 避年
- E. 激经

- 1) 身体无不适而两月来潮一次者，称为
- 2) 妊娠早期按月行经无损于胎儿者，称为

5. A. 羊膜、叶状绒毛膜和底蜕膜
- B. 合体滋养细胞
- C. 胎儿肾上腺和胎儿肝脏
- D. 胎膜
- E. 脐带血

- 1) 属胎儿附属物的是
- 2) 组成胎盘的组织结构是

6. A. 不超过 2 小时
- B. 不超过 3 小时
- C. 不超过 10 小时
- D. 不超过 12 小时
- E. 不超过 14 小时

- 1) 经产妇第一产程为
- 2) 初产妇第二产程为

7. A. 子宫上段
- B. 子宫下段

C. 宫颈管

D. 阴道

E. 肛提肌

1) 晚期妊娠到临产时，由子宫峡部形成

2) 临产后，被动牵拉、变短、扩张，消失的是

8. A. 产后 1 周

B. 产后 2 周

C. 产后 3 周

D. 产后 4 周

E. 产后 6 周

1) 产后子宫颈管及子宫内口恢复至未孕状态是在

2) 子宫颈完全恢复至未孕状态是在

9. A. 2~3 日

B. 3~4 日

C. 10 日左右

D. 3 周

E. 4~6 周

1) 产后血性恶露持续时间为

2) 产后浆液恶露持续时间为

10. A. 胎盘娩出后

B. 产后第 1 日

C. 产后 1 周

D. 产后 10 日

E. 产后 6 周

1) 子宫底在脐下一指是在

2) 宫底稍上升至脐平是在

11. A. 脾虚

B. 肾虚

C. 湿热

D. 寒证

E. 热证

1) 带下色白质稠，如唾如涕，绵绵不断，多属

2) 带下量多质薄，清稀如水，兼腰膝酸软，多属

12. A. 血热

B. 气滞

C. 痰湿

D. 肝郁

E. 血瘀

1) 月经周期先后无定期多为

2) 月经周期提前多为

13. A. 理中丸

B. 四君子汤

C. 苏叶黄连汤

D. 加味温胆汤

E. 干姜人参半夏汤

1) 脾胃素弱，胃失和降，冲气上逆致妊娠恶阻，因热而上逆者，选用的代表方为

2) 脾胃素弱，胃失和降，冲气上逆致妊娠恶阻，因寒而上逆者，选用的代表方为

14. A. 寿胎丸

B. 左归丸

C. 右归丸

D. 内补丸

E. 真武汤

1) 中医内治法中补肾益气的代表方为

2) 中医内治法中，滋肾益阴的代表方为

15. A. 理气行滞，除湿消肿

B. 滋阴养血，平肝潜阳

C. 健脾利湿，平肝潜阳

D. 滋阴清热，平肝息风

E. 清热豁痰，息风开窍

1) 子痫之肝风内动证选用的治法为

2) 子痫之痰火上扰证选用的治法为

16. A. 舌淡，苔薄白，脉细弱

B. 舌红，苔少，脉细数

C. 舌紫黯，脉沉涩

D. 舌淡，脉虚细

E. 舌红，苔黄腻，脉滑数

本题知识点：产后出血，

1) 产后出血气虚证的舌脉为

2) 产后出血血瘀证的舌脉为

17. A. 通乳丹

B. 生化汤

C. 独活寄生汤

D. 下乳涌泉散

E. 黄芪桂枝五物汤

- 1) 治疗产后关节痛血瘀证首选
- 2) 治疗产后关节痛外感证首选

18. A. 肾气丸
- B. 木通散
- C. 补气通脬饮
- D. 加味四物汤
- E. 黄芪当归散

- 1) 治疗产后尿潴留血瘀证首选
- 2) 治疗产后尿潴留气滞证首选

19. A. 右归丸
- B. 黑逍遥散
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 人参养荣汤
- E. 归肾丸合二至丸

- 1) 治疗外阴慢性单纯性苔藓肝郁气滞证首选
- 2) 治疗外阴慢性单纯性苔藓湿热下注证首选

20. A. 归肾丸合二至丸
- B. 归脾汤
- C. 黑逍遥散
- D. 右归丸
- E. 人参养荣汤

- 1) 治疗外阴硬化性苔藓血虚化燥证首选
- 2) 治疗外阴硬化性苔藓脾肾阳虚证首选

21. A. 完带汤
- B. 内补丸

C. 龙胆泻肝汤

D. 黄连解毒汤

E. 止带方合五味消毒饮

1) 治疗宫颈炎症热毒蕴结证首选

2) 治疗宫颈炎症湿热下注证首选

22. A. 清热利湿，杀虫止痒

B. 清热解毒，除湿止痒

C. 滋肾降火，调补肝肾

D. 清热解毒，燥湿止带

E. 健脾益气，升阳除湿

1) 治疗肝肾阴虚型外阴炎，其治法宜选用

2) 治疗湿热下注型外阴炎，其治法宜选用

23. A. 两地汤

B. 举元煎

C. 清经散

D. 安冲汤

E. 固经丸

1) 治疗月经过多气虚证首选

2) 治疗经期延长气虚证首选

24. A. 膈下逐瘀汤

B. 少腹逐瘀汤

C. 清热调血汤

D. 黄芪建中汤

E. 调肝汤

1) 痛经寒凝血瘀证选用的方剂是

2) 痛经湿热瘀阻证选用的方剂是

25. A. 连续序贯法
B. 周期序贯法
C. 连续联合治疗
D. 单一雌激素治疗
E. 单一孕激素治疗
- 1) 绝经 3~5 年内妇女多选用
 - 2) 围绝经期及卵巢早衰的妇女多选用

26. A. 膈下逐瘀汤
B. 少腹逐瘀汤
C. 开郁二陈汤
D. 金匱肾气丸
E. 大黄牡丹汤
- 1) 治疗子宫肌瘤痰湿瘀阻证首选
 - 2) 治疗子宫肌瘤湿热瘀阻证首选

27. A. 钳刮术
B. 负压吸引术
C. 利凡诺羊膜腔内注射
D. 水囊引产
E. 静脉滴注催产素
- 1) 妊娠 60 天时终止妊娠，可選用
 - 2) 妊娠 80 天时终止妊娠，可選用