

【医学伦理学】

人体试验中谁的为利益第一位

- A. 实验室利益
- B. 医院利益
- C. 受试者利益
- D. 医学利益
- E. 医生利益

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

人体试验必须以维护病人利益为前提，不能只顾及医学研究而牺牲病人的根本利益。受试者利益第一，医学利益第二。【医学教育网原创】。

故本题答案选 C。

【针灸学】

十二经脉的别络从本经分出的部位是

- A. 腕踝关节以下
- B. 肘膝关节以下
- C. 肘膝关节以上
- D. 肩关节、髋枢周围

E. 四肢末端的指、趾部

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

十二经络脉在四肢肘膝关节以下本经络穴分出【医学教育网原创】。

故本题答案选 B。

【诊断学基础】

检查大量腹水患者的肝脏时，应用的触诊方法是

A. 冲击触诊法

B. 滑行触诊法

C. 深压触诊法

D. 浅部触诊法

E. 双手触诊法

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案为 A。

冲击触诊（浮沉触诊法）适用于大量腹水而肝、脾难以触及时【医学教育网原创】。

故本题答案选 A。

【中药学】

解表药中既有升阳，又可解毒的药物为

A. 葛根

B. 柴胡

C. 升麻

D. 薄荷

E. 蔓荆子

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案选 C。

升麻功效: 解表透疹, 清热解毒, 升举阳气【医学教育网原创】。

故本题答案选 C。

【中医儿科学】

患儿, 5 个月。前囟、后囟均未闭合。其囟门闭合情况评价为

A. 均正常

B. 均不正常

C. 前囟正常, 后囟不正常

D. 前囟不正常, 后囟正常

E. 需联系头围情况确定是否正常

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题选 C。

测量方法及正常值: 前囟是额骨和顶骨之间的菱形间隙, 以囟门对边中点间的连线距离表示, 出生时约 1.5~2cm, 至 12~18 个月闭合。后囟是顶骨和枕骨之间的三角形间隙, 部分小儿出生时就已闭合, 未闭合者正常情况应在生后 2~4 个月内闭合。【医学教育网原创】。

故本题答案选 C。

医学教育网中医执业医师《答疑周刊》2021 年第 24 期(下载)

