

号。关注本公众号，好处多多：



【期中模考测试】2021年中西医助理医师 300题含解析

第一单元

一、A1

1. 药味分阴阳，属阳的是

- A. 酸、苦、咸
- B. 辛、苦、咸
- C. 辛、甘、淡
- D. 甘、淡、涩
- E. 甘、苦、淡

【正确答案】C

【答案解析】味，就是酸、苦、甘、辛、咸五种滋味，辛、甘、淡三味属阳，酸、苦、咸三味属阴。辛的药物能散能行，具有行气活血的功效，甘能补虚（气虚、阳虚等）、缓急止痛等作用，淡能渗湿利水作用，凡是温热的、干燥的、兴奋的、前进的等，其属性都为阳。

2. 下列哪种治法体现了五行相克规律

- A. 金水相生
- B. 益火补土
- C. 抑木扶土
- D. 滋水涵木
- E. 培土生金

【正确答案】C

【答案解析】根据五行相克规律的治疗原则是抑强和扶弱。抑强，是根据五行相克规律，抑制病邪亢盛一方以使不及一方易于恢复的法则，适用于相克太过。其中抑木扶土法是疏肝健脾或平肝和胃治法，适用于木旺乘土或土虚木乘之证。

3. 五脏六腑的病理特点及治疗原则是

- A. 脏病多虚，五脏宜补
- B. 脏病多实，五脏宜泻
- C. 腑病多虚，六腑宜泻
- D. 腑病多实，六腑宜补

E. 脏病多实，五脏宜补

【正确答案】 A

【答案解析】 一般说来，病理上“脏病多虚”，“腑病多实”；治疗上“五脏宜补”，“六腑宜泻”。

4. 心为为五脏六腑之大主的理论依据是

- A. 心主血脉
- B. 心总统意志
- C. 心总统魂魄
- D. 心主情志
- E. 心主神志

【正确答案】 E

【答案解析】 心藏神，主神志，主宰和协调人体脏腑、形体、官窍的生理活动，同时也主宰人体的心理活动，故称心为五脏六腑之大主。心因其藏神而为五脏六腑之大主。心神是机体生命活动的主宰。故心为五脏六腑之大主的理论依据是心主神志。

5. 中精之腑指

- A. 胆
- B. 胃
- C. 大肠
- D. 小肠
- E. 三焦

【正确答案】 A

【答案解析】 《灵枢·本输》称胆为“中精之腑”。

6. 易于感冒是气的哪一种功能减退的表现

- A. 推动与调控作用
- B. 温煦与凉润作用
- C. 防御作用
- D. 固摄作用
- E. 中介作用

【正确答案】 C

【答案解析】 气既能护卫肌表，防御外邪入侵，同时也可以祛除侵入人体内的病邪。气的防御功能正常，则邪气不易入侵。

7. 按照药性升降浮沉理论，具有沉降性质的性味是

- A. 苦，温
- B. 辛，温
- C. 苦，寒
- D. 甘，寒
- E. 咸，温

【正确答案】 C

【答案解析】 味属苦、酸、咸，性属寒、凉的药物，大都是沉降药，如大黄、芒硝、山楂等。

8. 关于甘味药的功效叙述正确的是

- A. 温中止痛
- B. 缓急止痛
- C. 理气止痛
- D. 化瘀止痛

E. 祛风止痛

【正确答案】B

【答案解析】甘：有补益、和中、调和药性和缓急止痛的作用。

9. 妊娠慎用的药物不包括的是

- A. 枳实
- B. 肉桂
- C. 附子
- D. 红花
- E. 莪术

【正确答案】E

【答案解析】妊娠慎用的药物：包括通经去瘀、行气破滞及辛热滑利之品，如桃仁、红花、牛膝、大黄、枳实、附子、肉桂、干姜、木通、冬葵子、瞿麦等。

选项 E 中莪术属于妊娠禁用的药物，故根据题干要求，此题的正确选项是 E。

10. 既能发汗解肌，又能温通经脉的药物是

- A. 防风
- B. 羌活
- C. 细辛
- D. 紫苏
- E. 桂枝

【正确答案】E

【答案解析】桂枝功效：发汗解肌，温经通脉，助阳化气。

11. 有“疮家圣药”之称的药物是

- A. 白芷
- B. 连翘
- C. 天花粉
- D. 金银花
- E. 蒲公英

【正确答案】B

【答案解析】连翘苦寒，主入心经，既能清心火，解疮毒，又能消散痈肿结聚，故有“疮家圣药”之称。

12. 栀子具有的功效是

- A. 清热除烦，泻火解毒，利尿
- B. 泻火除烦，清热利湿，凉血解毒
- C. 泻火解毒，利尿
- D. 清热燥湿，泻火解毒，止血
- E. 清热解毒，除烦止渴，消肿止痛

【正确答案】B

【答案解析】栀子功效：泻火除烦，清热利湿，凉血解毒。

13. 善于治疗下部痹证之腰腿疼痛，属于寒湿所致者，最宜选用的药物是

- A. 秦艽
- B. 络石藤
- C. 豨莶草
- D. 独活
- E. 防己

【正确答案】D

【答案解析】独活主治：风寒湿痹。本品辛散苦燥，气香温通，功善祛风湿，止痹痛，为治风湿痹痛主药，凡风寒湿邪所致之痹证，无论新久，均可应用；因其主入肾经，性善下行，尤以腰膝、腿足关节疼痛属下部寒湿者为宜。

14. 下列各项中，属于使药功用范畴的是

- A. 缓和君、臣药之峻烈
- B. 消除或减低君、臣药之毒性
- C. 协助君臣药治疗兼证
- D. 针对某一症状发挥治疗作用
- E. 引药至病所或特定部位

【正确答案】E

【答案解析】使药有两种意义。一是引经药，即能引方中诸药至特定病所的药物；二是调和药，即具有调和方中诸药作用的药物。

15. 小青龙汤中配伍干姜、细辛的主要用意是

- A. 温肺散寒
- B. 温脾散寒
- C. 散寒解表
- D. 温肺化饮
- E. 散寒止痛

【正确答案】D

【答案解析】小青龙汤主治“表寒内饮”之证，其中干姜、细辛为辛温之品，二者为臣药，温肺化饮，兼助麻、桂以解表祛邪。

16. 大黄牡丹汤中大黄的配伍意义是

- A. 清热泻火，导热下行
- B. 清泻瘀热，分利二便
- C. 荡涤肠胃，泄热泻结
- D. 泻热除湿，通肠逐瘀
- E. 通肠泄热，以泻代清

【正确答案】D

【答案解析】大黄牡丹汤中，大黄苦寒攻下为君，泻热逐瘀，荡涤肠中湿热瘀毒。

17. 清暑益气汤中臣药为

- A. 荷梗、洋参、麦冬
- B. 荷梗、石斛、麦冬
- C. 洋参、石斛、麦冬
- D. 麦冬、石斛、知母
- E. 荷梗、竹叶、知母

【正确答案】B

【答案解析】清暑益气汤中荷梗助西瓜翠衣清热解暑；石斛、麦冬助西洋参养阴生津。三药共为臣药。

18. 补中益气汤功用是

- A. 益气补血，健脾温阳
- B. 健脾益气，养胃和中
- C. 健脾养胃，渗湿和中
- D. 补中健脾，升阳举陷

E. 补中健脾, 渗湿止泻

【正确答案】 D

【答案解析】 补中益气汤的功用是补中益气、升阳举陷。

19. 若见突然昏倒, 牙关紧闭, 不省人事, 苔白, 脉迟, 宜选用的方子是

- A. 吃力伽丸
- B. 至宝丹
- C. 紫雪
- D. 牛黄丸
- E. 柴胡汤

【正确答案】 A

【答案解析】 苏合香丸, 又名吃力伽丸, 芳香开窍, 行气止痛, 主治突然昏倒, 牙关紧闭, 不省人事, 苔白, 脉迟。亦治心腹卒痛, 甚则昏厥, 属寒凝气滞者寒闭证。

20. 下列各项中, 除哪项外, 均是镇肝息风汤的组成药物

- A. 白芍、甘草
- B. 龟板、牛膝
- C. 鳖甲、天麻
- D. 白芍、牡蛎
- E. 龟板、牡蛎

【正确答案】 C

【答案解析】 镇肝息风汤的组成是怀牛膝、生赭石、生龙骨、生牡蛎、生龟板、生杭芍、玄参、天冬、川楝子、生麦芽、茵陈、甘草。

方歌: 镇肝息风芍天冬, 玄牧茵陈赭藤龙; 龟板麦芽甘草楝, 肝风内动有奇功。

21. 面色淡黄, 枯槁无华称为

- A. 黄胖
- B. 萎黄
- C. 阴黄
- D. 阳黄
- E. 黄疸

【正确答案】 B

【答案解析】 (1) 面色淡黄, 枯槁无华, 称“萎黄”。常见于脾胃气虚, 气血不足者。

(2) 面色淡黄而虚浮, 称为“黄胖”。属脾气虚弱, 湿邪内盛。

(3) 若面目一身俱黄, 称为“黄疸”。黄而鲜明如橘子色者, 属“阳黄”, 乃湿热熏蒸为患; 黄而晦暗如烟熏者, 属“阴黄”, 乃寒湿郁滞所致。

22. 小儿口角流涎多属于

- A. 脾虚湿盛
- B. 湿热内蕴
- C. 心脾积热
- D. 肝风内动
- E. 胃气虚弱

【正确答案】 A

【答案解析】 口角流涎: 小儿见之多属脾虚湿盛; 成人见之多为中风口歪不能收摄。故正确的选项是 A。

23. 舌苔苔质粗大疏松而厚, 揩之易去为

- A. 滑苔

- B. 糙苔
- C. 腻苔
- D. 腐苔
- E. 无根苔

【正确答案】D

【答案解析】腐苔：表现为苔质颗粒疏松，粗大而厚，形如豆腐渣堆积舌面，揩之可去。

24. 风寒表证的特征是

- A. 恶寒重发热轻
- B. 恶寒轻发热轻
- C. 发热重恶寒轻
- D. 发热重恶寒重
- E. 发热轻而恶风

【正确答案】A

【答案解析】根据恶寒发热的轻重不同和有关兼症，又可分为以下三种类型：

- (1) 恶寒重发热轻是风寒表证的特征。
- (2) 发热重恶寒轻是风热表证的特征。
- (3) 发热轻而恶风是伤风表证的特征。

25. 迟脉的主病是

- A. 虚热证
- B. 痰饮
- C. 寒证
- D. 血瘀
- E. 气滞

【正确答案】C

【答案解析】迟脉多见于寒证，迟而有力为实寒；迟而无力为虚寒。亦见于邪热结聚之实热证。

26. 不属于阳虚证临床表现的是

- A. 畏冷肢凉
- B. 口淡不渴
- C. 舌红少苔
- D. 小便清长
- E. 脉沉迟无力

【正确答案】C

【答案解析】阳虚证临床表现为畏冷，肢凉，口淡不渴，或喜热饮，或自汗，小便清长或尿少不利，大便稀薄，面色（白光）白，舌淡胖，苔白滑，脉沉迟（或为细数）无力。可兼有神疲、乏力、气短等气虚的表现。选项C为阴虚证中的舌苔表现。

27. 足三阳经在下肢的分布规律是

- A. 太阳在前，阳明在中，少阳在后
- B. 太阳在前，少阳在中，阳明在后
- C. 少阳在前，太阳在中，阳明在后
- D. 阳明在前，太阳在中，少阳在后
- E. 阳明在前，少阳在中，太阳在后

【正确答案】E

【答案解析】足三阳经在下肢的分布规律是：阳明在前，少阳在中，太阳在后。

28. 下列各项中，论述错误的是

- A. 任脉别络散布于腹部
- B. 督脉别络散布于头部
- C. 脾之大络散布于全身
- D. 大肠经之络脉走向肺经
- E. 心经络脉走向小肠经

【正确答案】 C

【答案解析】 脾的大络，出于腋下大包穴，散布于胸胁部。

29. 中极穴是以下哪个脏腑之募穴

- A. 大肠
- B. 小肠
- C. 膀胱
- D. 肾
- E. 肝

【正确答案】 C

【答案解析】 中极穴为膀胱的募穴。

30. 耳后两乳突之间的骨度分寸是

- A. 4寸
- B. 6寸
- C. 8寸
- D. 9寸
- E. 12寸

【正确答案】 D

【答案解析】 耳后两乳突之间的骨度分寸是：9寸。

31. 手太阴肺经的起止穴是

- A. 少商、中府
- B. 中府、少商
- C. 商阳、中府
- D. 中府、商阳
- E. 商阳、迎香

【正确答案】 B

【答案解析】 手太阴肺经起于中府，止于少商。

32. 在小腿外侧，外踝尖上8寸，胫骨前肌外缘；条口旁开1寸的穴位是

- A. 丰隆
- B. 地机
- C. 解溪
- D. 上巨虚
- E. 下巨虚

【正确答案】 A

【答案解析】 丰隆

【定位】 在小腿外侧，外踝尖上8寸，胫骨前肌外缘；条口旁开1寸。

33. 手少阴心经起于

- A. 少府
- B. 少冲

- C. 中冲
- D. 极泉
- E. 中府

【正确答案】 D

【答案解析】 手少阴心经起于极泉。

34. 申脉穴位于

- A. 昆仑直上3寸
- B. 外踝直下方凹陷中
- C. 外踝尖与跟腱之间的凹陷处
- D. 第5跖骨粗隆下方, 赤白肉际处
- E. 昆仑穴直下, 跟骨外侧, 赤白肉际处

【正确答案】 B

【答案解析】 申脉

【定位】 在踝区, 外踝尖直下, 外踝下缘与跟骨之间凹陷中。

35. 下列哪组是手厥阴心包经的起止穴

- A. 天池、中冲
- B. 极泉、中冲
- C. 天池、少冲
- D. 极泉、少冲
- E. 少府、少冲

【正确答案】 A

【答案解析】 手厥阴心包经起于天池, 止于中冲。

36. 太冲穴的定位是

- A. 足背, 当第1、2趾间的趾蹼缘上方纹头处
- B. 足背, 当第2、3趾间的趾蹼缘上方纹头处
- C. 足背, 第1、2跖骨结合部之前凹陷中
- D. 足背, 第2、3跖骨结合部之前凹陷中
- E. 内踝前1寸, 胫骨前肌腱内缘凹陷中

【正确答案】 C

【答案解析】 太冲

【定位】 在足背, 第1、2跖骨间, 跖骨底结合部前方凹陷中, 或触及动脉搏动。

37. 隔姜灸多用于治疗

- A. 阳痿早泄
- B. 中风脱证
- C. 未溃疮疡
- D. 肺癆瘰疬
- E. 风寒痹痛

【正确答案】 E

【答案解析】 隔姜灸有温胃止呕、散寒止痛的作用, 常用于因寒而致的呕吐、腹痛以及风寒痹痛等病证。

38. 绝经前后诸证肾阳虚者, 宜配伍

- A. 照海、阴谷
- B. 中脘、丰隆
- C. 关元、命门

- D. 心俞、神门
- E. 中脘、阴陵泉

【正确答案】 C

【答案解析】 绝经前后诸证的针灸配穴：肾阴虚配照海、阴谷；肾阳虚配关元、命门；肝阳上亢配风池、太冲；痰气郁结配中脘、丰隆。烦躁失眠配心俞、神门；纳少便溏配中脘、阴陵泉。

39. 卫生法的概念是指

- A. 国家立法机关颁布的卫生法律
- B. 国家行政机关颁布的卫生法规
- C. 国务院卫生行政部门颁布的规章
- D. 卫生行政部门颁布的技术规范
- E. 调整在卫生活动过程中所发生的社会关系的法律规范的总称

【正确答案】 E

【答案解析】 卫生法是调整在卫生活动过程中所发生的社会关系的法律规范的总称。

40. 下列关于卫生民事责任的构成叙述错误的是

- A. 行为的违法性
- B. 行为人有过错
- C. 主要是财产责任
- D. 损害的事实存在
- E. 损害事实与行为人的过错有直接的因果关系

【正确答案】 C

【答案解析】 卫生民事责任的构成：

构成损害赔偿的民事责任，要同时具备下列四个条件：

1. 损害的事实存在；
2. 行为的违法性；
3. 行为人有过错；
4. 损害事实与行为人的过错有直接的因果关系。

选项 C 中的内容是卫生民事责任的特征内容。故此题的正确选项是 C。

41. 下列关于药师调剂处方时必须做到的“四查十对”中，“四查”的内容不包括的是

- A. 查处方
- B. 查药品
- C. 查配伍禁忌
- D. 查药品性状
- E. 查用药合理性

【正确答案】 D

【答案解析】 药师调剂处方时必须做到“四查十对”：查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂型、规格、数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。

42. 不属于感染性发热病因的是

- A. 血清病
- B. 肺炎支原体
- C. 真菌
- D. 细菌
- E. 立克次体

【正确答案】A

【答案解析】非感染性发热

(1) 无菌性坏死物质吸收如大手术、内出血、大面积烧伤、恶性肿瘤、白血病、急性溶血、心肌梗死或肢体坏死等。

(2) 抗原-抗体反应如风湿热、血清病、药物热、系统性红斑狼疮、皮炎、类风湿关节炎等。

(3) 内分泌与代谢障碍如甲状腺功能亢进症、重度脱水等。

(4) 皮肤散热减少如广泛性皮炎、鱼鳞癣、慢性心功能不全等。

(5) 体温调节中枢功能失常如脑出血、脑外伤、中暑、安眠药中毒等直接损害体温调节中枢,使其功能失常而发热。

(6) 自主神经功能紊乱影响到体温调节过程,使产热大于散热,属功能性发热,多为低热。

43. 表现为典型弛张热的疾病是

- A. 布鲁杆菌病
- B. 肺炎球菌性肺炎
- C. 风湿热
- D. 渗出性胸膜炎
- E. 疟疾

【正确答案】C

【答案解析】弛张热:体温在 39°C 以上,但波动幅度大,24小时内体温差达 2°C 以上,最低时仍高于正常水平。常见于败血症、风湿热、重症肺结核、化脓性炎症等。

44. 若患者胸痛部位在胸骨中上段后方,并向左肩部放射,最可能的疾病为

- A. 胸膜疾病
- B. 心绞痛
- C. 肋间神经病变
- D. 食管炎症
- E. 肋骨骨折

【正确答案】B

【答案解析】胸痛的部位,常常是胸部病变的部位。如带状疱疹引起的胸痛,表现为成簇的水疱沿一侧肋间神经分布伴剧痛;非化脓性肋软骨炎,多侵犯第1、2肋软骨;心绞痛与急性心肌梗死的疼痛常位于胸骨后或心前区,常牵涉至左肩背、左臂内侧;食管、膈和纵隔肿瘤常为胸骨后疼痛,常伴进食或吞咽时加重;自发性气胸、急性胸膜炎的胸痛,多位于患侧的腋前线及腋中线附近。

45. 咯血的原因有下列几种,但除外

- A. 支气管疾病
- B. 心脏病
- C. 白血病
- D. 肺部疾病
- E. 脾破裂

【正确答案】E

【答案解析】咯血的病因:

(1) 支气管疾病常见于支气管扩张症、支气管肺癌、支气管内膜结核和慢性支气管炎等。

(2) 肺部疾病如肺结核、肺炎链球菌性肺炎、肺脓肿等。肺结核为我国最常见的咯血原因。

(3) 心血管疾病如风湿性心脏病、二尖瓣狭窄所致的咯血等。

(4) 其他如血小板减少性紫癜、白血病、血友病、肺出血型钩端螺旋体病、肾综合征出血

热等。

46. 大量气胸患者, 语音震颤

- A. 增强
- B. 减弱或消失
- C. 稍增强
- D. 正常
- E. 无变化

【正确答案】 B

【答案解析】 气胸

- (1) 望诊患侧胸廓饱满, 肋间隙增宽, 呼吸动度减弱或消失。
- (2) 触诊气管移向对侧, 患侧语音震颤减弱或消失。
- (3) 叩诊患侧呈鼓音。左侧气胸时, 心界叩不出; 右侧气胸时, 肝浊音界下移。
- (4) 听诊患侧呼吸音减弱或消失。

47. 脊柱前凸多发生于

- A. 颈段
- B. 胸段
- C. 颈胸段
- D. 腰段
- E. 骶椎

【正确答案】 D

【答案解析】 脊柱前凸多发生于腰段, 见于大量腹水、腹腔巨大肿瘤、髋关节结核及髋关节后脱位等。

48. 关于颈部血管的检查, 错误的是

- A. 当正常人立位和坐位时, 颈外静脉不显露
- B. 颈动脉搏动, 提示心排量增加或脉压增大
- C. 左心衰竭时可见到颈静脉怒张
- D. 心包积液时可见颈静脉怒张
- E. 上腔静脉梗阻时可见颈静脉怒张

【正确答案】 C

【答案解析】 正常人安静坐位或立位时, 颈外静脉不显露, 平卧时可见稍充盈。如果在坐位或半卧位(上半身与水平面形成 45°)见到明显颈静脉充盈, 称为颈静脉怒张, 提示体循环静脉血回流受阻或上腔静脉压增高, 见于右心衰竭、缩窄性心包炎、心包积液及上腔静脉阻塞综合征等。颈静脉搏动可见于三尖瓣关闭不全。颈动脉搏动, 提示心排量增加或脉压增大。

49. 下列说法错误的是

- A. 杂音有生理性和病理性两类
- B. 震颤都是病理性的
- C. 心律不齐都是病理性的
- D. 血压过高和过低都不好
- E. 心动过速常是阵发的

【正确答案】 C

【答案解析】 健康青少年及儿童常见呼吸性窦性心律不齐。

50. 肝脏缩小见于

- A. 肝炎

- B. 肝脓肿
- C. 早期肝硬化
- D. 肝淤血
- E. 亚急性重型肝炎

【正确答案】 E

【答案解析】 肝脏大小变化的临床意义：弥漫性肝肿大见于肝炎、脂肪肝、肝淤血、早期肝硬化、白血病、血吸虫病等；局限性肝肿大见于肝脓肿、肝囊肿（包括肝包虫病）、肝肿瘤等；肝脏缩小见于急性和亚急性重型肝炎、晚期肝硬化。

51. 腹部触诊为揉面感见于

- A. 结核性腹膜炎
- B. 胃肠穿孔
- C. 肝癌破裂出血
- D. 急性胆囊炎
- E. 急性腹膜炎

【正确答案】 A

【答案解析】 腹膜慢性炎症时，触诊如揉面团一样，不易压陷，称为揉面感，常见于结核性腹膜炎、癌性腹膜炎。

52. 患者因病不能自行调节自己的体位，属于

- A. 自动体位
- B. 被动体位
- C. 翻转体位
- D. 强迫体位
- E. 以上都不是

【正确答案】 B

【答案解析】 被动体位患者不能随意调整或变换体位，需别人帮助才能改变体位。见于极度衰弱或意识丧失的患者。

53. 双上眼睑下垂见于

- A. 脑炎
- B. 脑脓肿
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 脑出血
- E. 重症肌无力

【正确答案】 E

【答案解析】 双上眼睑下垂见于重症肌无力、先天性上眼睑下垂。

54. 关于碱性磷酸酶测定的临床意义错误的是

- A. 阻塞性黄疸患者 ALP 明显增高
- B. 肝细胞性黄疸 ALP 轻度增高
- C. 肝内局限性胆道阻塞 ALP 明显增高
- D. 骨骼疾病时 ALP 不增高
- E. 肝内胆汁淤积 ALP 明显升高

【正确答案】 D

【答案解析】 骨骼疾病如纤维性骨炎、骨肉瘤、佝偻病、骨软化症、骨转移癌及骨折愈合期等，ALP 均可增高。

55. 某患者 24 小时尿量为 3000ml，尿比重为 1.035，诊断应考虑为

- A. 大量饮水后
- B. 肾功能不全
- C. 糖尿病
- D. 尿崩症
- E. 精神性多尿

【正确答案】 C

【答案解析】 正常人在普通膳食情况下，尿比重在 1.015~1.025。

(1) 增高见于急性肾炎、糖尿病、肾病综合征及肾前性少尿等。

(2) 减低见于慢性肾炎、慢性肾衰竭、尿崩症等。

56. SLE 患者血清中有多种抗体，其中阳性率可达 95%以上，但特异性较差的为

- A. 类风湿因子 (RF)
- B. 抗核抗体 (ANA)
- C. LE 因子
- D. 抗磷脂抗体
- E. 抗酸性核蛋白抗体

【正确答案】 B

【答案解析】 抗核抗体 (ANA) 临床意义

(1) ANA 阳性：①多见于未经治疗的系统性红斑狼疮 (SLE)，阳性率可达 95%以上，但特异性较差。②药物性狼疮、混合性结缔组织病、原发性胆汁性肝硬化、全身性硬皮病、多发性肌炎等患者的阳性率也较高。③其他自身免疫性疾病：如类风湿性关节炎、桥本甲状腺炎等也可呈阳性。

(2) 荧光类型：根据细胞核染色后的荧光类型，ANA 可分为均质型、边缘型、颗粒型、核仁型 4 种。

57. 中性粒细胞核左移常见于

- A. 急性化脓性感染
- B. 肝硬化
- C. 伤寒
- D. 副伤寒
- E. 系统性红斑狼疮

【正确答案】 A

【答案解析】 核左移：当周围血中杆状核粒细胞增多 $>5\%$ ，并出现晚幼粒、中幼粒、早幼粒等细胞时，称为核左移。常见于感染，特别是急性化脓性感染，也可见于急性大出血、急性溶血反应、急性中毒等。核左移伴白细胞总数增高，称为再生性左移。表示机体反应性强，骨髓造血功能旺盛。核左移而白细胞总数不增高，甚至减少，称为退行性左移。表示机体反应性低下，骨髓造血功能减低，见于再生障碍性贫血、粒细胞缺乏症。

58. 变异型心绞痛的心电图表现为

- A. T 波双向
- B. T 波低平
- C. S-T 段呈下垂型压低
- D. S-T 段抬高
- E. S-T 段呈水平型

【正确答案】 D

【答案解析】 变异型心绞痛：常于休息或安静时发病，心电图可见 S-T 段抬高，常伴有 T 波高耸，对应导联 S-T 段下移。

59. 心缘搏动减弱或消失见于

- A. 单纯二尖瓣狭窄
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 高血压心脏病
- D. 慢性肺源性心脏病
- E. 心包积液

【正确答案】 E

【答案解析】 心包积液：300ml 以下者，X线难以发现。中等量积液时，后前位可见心脏形态呈烧瓶形，上腔静脉增宽，心缘搏动减弱或消失等。

60. 氯解磷定的作用，不正确的是

- A. 使肌束颤动消失或明显减轻
- B. 对中枢中毒症状疗效最明显
- C. 不直接对抗体内积聚的 Ach，需与阿托品合用
- D. 对中毒过久“老化”的磷酸化胆碱酯酶解毒效果差
- E. 能与体内游离的有机磷酸酯类直接结合

【正确答案】 B

【答案解析】 氯解磷定恢复酶活性的作用在骨骼肌的神经肌接头处最为明显，而且不易透过血脑屏障，需较大剂量才对中枢中毒症状有一定疗效。

61. 下列何药可与利尿药合用治疗急性肾功能衰竭

- A. 麻黄碱
- B. 多巴胺
- C. 肾上腺素
- D. 去甲肾上腺素
- E. 异丙肾上腺素

【正确答案】 B

【答案解析】 多巴胺可以激动血管多巴胺受体，扩张肾血管，增加肾血流量和肾小球滤过率，与利尿药等合用治疗急性肾功能衰竭。

62. β 受体阻滞药的禁忌证不包括

- A. 严重左室心功能不全
- B. 支气管哮喘
- C. 高血压
- D. 重度房室传导阻滞
- E. 窦性心动过缓

【正确答案】 C

【答案解析】 β 受体阻滞药的不良反应有：心功能不全、诱发或加重支气管哮喘。高血压是 β 受体阻滞药的适用症之一，故不属于禁忌证。

63. 哪一种情况下可以使用吗啡

- A. 颅脑损伤，颅压升高
- B. 分娩过程止痛
- C. 支气管哮喘呼吸困难
- D. 肺心病呼吸困难
- E. 急性心源性哮喘

【正确答案】 E

【答案解析】 吗啡可扩张全身血管，引起体位性低血压，抑制呼吸致 CO_2 积聚，使脑血管扩

张，致颅内压增高，故颅脑损伤的患者禁用；吗啡能通过胎盘进入胎儿体内或经乳汁分泌抑制新生儿呼吸，同时能对抗催产素对子宫的兴奋作用而延长产程，故分娩止痛及哺乳妇女止痛禁用；由于抑制呼吸和致支气管收缩，故支气管哮喘及肺心病患者禁用。

64. 高血钾症病人，禁用下述何种利尿药

- A. 氢氯噻嗪
- B. 苄氟噻嗪
- C. 布美他尼
- D. 氨苯蝶啶
- E. 呋塞米

【正确答案】 D

【答案解析】 氨苯蝶啶具有留钾利尿作用，长期服用可致高血钾，肝肾功能不全及血钾过高者禁用。

65. 卡托普利的不良反应正确的是

- A. 高血钾
- B. 低血钾
- C. 高血钠
- D. 高血压
- E. 低血镁

【正确答案】 A

【答案解析】 卡托普利不良反应是高血钾、低血压。ACEI 抑制激肽酶，使缓激肽、P 物质堆积，引起咳嗽及血管神经性水肿；久用降低血锌而出现皮疹、味觉及嗅觉改变及脱发等。高血钾者和妊娠初期禁用。

66. 硝酸酯类与 β 受体阻断药联合应用抗心绞痛的药理依据是

- A. 缩短射血时间
- B. 消除反射性心率加快
- C. 降低室壁肌张力
- D. 作用机制不同产生协同作用
- E. 以上都是

【正确答案】 E

【答案解析】 硝酸酯类抗心绞痛的作用机制有：降低心肌耗氧量、改善缺血区心肌供血； β 受体阻滞药抗心绞痛的作用机制是：降低心肌耗氧量、改善心肌代谢、增加缺血区血液供应、促进氧合血红蛋白解离。

硝酸酯类扩张血管后血压降低所致的反射性心率加快和心肌收缩力增加，可增加心肌耗氧量，心率加快所致的心脏舒张期冠脉灌注时间缩短不利于心绞痛治疗，合用 β 受体阻滞药可对抗之。

应用 β 受体阻滞药后，其 β_1 受体的阻断作用可使心率减慢，心脏舒张期延长而增加冠脉灌注时间；抑制心肌收缩力，减少心脏做功，降低心肌耗氧量而发挥抗心绞痛作用。但心肌收缩力减弱，使射血时间延长，心排血不完全，左室舒张末压升高，心室容积扩大又可增加心肌耗氧量，与硝酸酯类药物合用可提高疗效，减少不良反应。

67. 下列药物中，有抗雄性激素和药酶抑制作用的是

- A. 法莫替丁
- B. 奥美拉唑
- C. 尼扎替丁
- D. 兰索拉唑

E. 西咪替丁

【正确答案】 E

【答案解析】 西咪替丁有抗雄性激素和药酶抑制作用,能延缓华法林、苯妥英钠、茶碱、苯巴比妥、地西洋、卡马西平、普萘洛尔等药物的代谢,合用时应调整合用药的剂量,雷尼替丁有弱的药酶抑制作用,法莫替丁、尼扎替丁不影响药酶活性。

68. 抢救糖尿病酮症酸中毒,治疗药物应选用

- A. 正规胰岛素
- B. 珠蛋白锌胰岛素
- C. 三碘甲状腺原氨酸
- D. 格列齐特
- E. 低精蛋白锌胰岛素

【正确答案】 A

【答案解析】 正规胰岛素,即普通胰岛素,属短效胰岛素,作用迅速,适用于重症糖尿病初期及并发酮症酸中毒者。

69. 磺酰脲类降血糖药的主要不良反应是

- A. 肾损伤
- B. 乳酸血症
- C. 黏膜出血
- D. 粒细胞减少及肝损伤
- E. 肾上腺皮质功能减退

【正确答案】 D

【答案解析】 磺酰脲类降血糖药不良反应:

(1) 胃肠道反应: 胃肠不适、恶心、腹痛、腹泻等,减量或连续用药可消失。

(2) 过敏反应: 出现皮疹、粒细胞减少、血小板减少、胆汁淤积性黄疸及肝损害。多在用药后1~2个月内发生,需定期查肝功能和血象。

(3) 低血糖: 可引起持久性的低血糖,造成不可逆性脑损伤,为较严重的不良反应。

70. 氯霉素的抗菌作用中,对下列哪项无效

- A. 伤寒杆菌
- B. 副伤寒杆菌
- C. 结核分枝杆菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 以上均是

【正确答案】 C

【答案解析】 氯霉素为广谱抗菌药,对革兰阴性菌的抑制作用强于革兰阳性菌,一般为抑菌药,但对流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、脑膜炎奈瑟球菌具有杀灭作用;氯霉素对伤寒杆菌、流感杆菌、副流感杆菌和百日咳杆菌的作用比其他抗生素强,对立克次体属、支原体、螺旋体和沙眼衣原体等也有抑制作用,但对革兰阳性球菌的作用不及青霉素和四环素,对结核分枝杆菌、真菌、原虫和病毒无效。

71. 下列各项中主要用于治疗敏感菌引起的深部感染的药物是

- A. 氟康唑
- B. 咪康唑
- C. 特比萘芬
- D. 制霉菌素
- E. 氟胞嘧啶

【正确答案】 E

【答案解析】 氟胞嘧啶为人工合成抗真菌药, 抗菌谱窄, 仅对酵母菌(新型隐球菌属)和酵母样菌(念珠菌属)有较强的抑制活性, 另对着色霉菌、烟曲菌等也有抗菌作用。主要用于敏感菌引起的深部感染。

72. 关于免疫反应, 下列哪项是错误的

- A. 对传染过程的表现起着重要作用
- B. 所有免疫反应都是对机体有利的
- C. 保护性免疫可分为非特异性免疫和特异性免疫
- D. 特异性免疫包括细胞免疫和体液免疫
- E. 变态反应都是特异性免疫

【正确答案】 B

【答案解析】 免疫反应分保护性免疫反应和变态反应, 前者有利于机体抵抗病原体入侵与破坏, 后者能促进病理生理过程和组织损伤。

73. 有关病毒性肝炎的描述下列哪项是错误的

- A. 甲型肝炎多呈急性经过
- B. 乙型肝炎可演变为慢性
- C. 丁型肝炎一般不演变为慢性
- D. 丙型肝炎易演变为慢性
- E. 戊型肝炎多呈急性经过

【正确答案】 C

【答案解析】 甲、戊型肝炎的传染源主要是急性期患者和亚临床感染者。病毒主要通过粪便排出体外, 发病前 2 周至发病后 2~3 周内具有传染性, 而以发病前后各 1 周的传染性最强。乙、丙、丁型肝炎的传染源是相应的急、慢性患者及病毒携带者。病毒存在于患者的血液及各种体液(阴道分泌物、精液、羊水、唾液、乳汁等)中。急性期患者自发病前 2~3 个月即有传染性, 并持续于整个急性期。慢性感染者均具有传染性。

74. 慢性乙型肝炎的关键治疗是

- A. 休息
- B. 保肝
- C. 降酶
- D. 抗病毒
- E. 调节免疫

【正确答案】 D

【答案解析】 抗病毒治疗是慢性乙型肝炎和丙型肝炎的关键治疗, 只要有适应证, 且条件允许, 就应进行规范的抗病毒治疗。

75. 乙脑具有诊断意义的症候出现的时期为病程的

- A. 1~2 日
- B. 1~3 日
- C. 3~8 日
- D. 4~10 日
- E. 7~10 日

【正确答案】 D

【答案解析】 乙脑病程的 4~10 日, 具有诊断意义的症候多在此期出现, 多为脑实质损害的表现。

76. 霍乱大流行最重要的传播形式是

- A. 食物污染
- B. 苍蝇传播
- C. 接触患者
- D. 水源污染
- E. 接触带菌者

【正确答案】D

【答案解析】患者吐泻物和带菌者粪便污染水源及食物，特别是水源被污染后易引起局部暴发。

77. 慢性菌痢的病程时限是

- A. 超过1年
- B. 超过6个月
- C. 超过2个月
- D. 超过2周
- E. 时限不定，反复发作

【正确答案】C

【答案解析】急性菌痢反复发作或迁延不愈达2个月以上者即为慢性菌痢。

78. 治疗伤寒慢性带菌者，首选

- A. 氯霉素
- B. 磺胺嘧啶
- C. 四环素
- D. 氨苄西林
- E. 红霉素

【正确答案】D

【答案解析】伤寒带菌者的治疗：成人带菌者可用氨苄西林、阿莫西林、氧氟沙星、环丙沙星等治疗，疗程4~6周。

79. 有关标准预防下列哪项是错误的

- A. 要防止血源性疾病的传播也要防止非血源性疾病的传播
- B. 强调双向防护
- C. 所有的患者均被视为具有潜在感染者
- D. 要根据疾病的主要传播途径，采取相应的隔离措施
- E. 操作完毕后脱去手套即可

【正确答案】E

【答案解析】医务人员进行有可能接触患者体液、血液的诊疗和护理操作时必须戴手套。操作完毕，脱去手套后应立即洗手，必要时进行手消毒。

80. 对于布鲁菌病易感人群的说法，正确的是

- A. 儿童易感染
- B. 男性易感染
- C. 身体衰弱或有慢性疾病的人易感染
- D. 人群普遍易感
- E. 女性易感染

【正确答案】D

【答案解析】布鲁菌病人群普遍易感，病后可获较强免疫力，因此再次感染者很少。

81. 慢性HBV感染的自然病程一般可分为四个阶段，无

- A. 免疫耐受期

- B. 免疫清除期
- C. 低（非）复制期
- D. 发病期
- E. 再活跃期

【正确答案】D

【答案解析】慢性HBV感染的自然病程一般可分为四个阶段：第一阶段为免疫耐受期；第二阶段为免疫清除期；第三阶段为低（非）复制期；第四阶段为再活跃期。

82. 医学道德的作用不包括哪一项

- A. 对人民健康具有保障作用
- B. 对医疗质量具有保障作用
- C. 对经济效益的保障作用
- D. 对医疗卫生事业具有促进作用
- E. 对社会文明具有推动作用

【正确答案】C

【答案解析】医学道德是医务人员的职业道德，简称医德，是医务人员处理与患者、与社会关系的原则和规范。医务人员的道德品质对人民健康和医疗质量具有保障作用，对医疗卫生事业具有促进作用，对社会文明具有推动作用。

83. 下列对于医务人员义务和责任的描述不正确的是

- A. 为患者诊治疾病，尽最大的努力为患者服务
- B. 为患者解除躯体痛苦和精神上的痛苦
- C. 向患者、患者家属说明病情、诊断、治疗和预后
- D. 面对疫情和重大自然灾害，进入疫区、灾区抢救伤员，保护群众健康
- E. 有权要求患者或患者家属配合诊治

【正确答案】E

【答案解析】医务人员义务和责任是一致的，包括：为患者诊治疾病，尽最大的努力为患者服务；为患者解除躯体痛苦和精神上的痛苦；向患者、患者家属说明病情、诊断、治疗和预后；面对疫情和重大自然灾害，进入疫区、灾区抢救伤员，保护群众健康。

84. 不属于辅助检查的道德要求的是

- A. 目的明确，诊治需要
- B. 知情同意，尽职尽责
- C. 全面系统，认真细致
- D. 综合分析，切忌片面
- E. 密切联系，加强协作

【正确答案】C

【答案解析】辅助检查的道德要求

1. 目的明确，诊治需要。
2. 知情同意，尽职尽责。
3. 综合分析，切忌片面。
4. 密切联系，加强协作。

二、A2

85. 治疗胃痛拒按，食后痛甚，舌质紫暗，有瘀斑，脉细涩者，针灸取穴是

- A. 足三里、内关、中脘、胃俞、三阴交
- B. 足三里、内关、中脘、下脘、三阴交
- C. 足三里、内关、中脘、太冲、三阴交

- D. 足三里、内关、中脘、膈俞、三阴交
E. 足三里、内关、中脘、内庭、三阴交

【正确答案】D

【答案解析】胃痛的处方:

主穴: 中脘、足三里、内关; 瘀血停胃配加膈俞、三阴交。

86. 治疗暴病耳聋, 鸣声隆隆, 伴畏寒, 发热, 脉浮, 宜在翳风、听会、侠溪、中渚基础上, 加取

- A. 太冲、丘墟
B. 外关、合谷
C. 风门、肺俞
D. 丰隆、脾俞
E. 足三里、三阴交

【正确答案】B

【答案解析】根据题干症状诊断为耳聋外感风邪证, 针灸治疗配外关、合谷。

87. 男, 24岁。腹泻半天来诊。腹泻30多次, 开始为稀便, 后为水样便, 继之多次呕吐。查体: T36.5℃, P110次/min, BP60/40mmHg, 神志清楚, 皮肤干燥, 弹性差。腹软, 无压痛。粪常规: 水样便, 镜检WBC0~3个/HP, RBC0~2个/HP。最可能的诊断是

- A. 胃肠型细菌性食物中毒
B. 阿米巴痢疾
C. 急性细菌性痢疾
D. 溃疡性结肠炎
E. 霍乱

【正确答案】E

【答案解析】凡有典型临床症状, 如剧烈腹泻, 水样便(黄水样、清水样、米泔样或血水样), 伴有呕吐, 迅速出现脱水, 循环衰竭及肌肉痉挛(特别是腓肠肌)的首发病例, 在病原学检查尚未肯定前, 应诊断为疑似霍乱。A项疾病多发于夏季, 常有饮食提示, 且腹泻、腹痛、黏液脓血便。B项为果酱样暗红色便。C项有腹痛、腹泻、里急后重, 黏液脓血便。D项黏液脓血便、腹泻、腹痛。

88. 患者男性, 55岁, 3年前曾患肺结核, 近3月咳嗽, 右胸痛, 少量咳痰, 间断咳痰带血, 三次痰涂片阴性, X线胸片示无活动性肺结核病变。进一步应首先检查

- A. 胸部CT
B. 血沉
C. 结核菌素试验
D. 血常规
E. 支气管造影

【正确答案】A

【答案解析】胸部CT有助于发现隐蔽区病灶和孤性结节的鉴别诊断。

三、B

- A. 阴偏衰
B. 阳偏衰
C. 阴偏盛
D. 阳偏盛
E. 阴阳两虚

89. “阴病治阳”的病理基础是

【正确答案】B

【答案解析】凡阳虚不能制阴而致阴盛（阳消阴长）的虚寒证，宜用补阳治之。这种治疗原则，称之为“阴病治阳”；又称作“益火之源，以消阴翳”。这是针对单纯阳虚证的治疗原则。

90. “阳病治阴”的病理基础是

【正确答案】A

【答案解析】凡阴虚不能制阳而致阳亢（阴消阳长）的虚热证，宜用补阴治之。这种治疗原则，称之为“阳病治阴”；又称作“壮水之主，以制阳光”。这是针对单纯阴虚证的治疗原则。

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

91. “先天之本”指的脏是

【正确答案】E

【答案解析】肾藏精，主命门真火，为先天之本。

92. “后天之本”指的脏是

【正确答案】C

【答案解析】脾主运化水谷精微，化生气血，为后天之本。

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 湿邪
- D. 燥邪
- E. 火邪

93. 六淫邪气中，致病后常先困脾的邪气是

【正确答案】C

【答案解析】脾主运化水液，性喜燥而恶湿，故外感湿邪，常易困脾，致脾阳不振，运化无权，从而使水湿内生、停聚，发为泄泻、水肿、痰饮等。所以说湿易损伤脾阳。

94. 最易伤肺的邪气是

【正确答案】D

【答案解析】燥邪的性质和致病特点：（1）燥性干涩，易伤津液；（2）燥易伤肺。

- A. 乌头
- B. 甘草
- C. 三棱
- D. 芒硝
- E. 藜芦

95. 不宜与牙硝同用的药物是

【正确答案】C

【答案解析】选项C三棱与牙硝配伍属于十九畏的内容，为配伍禁忌。

十九畏：硫黄畏朴硝，水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆畏牵牛，丁香畏郁金，川乌、草乌畏犀角，牙硝畏三棱，官桂畏赤石脂，人参畏五灵脂。

96. 不宜与瓜蒌同用的药物是

【正确答案】A

【答案解析】选项 A 中的乌头与瓜蒌配伍属于十八反。属于配伍禁忌。
十八反：甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花；乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白蔹、白及；藜芦反人参、沙参、丹参、玄参、细辛、芍药。

- A. 祛风湿，止痛，解表
- B. 祛风湿，止痛，利水消肿
- C. 祛风湿，利关节，解毒
- D. 祛风湿，通络止痛，消骨鲠
- E. 解表散寒，祛风胜湿，止痛

97. 独活的功效是

【正确答案】A

【答案解析】独活功效：祛风湿，止痛，解表。

98. 羌活的功效是

【正确答案】E

【答案解析】羌活功效：解表散寒，祛风胜湿，止痛。

- A. 蒲黄
- B. 地榆
- C. 大蓟
- D. 三七
- E. 白茅根

99. 宜治尿血、血淋涩痛的药物是

【正确答案】A

【答案解析】蒲黄化瘀止血并能利尿通淋，能治瘀血阻滞之心腹疼痛、痛经、产后瘀阻腹痛以及血淋涩痛证等。

100. 宜治下焦血热出血证的药物是

【正确答案】B

【答案解析】地榆主治：血热出血证。本品性凉，有凉血止血之功，因其味苦主降，尤宜下焦血热的便血、痔血、血痢、崩漏等。

- A. 益气补虚
- B. 扶正祛邪
- C. 缓峻护正
- D. 化痰止咳
- E. 实卫合营

101. 麻黄汤中配伍炙甘草的主要用意是

【正确答案】C

【答案解析】炙甘草在麻黄汤中调和诸药药性，既助麻、杏宣降，又缓麻、桂峻烈，使汗出不至过猛而耗伤正气，既为使药，又兼佐药。

102. 桂枝汤中配伍炙甘草的主要用意是

【正确答案】E

【答案解析】桂枝汤中炙甘草调和药性，合桂枝辛甘化阳以实卫，合芍药酸甘化阴以和营，功兼佐使之用。

- A. 牡蛎、当归
- B. 黄芪、菖蒲
- C. 黄芪、小麦
- D. 人参、黄芪

E. 茯神、远志

103. 牡蛎散中含有的药物为

【正确答案】 C

【答案解析】 牡蛎散一骑马卖牡蛎（黄芪、麻黄根、小麦、煅牡蛎）

104. 桑螵蛸散中含有的药物为

【正确答案】 E

【答案解析】 桑螵蛸散一自家人常孤身飘荡（远志、炙龟甲、人参、菖蒲、龙骨、茯神、桑螵蛸、当归）

A. 枳实消痞丸

B. 厚朴温中汤

C. 瓜蒌薤白白酒汤

D. 半夏厚朴汤

E. 柴胡疏肝散

105. 具有通阳散结，行气祛痰功用的方剂是

【正确答案】 C

【答案解析】 瓜蒌薤白白酒汤擅长通阳散结，行气祛痰。

106. 具有行气散结，降逆化痰功用的方剂是

【正确答案】 D

【答案解析】 半夏厚朴汤擅长行气散结，降逆化痰。枳实消痞丸化湿热、消痞满；厚朴温中汤行气除满、温中燥湿；天台乌药散行气疏肝，散寒止痛；柴胡疏肝散疏肝行气、活血止痛。

A. 痰中带血

B. 痰黄质稠

C. 痰白清稀

D. 痰少黏稠

E. 痰白滑量多

107. 寒痰的特征是

【正确答案】 C

【答案解析】 望痰：

痰黄黏稠，坚而成块者，属热痰。因热邪煎熬津液之故。

痰白而清稀，或有灰黑点者，属寒痰。因寒伤阳气，气不化津，湿聚为痰之故。

痰白滑而量多，易咯出者，属湿痰。因脾虚不运，水湿不化，聚而成痰之故。

痰少而黏，难于咯出者，属燥痰。因燥邪伤肺，或肺阴虚津亏所致。

痰中带血，色鲜红者，为热伤肺络。多因肺阴亏虚，或肝火犯肺，或痰热壅肺所致。

咳吐脓血腥臭痰，属肺痈。是热毒蕴肺，化腐成脓所致。

108. 燥痰的特征是

【正确答案】 D

【答案解析】 望痰：

痰黄黏稠，坚而成块者，属热痰。因热邪煎熬津液之故。

痰白而清稀，或有灰黑点者，属寒痰。因寒伤阳气，气不化津，湿聚为痰之故。

痰白滑而量多，易咯出者，属湿痰。因脾虚不运，水湿不化，聚而成痰之故。

痰少而黏，难于咯出者，属燥痰。因燥邪伤肺，或肺阴虚津亏所致。

痰中带血，色鲜红者，为热伤肺络。多因肺阴亏虚，或肝火犯肺，或痰热壅肺所致。

咳吐脓血腥臭痰，属肺痈。是热毒蕴肺，化腐成脓所致。

A. 咳声不扬，痰黄质稠

B. 咳声重浊紧闷

C. 干咳少痰或无痰

D. 咳有痰声, 痰多易咯

E. 咳声如犬吠, 声音嘶哑

109. 痰湿阻肺的特征是

【正确答案】D

【答案解析】咳声不扬, 痰稠色黄, 不易咯出, 多属热证, 多因热邪犯肺, 肺津被灼所致。咳有痰声, 痰多易咯, 多属痰湿阻肺所致。干咳无痰或少痰, 多属燥邪犯肺或阴虚肺燥所致。故此题的最佳选项是D。

110. 燥邪犯肺的特征是

【正确答案】C

【答案解析】咳声不扬, 痰稠色黄, 不易咯出, 多属热证, 多因热邪犯肺, 肺津被灼所致。咳有痰声, 痰多易咯, 多属痰湿阻肺所致。干咳无痰或少痰, 多属燥邪犯肺或阴虚肺燥所致。

A. 真热假寒证

B. 真寒假热证

C. 表热里寒证

D. 表热证

E. 里热证

111. 身热初按热甚, 久按热反转轻者见于

【正确答案】D

【答案解析】身热初按热甚, 久按热反转轻者为热在表。

112. 身灼热而肢厥者见于

【正确答案】A

【答案解析】身灼热而肢厥者属真热假寒证, 为阳热壅盛, 格阴于外所致。

A. 任脉

B. 冲脉

C. 带脉

D. 阴脉

E. 阴维脉

113. 具有维系六阴经作用的是

【正确答案】E

【答案解析】阳维脉主一身之表, 阴维脉主一身之里, 阴阳维脉具有维系一身阴经和阳经的作用。

114. 具有调节全身阴经经气作用的是

【正确答案】A

【答案解析】任脉妊养诸阴经, 总调全身阴气和精血, 为“阴脉之海”。

A. 第3胸椎棘突下, 旁开1.5寸

B. 第5胸椎棘突下, 旁开1.5寸

C. 第6胸椎棘突下, 旁开1.5寸

D. 第7胸椎棘突下, 旁开1.5寸

E. 第9胸椎棘突下, 旁开1.5寸

115. 心俞穴位于

【正确答案】B

【答案解析】心俞

【定位】在脊柱区，第5胸椎棘突下，后正中线旁开1.5寸。

116. 肝俞穴位于

【正确答案】E

【答案解析】肝俞

【定位】在脊柱区，第9胸椎棘突下，后正中线旁开1.5寸。

A. 鼻病取上星

B. 下牙痛取合谷

C. 肾虚牙痛取太溪

D. 腰痛取委中

E. 外踝扭伤取阳池

117. 属于辨证取穴的是

【正确答案】C

【答案解析】辨证选穴是根据疾病的证候特点，分析病因病机而辨证选取穴位的方法。肾虚牙痛取太溪属于辨证取穴。

118. 属于近部取穴的是

【正确答案】A

【答案解析】近部选穴是指选取病痛所在部位或邻近部位的腧穴。这一选穴原则是根据腧穴普遍具有近治作用的特点而来的，如：鼻病取上星。

A. 医生限制患者自主权利

B. 医生奔赴自然灾害现场抢救

C. 医生按中国认定的标准做出死亡判断

D. 医生向患者说明病情等有关医疗情况

E. 医生对某些传染病患者实行隔离手段

119. 体现医生对患者义务的是

【正确答案】D

【答案解析】在职业活动中，医生应履行下列职业道德义务：维护病人健康，减轻痛苦；解释说明与履行知情同意原则；保守秘密。

《中华人民共和国执业医师法》的相关条款在法律上规定了医师的义务，如：①遵守法律、法规，遵守技术操作规范；②树立敬业精神，遵守职业道德，履行医师职责，尽职尽责为患者服务；③关心、爱护、尊重患者，保护患者的隐私；④努力钻研业务，更新知识，提高专业技术水平；⑤从事科学研究，发展医学科学。⑥宣传卫生保健知识，对患者进行健康教育等。

120. 体现医生对社会义务的是

【正确答案】B

【答案解析】在职业活动中，医生应履行下列职业道德义务：维护病人健康，减轻痛苦；解释说明与履行知情同意原则；保守秘密。

《中华人民共和国执业医师法》的相关条款在法律上规定了医师的义务，如：①遵守法律、法规，遵守技术操作规范；②树立敬业精神，遵守职业道德，履行医师职责，尽职尽责为患者服务；③关心、爱护、尊重患者，保护患者的隐私；④努力钻研业务，更新知识，提高专业技术水平；⑤从事科学研究，发展医学科学。⑥宣传卫生保健知识，对患者进行健康教育等。

A. 37.5℃~38℃

B. 39.1℃~41℃

C. 38.1℃~39℃

D. $>41^{\circ}\text{C}$

E. $39.1^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$

121. 高热为

【正确答案】 B

【答案解析】 按发热的高低可分为：低热为 $37.3^{\circ}\text{C}\sim 38^{\circ}\text{C}$ ；中等度热为 $38.1^{\circ}\text{C}\sim 39^{\circ}\text{C}$ ；高热为 $39.1^{\circ}\text{C}\sim 41^{\circ}\text{C}$ ；超高热为 41°C 以上。

122. 超高热为

【正确答案】 D

【答案解析】 按发热的高低可分为：低热为 $37.3^{\circ}\text{C}\sim 38^{\circ}\text{C}$ ；中等度热为 $38.1^{\circ}\text{C}\sim 39^{\circ}\text{C}$ ；高热为 $39.1^{\circ}\text{C}\sim 41^{\circ}\text{C}$ ；超高热为 41°C 以上。

A. 肺泡呼吸音正常

B. 肺泡呼吸音消失

C. 肺泡呼吸音增强

D. 肺泡呼吸音延长

E. 以上都不正确

123. 发热患者

【正确答案】 C

【答案解析】 肺泡呼吸音增强：双侧肺泡呼吸音增强见于运动、发热、甲状腺功能亢进症；肺脏或胸腔病变使一侧或一部分肺的呼吸功能减弱或丧失，则健侧或无病变部分的肺泡呼吸音可出现代偿性增强。

124. 大量胸腔积液

【正确答案】 B

【答案解析】 肺泡呼吸音减弱或消失：见于呼吸运动障碍，如全身衰弱、呼吸肌瘫痪、腹压过高、胸膜炎、肋骨骨折、肋间神经痛等；呼吸道阻塞，如支气管炎、支气管哮喘、喉或大支气管肿瘤等；肺顺应性降低，如肺气肿、肺淤血、肺间质炎症等；胸腔内肿物，如肺癌等；胸膜疾患，如胸腔积液、气胸、胸膜增厚及粘连等。

A. 肺部叩诊过清音

B. 肺部叩诊鼓音

C. 肺部叩诊清音

D. 肺部叩诊浊音

E. 肺部叩诊正常

125. 气胸为

【正确答案】 B

【答案解析】 鼓音：产生鼓音的原因是肺部有大的含气腔，见于气胸及直径大于 $3\sim 4\text{cm}$ 的浅表肺大疱、肺空洞，如空洞型肺结核、液化破溃了的肺脓肿或肺肿瘤。

126. 肺气肿为

【正确答案】 A

【答案解析】 过清音：为介于鼓音和清音之间的音响，见于肺内含气量增加且肺泡弹性减退者，如肺气肿、支气管哮喘发作时。

A. 弥漫性肝肿大

B. 局限性肝肿大

C. 肝脏无变化

D. 肝脏缩小

E. 正常肝脏

127. 肝炎时可出现

【正确答案】 A

【答案解析】 肝脏大小变化的临床意义：弥漫性肝肿大见于肝炎、脂肪肝、肝淤血、早期肝硬化、白血病、血吸虫病等；局限性肝肿大见于肝脓肿、肝囊肿（包括肝包虫病）、肝肿瘤等；肝脏缩小见于急性和亚急性重型肝炎、晚期肝硬化。

128. 晚期肝硬化时可出现

【正确答案】 D

【答案解析】 肝脏大小变化的临床意义：弥漫性肝肿大见于肝炎、脂肪肝、肝淤血、早期肝硬化、白血病、血吸虫病等；局限性肝肿大见于肝脓肿、肝囊肿（包括肝包虫病）、肝肿瘤等；肝脏缩小见于急性和亚急性重型肝炎、晚期肝硬化。

- A. 双瞳孔缩小
- B. 双瞳孔散大
- C. 双瞳孔不等大
- D. 瞳孔反射消失
- E. 瞳孔呈乳白色

129. 吗啡中毒的瞳孔变化为

【正确答案】 A

【答案解析】 病理情况下，瞳孔缩小（ $<2\text{mm}$ ）常见于虹膜炎、有机磷农药中毒、毒蕈中毒，以及吗啡、氯丙嗪、毛果云香碱等药物影响。

130. 脑疝的瞳孔变化为

【正确答案】 C

【答案解析】 双侧瞳孔大小不等，常见于脑外伤、脑肿瘤、脑疝及中枢神经梅毒等颅内病变。

- A. 梨形心
- B. 靴形心
- C. 主动脉型心脏
- D. 横位心
- E. 悬滴状心

131. 高血压心脏病心脏呈

【正确答案】 B

【答案解析】 高血压心脏病：X线表现为左心室扩大，主动脉增宽、延长、迂曲，心脏呈靴形。

132. 风湿性心脏病单纯二尖瓣狭窄的心脏呈

【正确答案】 A

【答案解析】 单纯二尖瓣狭窄：X线表现为左心房及右心室增大，左心耳部凸出，肺动脉段突出，主动脉结及左心室变小，心脏呈梨形。

- A. 毛果芸香碱
- B. 新斯的明
- C. 阿托品
- D. 度冷丁
- E. 吗啡

133. 可用于治疗青光眼的是

【正确答案】 A

【答案解析】 毛果芸香碱能够缩瞳、降低眼压，用于青光眼的治疗。青光眼分闭角型和开角型。闭角型青光眼因前房角狭窄，房水回流受阻而使眼内压升高，毛果芸香碱可使前房角间

隙扩大，房水回流通畅，眼内压降低；开角型青光眼因小梁网本身及巩膜静脉窦发生变性或硬化，阻碍了房水循环，引起眼内压升高，毛果芸香碱可能通过扩张巩膜静脉窦周围的小血管及收缩睫状肌，使小梁网结构发生改变而使眼内压下降。

134. 可用于阵发性室上性心动过速的是

【正确答案】 B

【答案解析】 新斯的明通过拟胆碱作用使心室频率减慢，用于治疗压迫眼球或颈动脉窦等兴奋迷走神经措施无效时的阵发性室上性心动过速。

- A. 结节-漏斗通路 D_2 受体
- B. 黑质-纹状体通路 D_2 受体
- C. 中脑-边缘系统和 中脑-皮层通路的 D_2 受体
- D. 脑干网状结构上行激活系统 α 受体
- E. M 胆碱受体

135. 长期应用抗精神病药物出现的口干、便秘、视物模糊是由于阻滞

【正确答案】 E

【答案解析】 氯丙嗪具有阿托品样作用，通过阻断 M 受体，出现口干、视物模糊、尿潴留及便秘等。

136. 氯丙嗪引起的乳房肿胀、溢乳是由于阻滞

【正确答案】 A

【答案解析】 氯丙嗪能阻断结节-漏斗通路的 D_2 样受体，抑制下丘脑催乳素抑制因子的分泌，而使腺垂体分泌催乳素增加。

- A. 青霉素
- B. 氯霉素
- C. 红霉素
- D. 土霉素
- E. 阿奇霉素

137. 可用于治疗回归热的的首选药物是

【正确答案】 A

【答案解析】 青霉素是治疗放线菌病、钩端螺旋体病、梅毒、回归热等及预防感染性心内膜炎发生的首选药。

138. 可产生“灰婴综合征”的药物是

【正确答案】 B

【答案解析】 此题内容为氯霉素扩展的知识点。不属于大纲内容，但是在考试及临床工作中是常见的知识。灰婴综合征是氯霉素的严重不良反应之一。灰婴综合征的出现原因在于早产儿和新生儿肝脏内葡萄糖醛酸基转移酶缺乏，使氯霉素在肝脏内代谢障碍，而早产及新生儿的肾脏排泄功能也不完善，造成氯霉素在体内的蓄积。

- A. 亚硝酸类
- B. 喜树碱类
- C. 放线菌素类
- D. 嘌呤类核苷酸拮抗药
- E. 二氢叶酸还原酶抑制药

139. 属于烷化剂中常用药物的是

【正确答案】 A

【答案解析】 烷化剂又称烃化剂，是一类化学性质很活泼的化合物。它们具有活泼的烷基基团，能与细胞的多种功能成分起作用，从而影响肿瘤细胞的增殖。该类药属周期非特异性抗

肿瘤药，能直接破坏 DNA 并阻止其复制。如氮芥类、乙烯亚胺类、亚硝脲类等。

140. 属于抗肿瘤植物药中常用药物的是

【正确答案】 B

【答案解析】 抗肿瘤植物药：该类药属周期特异性抗肿瘤药，影响蛋白质的合成。如鬼臼毒素类、长春碱类，喜树碱类。

- A. 病原体被消灭或排出体外
- B. 病原体携带状态
- C. 隐性感染
- D. 潜伏性感染
- E. 显性感染

141. 人体与病原体处于相持状态，不出现临床症状，不排出病原体

【正确答案】 D

【答案解析】 潜伏性感染是指病原体侵入人体某些部位后，机体免疫系统将病原体局限化，但又不能清除病原体，机体免疫功能下降时潜伏的病原体才引起显性感染。（不能排出病原体如：水痘、带状疱疹）。

142. 感染病原体后不出现临床表现，但产生了特异性免疫

【正确答案】 C

【答案解析】 隐性感染又称亚临床感染，病原体只引起特异性免疫应答，不引起或只引起轻微的组织损伤，无临床症状，只能通过免疫学检查发现。（临床最常见）。

- A. 血尿
- B. 高热、休克、惊厥、呼吸衰竭
- C. 头痛、腰痛、眼眶痛
- D. 眼红、腿痛、淋巴结肿大
- E. 相对缓脉

143. 流行性出血热表现为

【正确答案】 C

【答案解析】 流行性出血热发热期：起病急骤，突然畏寒、发热，体温在 1~2 日内可达 39~40℃，热型多为弛张热或稽留热，一般持续 3~7 日。同时出现全身中毒症状，高度乏力，周身酸痛，常有典型的“三痛”：头痛、腰痛、眼眶痛，常伴较突出的胃肠道症状。

144. 中毒型菌痢表现为

【正确答案】 B

【答案解析】 中毒型菌痢以儿童多见，有高热、惊厥、意识障碍及呼吸、循环衰竭。

- A. 呼吸道传播
- B. 消化道传播
- C. 虫媒传播
- D. 性传播
- E. 母婴传播

145. 流脑的传播途径主要是

【正确答案】 A

【答案解析】

146. 乙脑的传播途径主要是

【正确答案】 C

【答案解析】 流脑病原菌主要通过咳嗽、喷嚏、说话等由飞沫借空气经呼吸道传播。乙脑主要通过蚊虫叮咬而传播。

- A. 糖皮质激素
- B. 复方磺氨甲基异唑
- C. 痢特灵
- D. 氯苄西林
- E. 氧氟沙星

147. 伤寒病原治疗首选

【正确答案】 E

【答案解析】 氟喹诺酮类是治疗伤寒的首选药物，如氧氟沙星等。

148. 伤寒并发中毒性心肌炎，必要时可给予

【正确答案】 A

【答案解析】 伤寒并发中毒性心肌炎的治疗：卧床休息，注意输液量和速度，营养心肌治疗。必要时应用糖皮质激素。

- A. 体现了医务人员对病人、集体和社会所负的道德责任
- B. 主要包括情感、责任感和事业感
- C. 促使医务人员关怀、体贴病人，并于病痛危难之时全力救护
- D. 促使医务人员在任何情况下，都能坚守医学道德原则和规范要求，抵制不正之风
- E. 促使医务人员养成良好的医护作风，提高责任感

149. 体现医学道德审慎作用的是

【正确答案】 E

【答案解析】 审慎即周密谨慎，指医务人员在医疗行为之前的周密思考和医疗过程中的谨慎认真，是医务人员在世代相袭的职业传统中形成的稳定的职业心理和习惯。坚持审慎的医疗作风，才能提高医疗质量，防止医疗差错、误诊和医疗事故。审慎的道德要求：医务人员在医疗实践的各个环节，自觉地做到认真负责、谨慎小心、一丝不苟；不断提高业务水平，在技术上做到精益求精。

150. 体现医学道德情感作用的是

【正确答案】 C

【答案解析】 医学道德情感是医务人员对患者、对医疗卫生工作的职业态度和内心体验，是建立在对患者的生命和健康高度负责基础上的。医务人员的情感有三个特点：医学职业的特殊性、理智性、纯洁性。医务人员情感的内容包括：①同情感：见到患者的遭遇和不幸，在自己的情感上产生怜悯之情，产生愿为其解除病痛的感觉；②责任感；③事业感。

第二单元

一、A1

1. 不属于肺炎链球菌肺炎病理改变分期的是

- A. 充血期
- B. 红色肝变期
- C. 灰色肝变期
- D. 消散期
- E. 吸收期

【正确答案】 E

【答案解析】 肺炎链球菌肺炎：多呈大叶性或肺段性分布。病理变化可分为四期：早期为充

血期，表现为肺组织充血、扩张、水肿和浆液性渗出；继而为红色肝变期，肺泡内有大量中性粒细胞、吞噬细胞及红细胞的渗出；进而为灰色肝变期，大量白细胞纤维蛋白渗出；最后为消散期，纤维蛋白性渗出物溶解、吸收，肺泡重新充气。

2. 重度哮喘时，除吸氧外还应采取哪些措施

- A. 应用糖皮质激素、支气管扩张剂，维持水电解质平衡，控制感染
- B. 尽快找到过敏原，去除诱因，或进行脱敏疗法
- C. 大剂量抗生素及脱敏疗法
- D. 应用支气管舒张剂，色甘酸钠
- E. 吸入 β_2 受体激动剂，应用茶碱控释片，吸入糖皮质激素

【正确答案】E

【答案解析】部分中度和所有重度急性发作的治疗

1) 氧疗。

2) 速效 β_2 受体激动剂：初始治疗时连续雾化给药，随后根据需要间断给药（每4小时1次）。联合使用 β_2 受体激动剂和抗胆碱能制剂（如异丙托溴铵）能够取得更好的支气管舒张作用。

3) 茶碱：其支气管舒张作用弱于SABA，不良反应较大应谨慎使用。对规则服用茶碱缓释制剂的患者，静脉使用茶碱应尽可能监测茶碱血药浓度。

4) 糖皮质激素：尽早使用全身激素，特别是对速效 β_2 受体激动剂初始治疗反应不完全或疗效不能维持，以及在口服激素基础上仍然出现急性发作的患者。

用法：泼尼松龙30~50mg或等效的其他激素，每日单次给药。严重的急性发作或口服激素不能耐受时，可采用静脉注射或滴注，如甲基泼尼松龙80~160mg，或氢化可的松400~1000mg分次给药。静脉使用激素2~3天，继之口服激素3~5天。

5) 机械通气：机械通气指征：意识改变、呼吸肌疲劳、 $\text{PaCO}_2 \geq 45\text{mmHg}$ （ $1\text{mmHg}=0.133\text{kPa}$ ）等。可先采用经鼻（面）罩无创机械通气，若无效及早行气管插管机械通气。哮喘急性发作机械通气需要较高的吸气压，可使用适当水平的呼气末正压（PEEP）治疗。

大多数哮喘急性发作并非由细菌感染引起，应严格控制抗菌药物的使用指征，除非有细菌感染的证据，或属于重度或危重哮喘急性发作。

3. 急性右心衰竭主要常见病因为

- A. 肺淤血
- B. 急性肺水肿
- C. 心源性休克
- D. 右心室梗死
- E. 急性心肌缺血

【正确答案】D

【答案解析】急性右心衰竭主要常见病因为右心室梗死和急性大块肺栓塞。

4. 急性心肌梗死早期最有效的治疗是

- A. 静脉滴注利多卡因
- B. 静脉滴注极化液
- C. 吸氧
- D. 静脉滴注肝素
- E. 静脉注射溶栓药物

【正确答案】E

【答案解析】急性心肌梗死治疗应早期溶栓。

5. 急性心肌梗死最常见的心律失常是

- A. 窦性停搏

- B. 阵发性室上性心动过速
- C. 室性期前收缩
- D. 交界性心律
- E. 心房扑动

【正确答案】 C

【答案解析】 心律失常以 24 小时内最多见，以室性心律失常最多，尤其是室性期前收缩。

6. 不属于心脏性猝死的临床过程分期的是

- A. 前驱期
- B. 发病期
- C. 缓解期
- D. 心脏骤停期
- E. 生物学死亡期

【正确答案】 C

【答案解析】 心脏性猝死的临床过程常分为 4 期：前驱期、发病期、心脏骤停期和生物学死亡期。

7. 治疗溃疡性结肠炎湿热内蕴证首选

- A. 四神丸
- B. 白头翁汤
- C. 痛泻要方
- D. 大黄牡丹汤
- E. 蒿芩清胆汤

【正确答案】 B

【答案解析】 溃疡性结肠炎湿热内蕴证治法为清热利湿，方药首选白头翁汤加味。

8. 目前根治原发性肝癌的最好方法是

- A. 放射治疗
- B. 免疫治疗
- C. 抗癌药物局部治疗
- D. 冷冻治疗
- E. 手术切除

【正确答案】 E

【答案解析】 手术切除仍是目前根治原发性肝癌的最好方法。

9. 慢性胃炎主要病理学特征是

- A. 炎症，萎缩，异常增生
- B. 萎缩，化生，异常增生
- C. 炎症，萎缩和肠化生
- D. 萎缩和化生
- E. 以上均不是

【正确答案】 C

【答案解析】 慢性胃炎病理变化是胃黏膜损伤与修复的慢性过程，主要病理学特征是炎症、萎缩和肠化生。

10. 中晚期胃癌体征中最常见的是

- A. 早饱
- B. 纳差
- C. 腹胀

- D. 上腹压痛
- E. 体重下降

【正确答案】 D

【答案解析】 进展期胃癌最早出现的症状是上腹痛,可伴早饱、纳差、腹胀、体重下降等。早期胃癌可无任何体征,中晚期癌的体征中以上腹压痛最为常见。

11. 慢性髓细胞性白血病最显著体征是

- A. 肝脏肿大
- B. 淋巴结肿大
- C. 胫骨压痛
- D. 脾脏肿大
- E. 皮肤及黏膜葛露点

【正确答案】 D

【答案解析】 慢性髓细胞性白血病常以脾脏肿大为最显著体征。

12. 关于脑栓塞的描述,下列哪项不正确

- A. 多为青壮年
- B. 可有 TIA 史
- C. 少有昏迷
- D. 脑脊液呈血性
- E. CT 脑检查呈低密度影

【正确答案】 D

【答案解析】 D 项表达不准确,不全面。脑栓塞的脑脊液:压力正常,大面积栓塞时可增高;出血性梗死者脑脊液可呈血性或镜下可见红细胞;亚急性细菌性心内膜炎等感染性脑栓塞脑脊液白细胞增高,一般可达 $200 \times 10^6/L$,早期以中性粒细胞为主,晚期以淋巴细胞为主;脂肪栓塞者脑脊液可见脂肪球。

13. 关于癫痫的中医分型下列描述不正确的是

- A. 肝火痰热证
- B. 脾虚痰湿证
- C. 肝肾阴虚证
- D. 痰湿蕴肺证
- E. 瘀阻清窍证

【正确答案】 D

【答案解析】 癫痫的中医证型包括:发作期:阳痫、阴痫;休止期:肝火痰热证,脾虚痰湿证,肝肾阴虚证,心脾两虚证,瘀阻清窍证。

14. 急性一氧化碳重度中毒临床上主要表现为

- A. 头痛
- B. 头晕
- C. 恶心
- D. 呕吐
- E. 反射消失

【正确答案】 E

【答案解析】 重度中毒血 COHb 浓度高于 50%。呈深昏迷状态,各种反射消失。部分患者表现为去大脑皮质状态(睁眼昏迷)。体温升高,呼吸频数,严重时呼吸衰竭,脉搏快而弱,血压下降。如空气中 CO 浓度很高,患者可在几次深呼吸后立即突然发生昏迷、惊厥、呼吸困难以致呼吸麻痹,称为“闪电样中毒”。重度中毒常出现吸入性肺炎、肺水肿、心律失常、

心肌梗死、皮肤水疱、急性肾衰竭、脑局灶损害、上消化道出血等并发症。

15. 喘脱危象，宜急服

- A. 回阳救急汤
- B. 苏子降气汤
- C. 参附汤送服黑锡丹
- D. 控涎丹
- E. 紫金丹

【正确答案】 C

【答案解析】 如见喘脱危象者，急用参附汤送服蛤蚧粉或黑锡丹补气纳肾，回阳固脱。

16. 不寐的病位及相关脏腑为

- A. 病位在心，与肝、脾、肾相关
- B. 病位在脾，与心、肝、肾相关
- C. 病位在肝，与肺、脾、肾相关
- D. 病位在心，与肝、肾相关
- E. 病位在脾，与心、肝相关

【正确答案】 A

【答案解析】 其病位主要在心，与肝、脾、肾密切相关。

17. 痢疾与泄泻的鉴别点，下列何项无鉴别意义

- A. 泻下稀薄或赤白黏冻
- B. 泻下爽利与否
- C. 里急后重之有无
- D. 泻下次数之多少
- E. 泻下有无脓血

【正确答案】 D

【答案解析】 泄泻与痢疾：两者均为大便次数增多、粪质稀薄的病证。泄泻以大便次数增加，粪质稀溏，甚则如水样，或完谷不化为主症，大便不带脓血，也无里急后重，或无腹痛。而痢疾以腹痛、里急后重、便下赤白脓血为特征。

18. 水肿的主要病变脏腑是

- A. 肝、脾、胃
- B. 肝、胃、肾
- C. 肺、脾、肾
- D. 肺、肝、脾
- E. 肺、肝、肾

【正确答案】 C

【答案解析】 水肿病位在肺、脾、肾，而关键在肾。

19. 治疗鼻衄热邪犯肺证的最佳选方是

- A. 银翘散
- B. 沙参麦冬汤
- C. 泻白散
- D. 桑菊饮
- E. 清燥救肺汤

【正确答案】 D

【答案解析】 鼻衄热邪犯肺证

证候：鼻燥衄血，口干咽燥，或兼有身热，恶风，头痛，咳嗽，痰少等症，舌质红，苔薄，

脉数。

治法: 清泄肺热, 凉血止血。

方药: 桑菊饮加减。

20. 自汗、盗汗与黄汗的主要区别是

- A. 汗出色黄, 染衣着色
- B. 头面出汗
- C. 四肢出汗
- D. 白昼汗出溱溱
- E. 睡眠中汗出津津

【正确答案】 A

【答案解析】 自汗、盗汗与黄汗: 黄汗汗出色黄, 染衣着色, 常伴见口中黏苦, 渴不欲饮, 小便不利, 苔黄腻, 脉弦滑等湿热内郁之症。

21. 符合“治痿者独取阳明”原则的是

- A. 补肝肾
- B. 养肺阴
- C. 滋肾阴
- D. 去湿热
- E. 化食滞

【正确答案】 D

【答案解析】 “治痿者独取阳明”, 是指补脾胃、清胃火、去湿热。

22. 寒湿腰痛特点不包括

- A. 腰部冷痛重着
- B. 腰痛如刺
- C. 静卧痛不减
- D. 寒冷阴雨天气加重
- E. 转侧不利, 逐渐加重

【正确答案】 B

【答案解析】 腰痛如刺为瘀血腰痛的特点。

23. 痛风所归属的中医学范畴为

- A. 痹症
- B. 痛痹
- C. 历节
- D. 行痹
- E. 着痹

【正确答案】 A

【答案解析】 痛风可归属于中医学“痹症”范畴。

24. 黄疸病的最主要的病理因素是

- A. 湿邪
- B. 热邪
- C. 寒邪
- D. 疫毒
- E. 血瘀

【正确答案】 A

【答案解析】 病理因素主要为湿邪, 病理性质有阴阳之分。阳黄多因湿热熏蒸, 或疫毒伤血,

发黄迅速而色鲜明;阴黄多因寒湿阻遏,脾阳不振,发黄持久而色晦暗。

25. 肿而色红,皮薄光泽,掀热疼痛,肿势急剧的为

- A. 热肿
- B. 寒肿
- C. 风肿
- D. 湿肿
- E. 痰肿

【正确答案】 A

【答案解析】 热肿: 肿而色红,皮薄光泽,掀热疼痛,肿势急剧。常见于阳证疮疡,如疔病初期、丹毒等。

26. 关于麻醉前 ASA 病情分级标准错误的是

- A. I 级无脏器改变,估计耐受麻醉手术良好
- B. II 级化验有改变,估计耐受麻醉手术有困难
- C. III 级重要脏器功能有改变,需重视术前准备工作
- D. IV 级重要脏器功能明显改变,麻醉手术有相当的危险
- E. V 级重要脏器功能处于衰竭程度,不论麻醉手术与否都有严重生命危险

【正确答案】 B

【答案解析】 麻醉前 ASA 病情分级标准:

- I 级全身情况良好,无脏器改变,估计耐受麻醉手术良好;
- II 级轻微查体和/或化验有改变,但全身情况尚好,估计耐受麻醉手术仍好;
- III 级生命体征、重要脏器功能有改变,但处于代偿范围,需重视术前准备工作;
- IV 级生命体征、重要脏器功能明显改变,处于代偿不全状态,麻醉手术有相当的危险;
- V 级生命体征、重要脏器功能处于衰竭程度,不论麻醉手术与否都有严重生命危险。

27. 高钾血症的治疗不包括

- A. 立即停止钾盐摄入
- B. 积极防治心律失常
- C. 降低血钾浓度
- D. 恢复肾脏功能
- E. 每日预防性补钾

【正确答案】 E

【答案解析】 高钾血症的治疗:

- (1) 停止摄入钾,积极治疗原发病。
- (2) 对抗心律失常,应用钙剂拮抗钾对心肌的抑制作用。
- (3) 降低血钾浓度,使 K⁺ 暂时转入细胞内。
- (4) 促进排钾。

每日预防性补钾,是低钾血症的治疗方法之一。故选 E。

28. 不属术前生理准备的是

- A. 适应性训练
- B. 输血补液
- C. 预防感染
- D. 肠道准备
- E. 明确诊断

【正确答案】 E

【答案解析】术前一般准备

(1) 心理准备。

(2) 生理准备

①适应性训练。

②输血补液, 改善全身营养及体液状态。

③预防感染。

④肠道准备: 一般手术, 术前 12 时起禁食, 术前 4 小时禁水; 对于胃肠道手术患者, 则在术前 3 天开始做肠道准备, 包括进半流质、服用肠道吸收抗生素及服用轻泻剂、术前晚及手术当日晨做清洁灌肠或结肠灌洗。

⑤皮肤准备。

29. 治疗颈痈首选

A. 五味消毒饮

B. 牛蒡解肌汤

C. 柴胡清肝汤

D. 萆薢渗湿汤

E. 活血散瘀汤

【正确答案】B

【答案解析】颈痈的证候: 多发于项部两侧的颌下。初起结块形如鸡卵, 皮色不变, 肿胀、灼热、疼痛。逐渐漫肿坚实; 伴有寒热、头痛、项强; 舌红, 苔黄腻, 脉滑数。

治法: 散风清热, 化痰消肿。

方药: 牛蒡解肌汤加减。

30. 闭式胸膜腔引流, 引流中液体的穿刺部位一般选在

A. 腋中线第 6 肋间

B. 腋后线第 7 肋间

C. 腋中线第 7 肋间

D. 腋中线和腋后线之间的第 6~8 肋

E. 腋后线第 8 肋间

【正确答案】D

【答案解析】闭式胸膜腔引流的穿刺部位: 液体一般选在腋中线和腋后线之间的第 6~8 肋间插管引流。

31. 肺癌转移引起的体征最常见的为

A. 锁骨上淋巴结肿大

B. 锁骨下淋巴结肿大

C. 滑车上淋巴结肿大

D. 腹股沟淋巴结肿大

E. 腋窝淋巴结肿大

【正确答案】A

【答案解析】肺癌转移引起的体征最常见的为锁骨上淋巴结肿大, 也可见腋下淋巴结肿大。

32. 急性胆道感染的一般治疗处理错误的是

A. 输液

B. 全身支持疗法

C. 给易消化食物

D. 给广谱抗生素

E. 给解痉止痛药

【正确答案】C

【答案解析】急性胆道感染的一般治疗：禁食，输液，纠正水、电解质及酸碱代谢失衡，全身支持疗法；选用广谱抗生素或联合用药；使用维生素K、解痉止痛药等对症处理。

33.下列不属乳腺增生病症状的是

- A. 乳房胀痛
- B. 乳头溢液
- C. 经期紊乱
- D. 乳房内肿块
- E. 肿块有压痛

【正确答案】E

【答案解析】乳房增生病的临床表现

1. 症状

(1) 乳房内肿块。

(2) 乳房胀痛。

(3) 乳头溢液。

(4) 其他症状：常可伴有胸闷不舒，心烦易怒，失眠多梦，疲乏无力，腰膝酸软，经期紊乱，经量偏少等表现。

2. 体征乳房内可扪及多个形态不规则的肿块，多呈片块状、条索状或颗粒状结节，也可各种形态混合存在。各种形态的肿块边界都不甚清楚，与皮肤及深部组织无粘连，推之能活动，多有压痛。

34.腹股沟直疝最有效的治疗手段是

- A. 使用疝带
- B. 疝修补术
- C. 疝成形术
- D. 疝高位结扎
- E. 手术加强腹股沟三角

【正确答案】E

【答案解析】早期可试用疝带治疗，但手术加强腹股沟三角仍是最有效的治疗手段。

35.周围型下肢深静脉血栓形成发生的部位是

- A. 腹壁浅静脉
- B. 旋髂浅静脉
- C. 股外侧静脉
- D. 髂-股静脉
- E. 股-腘静脉

【正确答案】E

【答案解析】周围型下肢深静脉血栓形成是股-腘静脉以及小腿端深静脉处血栓形成。

36.未生育过的成年妇女的子宫大小、重量、宫腔容积分别为

- A. 7cm×5cm×3cm, 50g, 10ml
- B. 8cm×6cm×4cm, 75g, 10ml
- C. 7cm×5cm×3cm, 50g, 5ml
- D. 5cm×4cm×3cm, 75g, 5ml
- E. 5cm×3cm×2cm, 50g, 3ml

【正确答案】C

【答案解析】子宫位于骨盆腔中央，前方为膀胱，后方为直肠，呈倒置的梨形，为空腔器官，

重约50g，长7~8cm，宽4~5cm，厚2~3cm，容量约5ml。

37. 中医称宫颈外口为

- A. 胞脏
- B. 子处
- C. 子门
- D. 玉门
- E. 阴户

【正确答案】 C

【答案解析】 中医将宫颈外口称为子门、子户。子宫又称为胞脏、子处，外阴称为阴户，将阴道口和处女膜称为玉门（未嫁）、龙门（未产）、胞门（已产）。

38. 子宫在经期、分娩期表现为

- A. 泻而不藏
- B. 藏而不泻
- C. 有藏有泻
- D. 定期藏泻
- E. 以上都不是

【正确答案】 A

【答案解析】 子宫形态中空及在月经期、分娩期“泻而不藏”似腑。

39. 下列关于卵泡雌激素的生理作用，叙述错误的是

- A. 直接促进窦前卵泡及窦状卵泡的生长发育
- B. 调节优势卵泡的选择和非优势卵泡的闭锁
- C. 激活颗粒细胞芳香化酶，促进雌二醇的合成与分泌
- D. 在黄体期维持黄体功能，促进孕激素、雌激素合成与分泌
- E. 在卵泡期晚期与雌激素协同，诱导颗粒细胞生成LH受体，为排卵及黄素化作准备

【正确答案】 D

【答案解析】 卵泡刺激素（FSH）是卵泡发育必需的激素，其主要生理作用是直接促进窦前卵泡及窦状卵泡的生长发育；激活颗粒细胞芳香化酶，促进雌二醇的合成与分泌；在前一周期的黄体晚期及卵泡早期，促使卵巢内窦卵泡群的募集；调节优势卵泡的选择和非优势卵泡的闭锁；在卵泡期晚期与雌激素协同，诱导颗粒细胞生成LH受体，为排卵及黄素化作准备。选项D是属于黄体生成素的生理作用。

40. 对于妊娠期的妇女，下列何种药物应慎用

- A. 桃仁
- B. 牛膝
- C. 干姜
- D. 木通
- E. 以上都是

【正确答案】 E

【答案解析】 妊娠期间慎用的药物：包括通经去瘀、行气破滞及辛热滑利之品，如桃仁、红花、牛膝、大黄、枳实、附子、肉桂、干姜、木通、冬葵子、瞿麦等。此题内容涉及到了中药的相关知识，在此作为辅助了解的内容学习即可。

41. 正常枕先露分娩机制，下述哪项正确

- A. 下降，衔接，内旋转，俯屈，仰伸复位，外旋转
- B. 衔接，俯屈，内旋转，下降，仰伸复位，外旋转
- C. 衔接，下降，俯屈，内旋转，仰伸复位，外旋转

- D. 下降, 俯屈, 衔接, 内旋转, 仰伸复位, 外旋转
E. 衔接, 下降, 内旋转, 俯屈, 仰伸复位, 外旋转

【正确答案】 C

【答案解析】 正常分娩机制为: 衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转。

42. 易出现月经先期、经期延长、漏下、胎漏等病的是

- A. 素体阴虚者
B. 素体阳虚者
C. 体质强健者
D. 偏脾虚者
E. 偏肝郁者

【正确答案】 A

【答案解析】 在妇产科疾病的发生中, 往往素体阴虚者易出现月经先期、经期延长、漏下、胎漏等病。

43. 严重的胎盘早剥引发的病理生理改变包括

- A. 凝血功能障碍
B. 继发性纤溶亢进
C. 弥漫性血管内凝血
D. 脏器缺血和功能障碍
E. 以上都是

【正确答案】 E

【答案解析】 严重的胎盘早剥可引发弥漫性血管内凝血(DIC)、脏器缺血和功能障碍、继发性纤溶亢进、凝血功能障碍等一系列病理生理改变。

44. 浸润性鳞状细胞癌占宫颈癌的比例为

- A. 3%~5%
B. 15%~20%
C. 30%~35%
D. 55%~65%
E. 75%~80%

【正确答案】 E

【答案解析】 浸润性鳞状细胞癌占宫颈癌的75%~80%。

45. 下列属 I 度子宫脱垂轻型的是

- A. 子宫颈外口距处女膜缘 $<4\text{cm}$, 但未达处女膜缘
B. 子宫颈外口已达处女膜缘, 在阴道口可见到宫颈
C. 子宫颈已脱出阴道口, 但宫体仍在阴道内
D. 宫颈及部分宫体已脱出于阴道口
E. 子宫颈及宫体全部脱出至阴道口外

【正确答案】 A

【答案解析】 子宫脱垂的分度:

I 度: 轻型: 子宫颈外口距处女膜缘 $<4\text{cm}$, 但未达处女膜缘; 重型: 子宫颈外口已达处女膜缘, 在阴道口可见到宫颈。

II 度: 轻型: 子宫颈已脱出阴道口, 但宫体仍在阴道内; 重型: 宫颈及部分宫体已脱出于阴道口。

III 度: 子宫颈及宫体全部脱出至阴道口外。

46. 人工流产负压吸引术适用于

- A. 孕7周以内
- B. 孕10周以内
- C. 孕11~12周
- D. 孕12~14周
- E. 以上都不对

【正确答案】 B

【答案解析】 负压吸引术适应证：（1）妊娠10周内要求终止妊娠而无禁忌证者。（2）妊娠10周内因某种疾病而不宜继续妊娠者。

47. 中度脱水时患儿失水量约为体重的

- A. 5%以下
- B. 5%左右
- C. 5%~10%
- D. 10%左右
- E. 10%以上

【正确答案】 C

【答案解析】 轻度脱水：失水量占体重5%以下（30~50ml/kg）。中度脱水：失水量占体重的5%~10%（50~100ml/kg）。重度脱水：失水量占体重的10%以上（100~120ml/kg）。

48. 下列各项中，与胎黄发病无关的脏腑是

- A. 脾
- B. 胃
- C. 肝
- D. 胆
- E. 肾

【正确答案】 E

【答案解析】 胎黄的发病与先天禀赋因素及后天感受湿邪或湿热毒邪密切相关。病机为湿邪或湿热之邪阻滞脾胃，肝失疏泄，胆汁外溢，而发为胎黄，病位主要在脾、胃、肝、胆。故根据题干要求，此题的正确选项是E。

49. 小儿肺炎风寒闭肺证的治法是

- A. 辛温宣肺，化痰止咳
- B. 辛凉宣肺，清热化痰
- C. 清热涤痰，开肺定喘
- D. 清热解毒，泻肺开闭
- E. 养阴清肺，润肺止咳

【正确答案】 A

【答案解析】 小儿肺炎之风寒闭肺证。

证候：恶寒发热，无汗，呛咳不爽，呼吸气急，痰白而稀，口不渴，咽不红，舌质不红，舌苔薄白或白腻，脉浮紧，指纹浮红。

治法：辛温宣肺，化痰止咳。

方药：华盖散加减。

50. 治疗小儿泄泻气阴两伤证的首选方剂是

- A. 当归四逆汤
- B. 参苓白术散
- C. 人参乌梅汤
- D. 附子理中汤合四神丸

E. 生脉散合参附龙牡救逆汤

【正确答案】 C

【答案解析】 泄泻之气阴两伤证。

证候：泻下过度，质稀如水，精神萎靡或心烦不安，目眶及凶门凹陷，皮肤干燥或枯瘪，啼哭无泪，口渴引饮，小便短少，甚至无尿，唇红而干，舌红少津，苔少或无苔，脉细数。

治法：健脾益气，酸甘敛阴。

方药：人参乌梅汤加减。

51. 治疗小儿急性肾小球肾炎湿热内侵证的首选方是

- A. 温胆汤合附子泻心汤
- B. 己椒苈黄丸合参附汤
- C. 知柏地黄丸合二至丸
- D. 五味消毒饮合小蓟饮子
- E. 麻黄连翘赤小豆汤合五苓散

【正确答案】 D

【答案解析】 急性肾小球肾炎之湿热内侵证。

证候：浮肿或轻或重，小便黄赤而少，甚者尿血，烦热口渴，头身困重，常有近期疮毒史，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清热利湿，凉血止血。

方药：五味消毒饮合小蓟饮子加减。

52. 下列哪项不是小儿注意力缺陷多动障碍的临床表现

- A. 活动过多
- B. 注意力不集中
- C. 习惯性抽搐
- D. 情绪不稳
- E. 学习困难

【正确答案】 C

【答案解析】 小儿注意力缺陷多动障碍临床表现：活动过多；注意力不集中；情绪不稳、冲动任性；学习困难。

53. 对诊断小儿支气管哮喘最有价值的肺部体征是

- A. 双肺呼吸音增粗
- B. 双下肺中细湿啰音
- C. 两肺满布哮鸣音，呼气延长
- D. 双肺呼吸音减弱
- E. 右肺中湿啰音，随体位改变

【正确答案】 C

【答案解析】 儿童哮喘诊断标准（2003年中华医学会儿科分会呼吸学组）：

（1）反复发作的喘息、气促、胸闷或咳嗽，多与接触变应原、冷空气、物理或化学性刺激、病毒性上下呼吸道感染、运动等有关。

（2）发作时双肺可闻及散在或弥漫性以呼气相为主的哮鸣音，呼气相延长。

（3）支气管舒张剂有显著疗效。

（4）除外其他疾病引起的喘息、气促、胸闷或咳嗽。

（5）对于症状不典型的患儿，同时在肺部闻及哮鸣音者，可酌情采用支气管舒张试验协助诊断，若阳性可诊断为哮喘。

54. 下列关于各感染性疾病的潜伏期叙述错误的是

- A. 麻疹潜伏期一般为 6~18 天
- B. 风疹潜伏期一般为 14~21 天
- C. 水痘潜伏期一般为 12~21 天
- D. 猩红热潜伏期一般为 7~14 天
- E. 中毒型细菌性痢疾潜伏期一般为数小时至 1~2 天

【正确答案】D

【答案解析】猩红热潜伏期通常为 2~3 天，短者 1 天，长者 5~6 天。故根据题干要求，此题潜伏期的叙述错误的是 D 选项。

55. 治疗蛔虫病之蛔虫证的首选方剂是

- A. 乌梅丸
- B. 消乳丸
- C. 健脾丸
- D. 使君子散
- E. 人参乌梅汤

【正确答案】D

【答案解析】蛔虫证的证候：脐周腹痛，时作时止，饮食不振，日见消瘦，大便不调，面色萎黄，或恶心、呕吐，或吐蛔虫，或大便下虫。睡眠不安，寐中磨牙，甚则爱挖鼻孔，咬衣角，嗜食泥土等；有的患儿面部出现淡色白斑，巩膜出现蓝色斑点，或下唇出现颗粒样大小白点。粪便镜检有蛔虫卵。

治法：驱蛔杀虫，调理脾胃。

方药：使君子散加减。

56. 积滞乳食内积证的治疗首选方是

- A. 健脾丸
- B. 七味白术散
- C. 枳实导滞丸
- D. 肥儿丸或疳积散
- E. 消乳丸或保和丸

【正确答案】E

【答案解析】积滞乳食内积证。

证候：不思乳食，嗳腐酸馊或呕吐食物、乳片，脘腹胀满，疼痛拒按，大便酸臭，或便秘夜眠不安，苔白厚腻，脉象弦滑，或指纹紫滞。

治法：消乳化石，和中导滞。

方药：乳积者，选消乳丸加减。食积者，选保和丸加减。

57. 治疗小儿汗证营卫失调的首选方剂是

- A. 玉屏风散
- B. 黄芪桂枝五物汤
- C. 生脉散
- D. 牡蛎散
- E. 泻黄散

【正确答案】B

【答案解析】小儿汗证，营卫失调证，证候：以自汗为主，或伴盗汗，汗出遍身而抚之不温，畏寒恶风，不发热，或伴有低热，精神疲倦，胃纳不振，舌质淡红，苔薄白，脉缓。治法：调和营卫。方药：黄芪桂枝五物汤加减。

二、A2

58. 患者，男，64岁，慢性咳嗽咳痰10余年，现症见咳逆喘息不得卧，痰多稀薄，恶寒发热，背冷无汗，渴不多饮，或渴喜热饮，面色青晦，舌苔白滑，脉弦紧。治疗首选的方药是

- A. 小青龙汤加减
- B. 二陈汤合三子养亲汤加减
- C. 桑白皮汤加减
- D. 生脉散和六君子汤加减
- E. 真武汤加减

【正确答案】A

【答案解析】根据患者的临床症状可以判断属于慢性阻塞性肺疾病的外寒内饮证，所以本题选择小青龙汤加减。外寒内饮证，证候：咳逆喘息不得卧，痰多稀薄，恶寒发热，背冷无汗，渴不多饮，或渴喜热饮，面色青晦，舌苔白滑，脉弦紧。治法：温肺散寒，解表化饮。方药：小青龙汤加减。

59. 张某，男，48岁。支气管肺癌术后3个月，配合中药治疗。现症见：咳嗽不畅，咯痰不爽，胸胁胀痛、刺痛，面青唇暗，大便秘结，舌质暗紫，舌下有瘀斑，脉弦。治拟何法

- A. 化痰散结，行气止痛
- B. 祛湿化痰，清热解毒
- C. 养阴清热，解毒散结
- D. 益气养阴，化痰散结
- E. 行气化滞，清热解毒

【正确答案】A

【答案解析】肺癌气滞血瘀证

证候：咳嗽，咳痰，或痰血暗红，胸闷胀痛或刺痛，面青唇暗，肺中积块，舌质暗紫或有瘀斑、瘀点，脉弦或涩。治法：化痰散结，行气止痛。

方药：血府逐瘀汤加减。

60. 某男，32岁，因寒战、高热、咳嗽5天入院。查体：血压115/75mmHg，急性病容，呼吸急促，口唇发绀，右下肺可听到支气管呼吸音。X线示：肺段大片炎症浸润阴影。血象：白细胞 $17 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.78。其治疗叙述错误的是

- A. 一经诊断应立即开始抗生素治疗
- B. 首选青霉素G
- C. 病人应卧床休息，宜食用营养而易消化的食物
- D. 可应用大环内酯类、氟喹诺酮类、头孢菌素类药物
- E. 首先应用退热剂，使体温尽快恢复正常

【正确答案】E

【答案解析】考虑患者为肺炎球菌肺炎，应立即进行抗生素治疗。退热剂会影响热型，不适宜使用，而采取物理降温的方法。

61. 患者，女性，41岁。三天前出现较剧烈的心前区疼痛，伴有发热，呼吸和咳嗽时加重，有心包摩擦音；心电图除aVR外，其余导联均有ST段弓背向下的抬高，T波倒置，无异常Q波出现。应诊断为

- A. 急性胃穿孔
- B. 消化性溃疡
- C. 心肌梗死
- D. 急性胆囊炎
- E. 急性心包炎

【正确答案】E

【答案解析】此题是对急性心包炎的考查。急性心包炎：可有较剧烈而持久的心前区疼痛。疼痛与发热同时出现，呼吸和咳嗽时加重，早期即有心包摩擦音，后者和疼痛在心包腔出现渗液时均消失；心电图除 aVR 外，其余导联均有 ST 段弓背向下的抬高，T 波倒置，无异常 Q 波出现。

62. 患者男性，60 岁。急性前壁心肌梗死 2 天，晕厥 2 次，心室率 40 次/分，律齐，心电图示 III 度房室传导阻滞。首选治疗是

- A. 麻黄素
- B. 人工心脏起搏器
- C. 异丙肾上腺素
- D. 阿托品
- E. 溴苯辛

【正确答案】B

【答案解析】人工心脏起搏

适应证：①伴有临床症状的任何水平的完全或高度房室传导阻滞。②束支-分支水平传导阻滞，间歇发生 II 度 II 型房室传导阻滞，有症状者；在观察过程中虽无症状，但阻滞程度进展、H-V 间期 $> 100\text{ms}$ 者。③病窦综合征或房室传导阻滞，心室率经常低于 50 次/分，有明确的临床症状，或间歇发生心室率 < 40 次/分；或虽无症状，但有长达 3 秒的 R-R 间隔。④由于颈动脉窦过敏引起的心率减慢，心率或 R-R 间隔达到上述标准，伴有明确症状者。⑤有窦房结功能障碍和/或房室传导阻滞的患者，因其他情况必须采用具有减慢心率作用的药物治疗时，为保证适当的心室率，应植入起搏器。

63. 患者男性，46 岁。乙型肝炎 10 年，现出现持续性肝区疼痛，消瘦，发热，食欲不振，乏力，营养不良。应考虑

- A. 慢性迁延性肝炎
- B. 肝癌
- C. 肝硬化
- D. 肝脓肿
- E. 肝血管瘤

【正确答案】B

【答案解析】结合患者的乙肝病史，以及患者的症状：肝区疼痛，消瘦，发热，食欲不振等不难诊断。

64. 男性患者，42 岁。不规则低热 3 个月，厌食，体重下降 5kg，右季肋下胀痛，巩膜轻度黄染，面部有三个蜘蛛痣，肝肋下 3.5cm，质硬表面不平，脾肋下 1cm，肝区可闻及血管杂音，白细胞 $5.8 \times 10^9/\text{L}$ ，中性 0.64，谷丙转氨酶 130U/L。碱性磷酸酶 30U/L。经中西医疗无效。应诊断为

- A. 慢性活动性肝炎
- B. 原发性肝癌
- C. 门脉性肝硬化
- D. 肝脓肿
- E. 肝血管瘤

【正确答案】B

【答案解析】患者有原发性肝癌的临床表现，如：全身表现为低热、厌食、消瘦；有肝癌的常见症状右季肋下胀痛，还有其他的表现，如：黄疸、蜘蛛痣、肝大，还有实验室检查的支持，故诊断为原发性肝癌。

65. 一男性患者，55 岁，进行性厌食和上腹部胀痛，面色苍白，日益消瘦，下肢水肿，肝功

能正常,大便隐血试验持续阳性,尿常规未发现异常。其可能诊断为

- A. 慢性胃炎
- B. 胃癌
- C. 慢性肝炎
- D. 胃溃疡
- E. 骶瘫

【正确答案】 B

【答案解析】 胃癌或胃腺癌,是指发生于胃黏膜上皮的恶性肿瘤。早期无特异性症状,进展期胃癌最早出现的症状是上腹痛,可伴有早饱、胃纳差和体重减轻。

66. 患者男性,30岁。1年来胃痛,无典型的周期性和节律性疼痛,反酸,餐后多出现剧烈疼痛,制酸剂疗效差,有多次上消化道出血史。合适的诊断是

- A. 浸润型胃癌
- B. 慢性胃炎
- C. 幽门管溃疡
- D. 胃泌素瘤
- E. 十二指肠球部溃疡

【正确答案】 C

【答案解析】 幽门管溃疡常伴胃酸过多,缺乏典型溃疡的周期性和节律性疼痛,餐后即出现剧烈疼痛,制酸剂疗效差,易出现呕吐或幽门梗阻,易穿孔或出血。

67. 高某,女性,6岁,2周前患上呼吸道感染,口服药物治疗后症状减轻,但近日皮肤多处瘀点、瘀斑,牙龈出血,不伴发热。血象检查白细胞 $9 \times 10^9/L$,血红蛋白 $130g/L$,血小板 $38 \times 10^9/L$ 。可能的诊断是

- A. 上呼吸道感染
- B. 白血病
- C. 过敏性紫癜
- D. 原发免疫性血小板减少症
- E. 再生障碍性贫血

【正确答案】 D

【答案解析】 结合患者症状及血象检查可以诊断为原发免疫性血小板减少症。原发免疫性血小板减少症急性型: 常见于儿童。有上呼吸道感染史,特别是病毒感染史。起病急骤,部分患者可有畏寒、寒战、发热。全身皮肤出现瘀点、瘀斑,可有血疱及血肿形成。鼻出血、牙龈出血、口腔黏膜及舌出血常见。

68. 患者,女,21岁。上感2周后出现皮肤瘀点,血小板检查为 $30 \times 10^9/L$,骨髓象示骨髓巨核细胞数量轻度增加,巨核细胞发育成熟障碍。曾服用药物治疗,症状时轻时重,反复发作,就诊时表现为斑色暗淡,多散在出现,时起时消,过劳则加重,心悸,气短,头晕目眩,食欲不振,面色苍白,舌淡苔白,脉弱。应诊断为

- A. 原发免疫性血小板减少症,阴虚火旺证
- B. 过敏性紫癜,阴虚火旺证
- C. 原发免疫性血小板减少症,气不摄血证
- D. 过敏性紫癜,瘀血内阻证
- E. 过敏性紫癜,气不摄血证

【正确答案】 C

【答案解析】 原发免疫性血小板减少症的诊断要点如下:

(1) 广泛出血累及皮肤、黏膜及内脏。

- (2) 多次检查血小板计数减少。
- (3) 脾不大。
- (4) 骨髓巨核细胞增多或正常, 有成熟障碍。
- (5) 泼尼松或脾切除治疗有效。
- (6) 排除其他继发性血小板减少症。

气不摄血证证候: 斑色暗淡, 多散在出现, 时起时消, 反复发作, 过劳则加重, 可伴神情倦怠, 心悸, 气短, 头晕目眩, 食欲不振, 面色苍白或萎黄, 舌质淡, 苔白, 脉弱。治法: 益气摄血, 健脾养血。方药: 归脾汤加减。

69. 李某, 女性, 60岁, 服丙基硫氧嘧啶治疗15年后, 甲状腺较前缩小, T_3 抑制试验3小时 $>50\%$, 24小时 $<50\%$, TT_3 、 TT_4 正常。对此病人采取

- A. 改用手术治疗
- B. 停用丙基硫氧嘧啶
- C. 继续用丙基硫氧嘧啶
- D. 加大丙基硫氧嘧啶剂量
- E. 放射性 ^{131}I 治疗

【正确答案】C

【答案解析】继续用丙基硫氧嘧啶抑制 T_4 在周围组织中转化为 T_3 。

70. 女性患者, 72岁。1天前上午发现口角右偏, 左手不能持物, 左下肢不能行走, 说话吐字不清。下午检查发现左侧鼻唇沟浅, 伸舌稍向左偏, 左侧上下肢肌力4级。今晨醒来说话正常, 鼻唇沟对称, 伸舌居中, 四肢运动灵活有力。最可能的诊断是

- A. 右侧大脑中动脉血栓形成
- B. 椎-基底动脉血栓形成
- C. 短暂性脑缺血发作
- D. 脑出血
- E. 蛛网膜下腔出血

【正确答案】C

【答案解析】短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack, TIA)是指历时短暂且经常反复发作的脑局部供血障碍, 以相应供血区局限性和短暂性神经功能缺失为特点的一种脑血管病。每次发作历时短暂, 持续数分钟至1小时, 在24小时内即完全恢复。颈内动脉系统TIA, 持续时间较短, 易进展为完全性卒中。常见症状为发作性单肢无力或轻偏瘫及对侧面部轻瘫, 当主侧半球受累时可见失语症, 也可有失读、失写症等。

71. 某男, 35岁, 被人发现时躺在公园一角落, 呈半昏迷状态, 便急送医院。体检: 体温、血压正常, 神志不清, 两侧瞳孔针尖大小, 口角流涎, 口唇紫绀, 呼吸急促, 两肺满布水泡音, 心率60次/分钟, 肌肉有震颤。迅速洗胃, 洗出液有大蒜味。可能的诊断是

- A. 有机磷杀虫药中毒
- B. 酒精中毒
- C. CO中毒
- D. 中暑
- E. 安定中毒

【正确答案】A

【答案解析】患者躺在公园, 以及结合患者其他中毒症状以及洗出液的气味儿考虑患者为有机磷杀虫药中毒。

72. 患者心烦不寐, 胸闷脘痞, 泛恶暖气, 伴口苦, 头重, 目眩, 舌偏红, 苔黄腻, 脉滑数, 选用的治法是

- A. 疏肝泻火, 镇心安神
- B. 清化痰热, 和中安神
- C. 补益心脾, 养血安神
- D. 滋阴降火, 交通心肾
- E. 益气镇惊, 安神定志

【正确答案】 B

【答案解析】 该患者为不寐之痰热扰心证

证候: 心烦不寐, 胸闷脘痞, 泛恶暖气, 伴口苦, 头重, 目眩, 舌偏红, 苔黄腻, 脉滑数。

治法: 清化痰热, 和中安神。

方药: 黄连温胆汤加减。

73. 患者, 男, 49岁, 午后或夜间发热, 不欲近衣, 手足心热, 烦躁, 少寐多梦, 盗汗, 口干咽燥, 舌质红, 苔少, 脉细数。辨证应属

- A. 阴虚发热证
- B. 气虚发热证
- C. 血虚发热证
- D. 血瘀发热证
- E. 气郁发热证

【正确答案】 A

【答案解析】 内伤发热之阴虚发热证

证候: 午后潮热, 或夜间发热, 不欲近衣, 手足心热, 烦躁, 少寐多梦, 盗汗, 口干咽燥, 舌质红, 或有裂纹, 苔少甚至无苔, 脉细数。

治法: 滋阴清热。

方药: 清骨散加减。

74. 程某, 男, 62岁, 腰膝酸软, 不能久立, 肢体痿软无力, 以下肢为著, 下肢肌肉渐萎缩, 咽干耳鸣, 舌红少苔, 脉细数。其首选的治疗方法是

- A. 清热利湿, 凉血活血
- B. 清热润燥, 养肺生津
- C. 清热利湿, 通利筋脉
- D. 补脾益气, 健运升清
- E. 补益肝肾, 滋阴清热

【正确答案】 E

【答案解析】 该患者为肝肾亏损, 髓枯筋痿证, 治宜补益肝肾, 滋阴清热, 选用大补阴煎加减。

75. 患者, 男, 咳嗽气短, 倦怠乏力, 咳痰量多易出, 面色(白光)白, 食后腹胀, 食后即便, 舌体胖边有齿痕, 舌苔薄白, 脉细弱。治疗首选方剂为

- A. 肾气丸
- B. 补肺汤合补中益气汤
- C. 麻杏石甘汤
- D. 参苓白术散
- E. 沙参麦冬汤

【正确答案】 B

【答案解析】 慢性支气管炎, 肺脾气虚证, 证候: 咳嗽气短, 倦怠乏力, 咳痰量多易出, 面色(白光)白, 食后腹胀, 便溏或食后即便, 舌体胖边有齿痕, 舌苔薄白或薄白腻, 脉细弱。治法: 补肺健脾, 止咳化痰。方药: 补肺汤合补中益气汤加减。

76. 患者女性，发热5天，今天病情加重，高热，体温39℃，肢厥，神志昏迷，谵语，舌蹇，舌鲜绛，脉细数。某医院诊断为系统性红斑狼疮。其治疗当用清宫汤送服

- A. 安宫牛黄丸
- B. 苏合香丸
- C. 神犀丹
- D. 玉枢丹
- E. 通关散

【正确答案】A

【答案解析】系统性红斑狼疮脑虚瘀热证

证候：身灼热，肢厥，神昏谵语，或昏愦不语，或痰壅气粗，舌蹇，舌鲜绛，脉细数。

治法：清心开窍。

方药：清宫汤送服或鼻饲安宫牛黄丸或至宝丹。

77. 患者女性，64岁，右下肢出现片状红疹、边缘清楚、略为隆起、局部有烧灼样疼痛，应首先考虑是

- A. 疥
- B. 痈
- C. 疽
- D. 丹毒
- E. 急性蜂窝织炎

【正确答案】D

【答案解析】丹毒的临床表现：

好发部位为下肢和头面部。起病急，病人常有头痛、畏寒、发热等全身症状。局部表现呈片状红疹，颜色鲜红，中间较淡，边缘清楚，略为隆起。手指轻压可使红色消退，松压后很快又恢复鲜红色。红肿向四周扩展时，中央红色逐渐消退、脱屑，转为棕黄色。红肿区有时有水疱形成，局部有烧灼样疼痛。常伴有附近淋巴结肿大、疼痛。病人常有头痛、畏寒、发热等全身症状。

78. 患者，男，26岁，神志恍惚不清，头痛头晕，呕吐恶心，夜寐不宁，或醒后不省人事，昏沉嗜卧；脉细无力。选用的治法为

- A. 辛香开窍，通闭醒神
- B. 镇心安神，升清降浊
- C. 益气养阴，祛瘀开窍
- D. 益气补肾，养血健脑
- E. 疏肝活血安神

【正确答案】B

【答案解析】脑挫裂伤苏醒期的证候：神志恍惚不清，头痛头晕，呕吐恶心，夜寐不宁，或醒后不省人事，昏沉嗜卧；脉细无力。

治法：镇心安神，升清降浊。

方药：琥珀安神汤加减。

79. 患者，男，50岁，西医诊断为大肠癌，症见腹胀，腹泻，腰膝酸软，不思饮食，四肢无力，失眠倦怠，尿少；舌淡，脉细无力。治疗应首选的方剂是

- A. 桃红四物汤
- B. 八珍汤合麻仁滋脾丸
- C. 益气固本解毒汤
- D. 槐角地榆汤

E. 失笑散合膈下逐瘀汤

【正确答案】C

【答案解析】大肠癌之脾肾两虚证。

证候：腹胀，腹泻，腰膝酸软，不思饮食，四肢无力，失眠倦怠，尿少；舌淡，脉细无力。

治法：健脾益肾，扶正固本。

方药：益气固本解毒汤加减。

80. 患者，女，38岁，甲状腺肿块坚硬如石，推之不移，局部僵硬，形体消瘦，皮肤枯槁，声音嘶哑，腰酸无力，舌质红，少苔，脉沉细数，诊断为甲状腺肿瘤，治疗首选方剂是

- A. 海藻玉壶汤合逍遥散
- B. 桃红四物汤合海藻玉壶汤
- C. 通窍活血汤合养阴清肺汤
- D. 海藻玉壶汤合神效瓜蒌散
- E. 知柏地黄丸合海藻玉壶汤

【正确答案】C

【答案解析】瘀热伤阴证

证候：肿块坚硬如石，推之不移，局部僵硬；形体消瘦，皮肤枯槁，声音嘶哑，腰酸无力；舌质红，少苔，脉沉细数。

治法：养阴和营，化痰散结。

方药：通窍活血汤合养阴清肺汤加减。

81. 患者，男，38岁，溃疡病史十余年，现出现呕血，有上腹部压痛，实验室检查：血红蛋白及血球压积进行性下降，纤维胃镜检查发现明显的出血部位，对该患者采用的内科紧急处理包括

- A. 应用止血药物
- B. 抗酸抗溃疡治疗
- C. 经胃管注入冰的生理盐水
- D. 经选择性动脉造影栓塞止血
- E. 以上都是

【正确答案】E

【答案解析】该患者诊断为胃溃疡大出血，内科紧急处理包括：

- (1) 建立输液通道。
- (2) 应用止血药物。
- (3) 抗酸抗溃疡治疗。
- (4) 经胃管注入冰的生理盐水。
- (5) 经选择性动脉造影栓塞止血。
- (6) 纤维胃镜下应用激光、电凝止血。

82. 患者，男，40岁，腰痛，少腹急满，小便频数短赤，溺时涩痛难忍，淋漓不爽，口干欲饮；舌红，苔黄腻，脉弦细。治疗应首选

- A. 石韦散
- B. 八正散
- C. 济生肾气丸
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 仙方活命饮

【正确答案】B

【答案解析】湿热蕴结证

证候：腰痛，少腹急满，小便频数短赤，溺时涩痛难忍，淋漓不爽，口干欲饮；舌红，苔黄腻，脉弦细。

治法：清热利湿，通淋排石。

方药：八正散加减。

83. 患者男性，65岁，出现右下肢酸痛、麻木、皮温发凉，伴间歇性跛行，夜间症状明显加重，诊断应考虑

- A. 浅静脉炎
- B. 动脉硬化性闭塞症
- C. 血栓闭塞性脉管炎
- D. 下肢深静脉血栓形成
- E. 下肢静脉曲张

【正确答案】 B

【答案解析】 结合患者的症状考虑该患者为动脉硬化性闭塞症。动脉硬化性闭塞症早期的症状主要为肢体发凉、间歇性跛行，可有肢体麻木、沉重无力、酸痛、刺痛及烧灼感，继而出现静息痛。

84. 患者，女性，不慎被踢伤外阴部，20分钟后出现外阴肿物，疼痛难忍，最可能的诊断是

- A. 阴阜血肿
- B. 小阴唇血肿
- C. 阴蒂血肿
- D. 前庭大腺囊肿
- E. 大阴唇血肿

【正确答案】 E

【答案解析】 结合患者的起病原因以及症状，考虑该患者为大阴唇血肿。大阴唇皮下为疏松结缔组织和脂肪组织，含丰富的血管、淋巴管和神经，外伤后易形成血肿。

85. 患者，女，32岁，新产后，突然阴道大量下血，色黯红，夹有血块，小腹疼痛拒按，血块下后腹痛减轻；舌紫黯，脉沉涩。治疗首选

- A. 保阴煎
- B. 化瘀止崩汤
- C. 补中益气汤
- D. 升举大补汤
- E. 生化汤合失笑散

【正确答案】 B

【答案解析】 产后出血之血瘀证。

证候：新产后，突然阴道大量下血，色黯红，夹有血块，小腹疼痛拒按，血块下后腹痛减轻；舌紫黯，或有瘀点瘀斑，脉沉涩。

治法：活血化瘀，理血归经。

方药：化瘀止崩汤。

86. 患者，女，23岁，产后乳汁甚少，乳汁浓稠，乳房胀硬，情志抑郁，食欲不振；舌质正常，苔微黄，脉弦。治疗首选

- A. 通乳丹
- B. 生化汤
- C. 独活寄生汤
- D. 下乳涌泉散
- E. 黄芪桂枝五物汤

【正确答案】D

【答案解析】产后缺乳之肝郁气滞证。

证候：产后乳汁甚少或全无，乳汁浓稠，乳房胀硬或疼痛，情志抑郁，或有微热，食欲不振；舌质正常或黯红，苔微黄，脉弦或弦数。

治法：疏肝解郁，通络下乳。

方药：下乳涌泉散。

87. 患者，女，35岁，已婚，半年前出现阴道分泌物增多，并伴有性交后出血。妇科检查：宫颈中度糜烂，颗粒状，接触性出血（+）。宫颈细胞学检查：轻度炎症。应首先考虑的治疗措施是

- A. 口服中药治疗
- B. 手术切除子宫
- C. 局部物理治疗
- D. 口服抗生素
- E. LEEP刀手术治疗

【正确答案】D

【答案解析】根据题干给出的信息，患者诊断为宫颈炎，首选的治疗是抗生素治疗为主，故最佳的选项是D。

88. 患者，女，28岁。外阴肿痛瘙痒伴有灼热感，带下增多，色黄质稠，气味秽臭，伴烦躁易怒，口干口苦；舌苔黄腻，脉弦数。其治疗首选方为

- A. 萆薢渗湿汤
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 五味消毒饮
- D. 大黄牡丹汤
- E. 仙方活命饮

【正确答案】B

【答案解析】根据题干给出的信息，诊断患者为外阴炎之湿热下注证。

证候：外阴肿痛，灼热或瘙痒，充血或有糜烂、溃疡，带下增多，色黄质稠，气味秽臭，伴烦躁易怒，口干口苦；舌苔黄腻，脉弦数。

治法：清热利湿，杀虫止痒。

方药：龙胆泻肝汤去木通，加苦参、虎杖。

89. 患者，女，29岁，痛经4年，痛引腰骶，月经量多，色淡黯质稀，时有血块，舌淡黯，脉沉细而涩，已自然流产3次。1年前行腹腔镜检查，诊断为子宫内膜异位症。中医治疗的最佳选方是

- A. 五子衍宗丸
- B. 归肾丸合桃红四物汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 六味地黄丸
- E. 理冲汤

【正确答案】B

【答案解析】子宫内膜异位症之肾虚血瘀证。

证候：经期腹痛，痛引腰骶，月经先后不定期，经量或多或少，色淡黯质稀，或有血块，不孕或易流产，头晕耳鸣，腰膝酸软，性欲减退，盆腔可及结节或包块；舌淡黯或有瘀点，苔薄白，脉沉细而涩。

治法：补肾益气，活血化瘀。

方药: 归肾丸合桃红四物汤。

90. 女性, 23岁, 新婚, 想半年后要孩子, 首先应选用哪种避孕方法最适宜

- A. 宫内节育器
- B. 口服避孕药
- C. 避孕套
- D. 皮下埋植避孕
- E. 阴道隔膜

【正确答案】 C

【答案解析】 新婚夫妻若考虑要孩子, 短期内可选避孕套避孕。

91. 患儿, 女, 1岁。发热有汗, 鼻塞流涕, 咽部充血, 口渴, 苔薄黄, 兼见惊惕啼叫, 睡卧不宁, 舌质红, 脉浮弦。其诊断是

- A. 感冒夹滞
- B. 感冒夹惊
- C. 感冒夹痰
- D. 风寒感冒
- E. 时行感冒

【正确答案】 B

【答案解析】 感冒夹惊的证候: 感冒兼见惊惕哭闹, 睡卧不宁, 甚至骤然抽风, 舌质红, 脉浮弦。

治法: 解表兼以清热镇惊。

方药: 在疏风解表的基础上, 加用镇惊丸加减。另服小儿回春丹或小儿金丹片。

92. 患儿, 男, 6岁。患病毒性心肌炎6个月, 面色晦暗, 胸闷憋气, 时觉心前区刺痛, 时欲呕恶, 舌质紫暗, 苔白腻, 脉滑。其中医证型是

- A. 风热犯心证
- B. 湿热侵心证
- C. 气阴亏虚证
- D. 痰瘀阻络证
- E. 心阳虚弱证

【正确答案】 D

【答案解析】 患儿表现为病毒性心肌炎的痰瘀阻络证。

证候: 心悸不宁, 胸闷憋气, 心前区痛如针刺, 脘闷呕恶, 面色晦暗, 唇甲青紫, 舌体胖, 舌质紫暗, 或舌边尖见有瘀点, 舌苔腻, 脉滑或结代。

治法: 豁痰化瘀, 活血通络。

方药: 瓜蒌薤白半夏汤合失笑散加减。

93. 患儿, 男, 6岁。西医确诊为急性肾小球肾炎。病程第9日, 症见肢体浮肿, 尿少, 咳嗽气急, 喘息不得平卧, 心悸, 胸闷。口唇青紫, 脉细无力。其证型是

- A. 水凌心肺证
- B. 湿热内侵证
- C. 邪陷厥阴证
- D. 水毒内闭证
- E. 风水相搏证

【正确答案】 A

【答案解析】 此患儿为急性肾小球肾炎水凌心肺证的表现。

证候: 全身明显浮肿, 频咳气急, 胸闷心悸, 不能平卧, 烦躁不宁, 面色苍白, 甚则唇指青

紫，舌质暗红，舌苔白腻，脉沉细无力。故最佳的选项是 A。

94. 患儿，女，7岁。症见：乳房发育，月经提前来潮，伴有潮热、盗汗、五心烦热。舌红少苔，脉细数。其治疗首选方剂是

- A. 知柏地黄丸
- B. 丹栀逍遥散
- C. 黄连解毒汤
- D. 黄连温胆汤
- E. 柴胡疏肝散

【正确答案】 A

【答案解析】 此患儿表现为性早熟之阴虚火旺证。

阴虚火旺证证候：女孩乳房发育或伴其他性征及内外生殖器发育，甚者月经提前来潮；男孩睾丸容积增大（ $\geq 4\text{ml}$ ），或伴喉结突出，变声，或有遗精。或伴有潮热、盗汗、五心烦热、便秘、舌红或舌尖红，少苔，脉细数。

治法：滋补肾阴，清泻相火。

方药：知柏地黄丸加减。

95. 患儿，男，3岁。因右侧腮部肿胀 2天就诊。诊断为流行性腮腺炎，辨证为温毒在表，其首选方剂是

- A. 柴胡葛根汤
- B. 普济消毒饮
- C. 仙方活命饮
- D. 五味消毒饮
- E. 荆防败毒散

【正确答案】 A

【答案解析】 流行性腮腺炎温毒在表证。

证候：轻微发热，一侧或双侧耳下腮部或颌下漫肿疼痛，边缘不清，触之痛甚，咀嚼不便，或有咽红。舌质红，舌苔薄白或薄黄，脉浮数。

治法：疏风清热，散结消肿。

方药：柴胡葛根汤加减。

96. 患儿，女，2岁。素不欲食，强迫进食后则脘腹胀满，大便不畅，舌淡红，苔薄白。应首先考虑的证型是

- A. 脾失健运证
- B. 脾胃气滞证
- C. 脾虚夹积证
- D. 胃失和降证
- E. 肝郁脾虚证

【正确答案】 A

【答案解析】 根据患儿的表现，此为脾失健运证。

证候：食欲不振，厌恶进食，食而乏味，或伴胸脘痞闷，暖气泛恶，大便不调，偶尔多食后则脘腹饱胀，形体尚可，精神正常，舌淡红，苔薄白或薄腻，脉尚有力。

三、A3/A4

患者，男，65岁，冠心病史6年。胸痛彻背，心痛如绞，胸闷憋气，含服硝酸甘油不缓解，形寒畏冷，四肢不温，冷汗自出，心悸气短，舌质紫暗，苔薄白，脉沉细。

97. 其证型是

- A. 冠心病心绞痛，寒痰痹阻证

- B. 冠心病心绞痛, 气阴两虚证
- C. 急性心肌梗死, 痰瘀痹阻证
- D. 冠心病心绞痛, 气血两虚证
- E. 急性心肌梗死, 寒凝心脉证

【正确答案】 E

【答案解析】 心肌梗死—寒凝心脉证

证候: 胸痛彻背, 心痛如绞, 胸闷憋气, 形寒畏冷, 四肢不温, 冷汗自出, 心悸短气, 舌质紫暗, 苔薄白, 脉沉细或沉紧。

治法: 散寒宣痹, 芳香温通。

方药: 当归四逆汤合苏合香丸加减。

98. 中医治法为

- A. 辛温通阳, 开痹散寒
- B. 益气养阴, 活血通络
- C. 通阳泄浊, 豁痰开痹
- D. 散寒宣痹, 芳香温通
- E. 豁痰活血, 理气止痛

【正确答案】 D

【答案解析】 心肌梗死—寒凝心脉证

证候: 胸痛彻背, 心痛如绞, 胸闷憋气, 形寒畏冷, 四肢不温, 冷汗自出, 心悸短气, 舌质紫暗, 苔薄白, 脉沉细或沉紧。

治法: 散寒宣痹, 芳香温通。

方药: 当归四逆汤合苏合香丸加减。

99. 首选方药为

- A. 血府逐瘀汤加减
- B. 参附龙牡汤加减
- C. 生脉散合左归饮加减
- D. 生脉散合炙甘草汤加减
- E. 当归四逆汤合苏合香丸加减

【正确答案】 E

【答案解析】 心肌梗死—寒凝心脉证

证候: 胸痛彻背, 心痛如绞, 胸闷憋气, 形寒畏冷, 四肢不温, 冷汗自出, 心悸短气, 舌质紫暗, 苔薄白, 脉沉细或沉紧。

治法: 散寒宣痹, 芳香温通。

方药: 当归四逆汤合苏合香丸加减。

患者, 女, 32岁, 有哮喘病史。突然出现咳嗽、喘憋半小时, 咳呛阵作, 气粗息涌, 喉中哮鸣, 面赤口苦, 舌红苔黄腻, 脉弦滑。

100. 其中医证型是

- A. 肺虚证
- B. 热哮证
- C. 肾虚证
- D. 寒哮证
- E. 脾虚证

【正确答案】 B

【答案解析】 支气管哮喘—热哮证

证候：气粗息涌，咳呛阵作，喉中哮鸣，胸高胁胀，烦闷不安，汗出，口渴喜饮，面赤口苦，咳痰色黄或色白，黏浊稠厚，咯吐不利，舌质红，苔黄腻，脉滑数或弦滑。

治法：清热宣肺，化痰定喘。

方药：定喘汤加减。

101. 其治法是

- A. 健脾化痰，止咳平喘
- B. 补肾纳气平喘
- C. 清热化痰肃肺
- D. 清热宣肺，化痰定喘
- E. 温肺散寒，化痰平喘

【正确答案】D

【答案解析】支气管哮喘-热哮证

证候：气粗息涌，咳呛阵作，喉中哮鸣，胸高胁胀，烦闷不安，汗出，口渴喜饮，面赤口苦，咳痰色黄或色白，黏浊稠厚，咯吐不利，舌质红，苔黄腻，脉滑数或弦滑。

治法：清热宣肺，化痰定喘。

方药：定喘汤加减。

102. 首选方药为

- A. 玉屏风散加减
- B. 金匮肾气丸或七味都气丸加减
- C. 六君子汤加减
- D. 定喘汤加减
- E. 射干麻黄汤加减

【正确答案】D

【答案解析】支气管哮喘-热哮证

证候：气粗息涌，咳呛阵作，喉中哮鸣，胸高胁胀，烦闷不安，汗出，口渴喜饮，面赤口苦，咳痰色黄或色白，黏浊稠厚，咯吐不利，舌质红，苔黄腻，脉滑数或弦滑。

治法：清热宣肺，化痰定喘。

方药：定喘汤加减。

患者，男，58岁。长期饮酒，肝掌，黄疸，B超提示肝回声明显增强、不均、光点粗大。腹大胀满，脉络怒张，胁腹刺痛，面色晦暗黧黑，肋下癥块，面颈可见红点赤缕，手掌赤痕，口干不欲饮，舌质紫暗，脉细涩。

103. 其西医诊断为

- A. 肝癌
- B. 胃溃疡
- C. 胃癌
- D. 肝血管瘤
- E. 肝硬化

【正确答案】E

【答案解析】根据长期饮酒史，肝掌，黄疸，B超提示肝回声明显增强、不均、光点粗大，诊断为肝硬化。

104. 其证候是

- A. 湿热蕴结
- B. 寒湿困脾
- C. 脾肾阳虚

D. 肝脾血瘀

E. 肝肾阴虚

【正确答案】D

【答案解析】肝硬化-肝脾血瘀证

证候：腹大胀满，脉络怒张，胁腹刺痛，面色晦暗黧黑，胁下癥块，面颈胸壁等处可见红点赤缕，手掌赤痕，口干不欲饮，或大便色黑，舌质紫暗，或有瘀斑，脉细涩。

治法：活血化瘀，化气行水。

方药：调营饮加减。

105. 应选用的方药为

A. 中满分消丸合茵陈蒿汤

B. 调营饮

C. 附子理中汤合五苓散

D. 一贯煎合膈下逐瘀汤

E. 实脾饮

【正确答案】B

【答案解析】肝硬化-肝脾血瘀证

证候：腹大胀满，脉络怒张，胁腹刺痛，面色晦暗黧黑，胁下癥块，面颈胸壁等处可见红点赤缕，手掌赤痕，口干不欲饮，或大便色黑，舌质紫暗，或有瘀斑，脉细涩。

治法：活血化瘀，化气行水。

方药：调营饮加减。

男，57岁，右上腹痛3个月，发热10天。患者3个月前无明显诱因出现右上腹持续性胀痛，逐渐加重，10天前发热，体温最高达37.8℃。既往发现HBsAg(+)10年。巩膜轻度黄染胸前可见蛛痣。腹部膨隆，脐周可见静脉曲张。总胆红素38.5μmol/L，直接胆红素23.2μmol/L。AFP412ng/ml。腹部B超：肝右叶近肝门见一大约7cm×5.5cm病变，边界不清，内部回声。脘腹胀满，胁痛肢楚，神疲乏力，纳呆便溏，四肢肿胀；舌淡胖，苔白或腻，脉弦而滑。

106. 首先应考虑的诊断是

A. 肝炎

B. 肝硬化

C. 肝癌

D. 胰头癌

E. 慢性胰腺炎

【正确答案】C

【答案解析】根据患者症状、体征及辅助检查，符合原发性肝癌的诊断，故本题正确答案为C。

107. 该患者的中医辨证分型为

A. 气滞血瘀证

B. 脾虚湿困证

C. 肝胆湿热证

D. 肝肾阴虚证

E. 瘀毒内阻证

【正确答案】B

【答案解析】原发性肝癌-脾虚湿困证：相当于单纯型II期或硬化型II期伴有腹水。症见脘腹胀满，胁痛肢楚，神疲乏力，纳呆便溏，四肢肿胀；舌淡胖，苔白或腻，脉弦而滑。故本

题正确答案为 B。

108. 对应的方剂应该选择

- A. 小柴胡汤合大黄廑虫丸加减
- B. 滋水清肝饮合兰豆枫楮汤加减
- C. 四君子汤合逍遥散加减
- D. 茵陈蒿汤合鳖甲煎丸加减
- E. 失笑散合膈下逐瘀汤加减

【正确答案】 C

【答案解析】 原发性肝癌-脾虚湿困证：治法：益气健脾，化湿祛痰。方药：四君子汤合逍遥散加减。故本题正确答案选 C。

患者，女，29岁，已婚。剖宫产后6d，腹痛，高热寒战，小腹疼痛拒按，恶露增多，色紫黯，有臭味。烦躁口渴，尿少色黄，大便燥结；舌红，苔黄而干，脉数有力。

109. 首先考虑的诊断为

- A. 上呼吸道感染
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 急性乳腺炎
- D. 产褥感染
- E. 子痫

【正确答案】 D

【答案解析】 产褥感染症状：(1) 发热一般出现在产后3~7天。(2) 腹痛多从下腹部开始，逐渐波及全腹。(3) 恶露异常恶露明显增多，混浊，或呈脓性，有臭味。(4) 下肢血栓静脉炎可见下肢持续性疼痛、肿胀，站立时加重，行走困难。如形成脓毒血症、败血症，则可出现持续高热、寒战、谵妄、昏迷、休克，甚至死亡。故首先考虑产褥感染，答案选 D。

110. 首选药物治疗为

- A. 氨基糖苷类
- B. 大环内酯类
- C. 喹诺酮类
- D. 林可霉素类
- E. 青霉素类

【正确答案】 E

【答案解析】 产褥感染西医治疗：根据临床表现及临床经验选用广谱抗生素，首选青霉素类和头孢类药物，同时加用甲硝唑，青霉素过敏可选用林可霉素或红霉素。故正确答案选 E。

111. 中医治疗原则为

- A. 清热解毒，凉血化瘀
- B. 清营解毒，散瘀泄热
- C. 清心开窍
- D. 养阴清热，安冲止血
- E. 辛凉透表，清热解毒

【正确答案】 A

【答案解析】 产褥感染感染邪毒证

证候：产后高热寒战，小腹疼痛拒按，恶露量多或少，色紫黯如败酱，气臭秽，烦躁，口渴引饮，尿少色黄，大便燥结；舌红，苔黄而干，脉数有力。治法：清热解毒，凉血化瘀。方药：五味消毒饮合失笑散加丹皮、赤芍、鱼腥草、益母草。故正确答案选 A。

患儿4岁，发热3天伴流涕、咳嗽、流泪就诊。查：T40℃，球结膜充血，心肺检查阴性，

口腔两颊黏膜近臼齿处可见少许灰白色斑点, 周围红晕。

112. 该患儿应考虑为何病

- A. 麻疹
- B. 风疹
- C. 幼儿急疹
- D. 猩红热
- E. 水痘

【正确答案】 A

【答案解析】 患儿是发热三天后出疹, 口腔两颊黏膜近臼齿处可见麻疹黏膜斑, 考虑是麻疹, 故选 A。

113. 以下哪项为该病最常见的并发症

- A. 喉炎
- B. 肺炎
- C. 脑炎
- D. 风心病
- E. 心肌炎

【正确答案】 B

【答案解析】 麻疹常见并发症有喉炎、肺炎、心肌炎、脑炎, 其中肺炎为麻疹最常见的并发症, 多见于 5 岁以下小儿。可发生在麻疹的各个时期, 是麻疹死亡的主要原因之一。主要为继发细菌或其他病毒感染。故答案选 B。

114. 若患儿疹点出齐后, 发热渐退, 咳嗽渐减, 精神好转, 首选中医治疗为

- A. 宣毒发表汤加减
- B. 清解透表汤加减
- C. 沙参麦冬汤加减
- D. 麻杏石甘汤加减
- E. 清咽下痰汤加减

【正确答案】 C

【答案解析】 麻疹阴津耗伤 (收没期)

证候: 疹点出齐后, 发热渐退, 咳嗽渐减, 胃纳增加, 精神好转, 疹点依次渐回, 皮肤呈糠麸状脱屑, 留有色素沉着, 舌红少津, 苔薄, 脉细数。治法: 养阴生津, 清解余邪。方药: 沙参麦冬汤加减。故答案选 C。

四、B

- A. 射干麻黄汤
- B. 定喘汤
- C. 六君子汤
- D. 玉屏风散
- E. 金匮肾气丸

115. 李某, 男, 56 岁, 哮喘多年, 劳累后哮喘易发, 平素息促气短, 呼多吸少, 动则为甚, 形瘦, 神疲, 心悸, 腰酸腿软, 脑转耳鸣, 舌淡红少苔, 脉细数。其治疗宜首选

【正确答案】 E

【答案解析】 支气管哮喘-肾虚证

证候: 平素息促气短, 呼多吸少, 动则为甚, 形瘦神疲, 心悸, 腰酸腿软, 劳累后哮喘易发, 或面色苍白, 畏寒肢冷, 自汗, 舌淡苔白, 质胖嫩, 脉沉细; 或颧红, 发热, 汗出黏手, 舌质淡胖嫩, 苔白或舌红少苔, 脉细数或沉细。

治法: 补肾纳气。

方药: 金匮肾气丸或七味都气丸加减。

116. 某女, 哮喘 6 年, 近日复发, 症见气粗息涌, 咳呛阵作, 喉中哮鸣, 胸高胁胀, 烦闷不安, 汗出, 口渴喜饮, 面赤口苦, 咳痰色黄, 黏浊稠厚, 咳吐不利, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数。其治疗宜首选

【正确答案】 B

【答案解析】 支气管哮喘-热哮证

证候: 气粗息涌, 咳呛阵作, 喉中哮鸣, 胸高胁胀, 烦闷不安, 汗出, 口渴喜饮, 面赤口苦, 咳痰色黄或色白, 黏浊稠厚, 咳吐不利, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数或弦滑。

治法: 清热宣肺, 化痰定喘。

方药: 定喘汤加减。

- A. 低血钾, 高血压
- B. 尿中 VMA 明显增高
- C. 尿中 17-羟类固醇或 17-酮类固醇增高
- D. 尿中红、白细胞满视野
- E. 尿中蛋白增高

117. 皮质醇增多症可见

【正确答案】 C

【答案解析】 库欣征又称皮质醇增多症。患者除有高血压之外还有满月脸、水牛背、向心性肥胖、毛发增多、血糖升高等, 诊断一般不难。24 小时尿中 17-羟类固醇、17-酮类固醇增多, 地塞米松抑制试验或肾上腺素兴奋试验有助于诊断。

118. 原发性醛固酮增多症状可见

【正确答案】 A

【答案解析】 原发性醛固酮增多症女性多见。以长期高血压伴顽固性低血钾为特征, 可有多饮、多尿、肌无力、周期性麻痹等。实验室检查有低血钾、高血钠、血浆肾素活性降低, 血尿醛固酮增多。安体舒通试验阳性具有诊断价值。

- A. >5ml
- B. 50~100ml
- C. 250~300ml
- D. >400~500ml
- E. >1000ml

119. 上消化道出血患者出现呕血, 则出血量约

【正确答案】 C

【答案解析】 成人每日消化道出血 >5ml 即可出现粪便隐血试验阳性, 每日出血量 50~100ml 可出现黑便, 胃内蓄积血量在 250~300ml 可引起呕血。一次出血量 <400ml 时, 一般不出现全身症状; 出血量超过 400~500ml, 可出现乏力、心慌等全身症状; 短时间内出血量超过 1000ml, 可出现周围循环衰竭表现。

120. 上消化道出血患者出现乏力、心慌, 出血量为

【正确答案】 D

【答案解析】 成人每日消化道出血 >5ml 即可出现粪便隐血试验阳性, 每日出血量 50~100ml 可出现黑便, 胃内蓄积血量在 250~300ml 可引起呕血。一次出血量 <400ml 时, 一般不出现全身症状; 出血量超过 400~500ml, 可出现乏力、心慌等全身症状; 短时间内出血量超过 1000ml, 可出现周围循环衰竭表现。

- A. 早饱

- B. 纳差
- C. 腹胀
- D. 上腹痛
- E. 上腹压痛

121. 进展期胃癌最早出现的症状是

【正确答案】 D

【答案解析】 进展期胃癌最早出现的症状是上腹痛, 可伴早饱、纳差、腹胀、体重下降等。

122. 中晚期胃癌最常见的体征为

【正确答案】 E

【答案解析】 早期胃癌可无任何体征, 中晚期癌的体征中以上腹压痛最为常见。

- A. 空腹血糖
- B. 尿糖
- C. 糖化血红蛋白
- D. 葡萄糖耐量试验
- E. 胰岛素释放试验

123. 糖尿病患者近期病情监测的指标是

【正确答案】 C

【答案解析】 糖化血红蛋白为糖尿病患者近期病情监测的指标。

124. 鉴别 1 型糖尿病与 2 型糖尿病最好的检测是

【正确答案】 E

【答案解析】 1 型糖尿病是以胰岛 B 细胞破坏、胰岛素分泌缺乏为特征的自身免疫性疾病。2 型糖尿病其发病与胰岛素抵抗和胰岛素分泌的相对性缺乏有关, 两者皆呈不均一性。故鉴别 1 型糖尿病与 2 型糖尿病最好的检测是胰岛素释放试验。

- A. 益气养血, 化瘀通络
- B. 滋阴潜阳, 镇肝息风
- C. 祛风通络, 养血合营
- D. 清热化痰, 醒神开窍
- E. 辛温开窍, 豁痰息风

125. 中风之气虚血瘀证选用的治法是

【正确答案】 A

【答案解析】 气虚血瘀证

证候: 肢体不遂, 软弱无力, 形体肥胖, 气短声低, 面色萎黄, 舌质淡暗或有瘀斑, 苔薄厚, 脉细弱或沉弱。

治法: 益气养血, 化瘀通络。

方药: 补阳还五汤加减。

126. 中风之阴虚风动证选用的治法是

【正确答案】 B

【答案解析】 阴虚风动证

证候: 突然发生口眼喎斜, 舌强语謇, 半身不遂; 平素头晕头痛, 耳鸣目眩, 腰酸腿软, 舌红苔黄, 脉弦细而数或弦滑。

治法: 滋阴潜阳, 镇肝息风。

方药: 镇肝息风汤加减。

- A. 血府逐瘀汤或复元活血汤
- B. 一贯煎合金铃子散

- C. 复元活血汤合硝石矾石散
- D. 乌梅丸合大柴胡汤
- E. 龙胆泻肝汤

127. 肝胆湿热证胁痛方选

【正确答案】 E

【答案解析】 肝胆湿热证

证候：胁肋胀痛或灼热疼痛，口苦口黏，胸闷纳呆，恶心呕吐，小便黄赤，大便不爽，或兼有身热恶寒，身目发黄，舌红苔黄腻，脉弦滑数。

治法：清热利湿。

方药：龙胆泻肝汤加减。

128. 瘀血阻络证胁痛方选

【正确答案】 A

【答案解析】 瘀血阻络证

证候：胁肋刺痛，痛有定处，痛处拒按，入夜痛甚，肋肋下或见有癥块，舌质紫暗，脉沉涩。

治法：祛瘀通络。

方药：血府逐瘀汤或复元活血汤加减。

A. 肝气郁结证

B. 气郁化火证

C. 痰气郁结证

D. 心神失养证

E. 心脾两虚证

129. 精神抑郁，情绪不宁，胸胁胀满疼痛，脘腹胀满，咽中如物梗塞，苔腻。多属

【正确答案】 C

【答案解析】 痰气郁结证

证候：精神抑郁，胸部窒闷，胁肋胀满，咽中如有物梗塞，吞之不下，咯之不出，苔白腻，脉弦滑。本证亦即《金匱要略·妇人杂病脉证并

治》所说“妇人咽中如有炙脔，半夏厚朴汤主之”之症。《医宗金鉴·诸气治法》将本证称为“梅核气”。

治法：行气开郁，化痰散结。

方药：半夏厚朴汤加减。

130. 精神抑郁，情绪不宁，胸部满闷，胁肋胀痛，痛无定处，脘闷暖气，不思饮食，大便不调，苔薄腻，脉弦。多属

【正确答案】 A

【答案解析】 郁证肝气郁结证

证候：精神抑郁，情绪不宁，胸部满闷，胁肋胀痛，痛无定处，脘闷暖气，不思饮食，大便不调，苔薄腻，脉弦。

治法：疏肝解郁，理气畅中。

方药：柴胡疏肝散加减。

A. 逍遥散

B. 六磨汤

C. 枳实导滞丸

D. 大七气汤

E. 血府逐瘀汤

131. 治疗聚证食滞痰阻证，首选的方剂是

【正确答案】 B

【答案解析】 聚证食滞痰阻证，治法导滞散结，理气化痰。方药：六磨汤加减。

132. 治疗积证气滞血阻证，首选的方剂是

【正确答案】 D

【答案解析】 积证气滞血阻证，治法：理气活血，通络消积。方药：大七气汤加减。

- A. 寒痛
- B. 气痛
- C. 湿痛
- D. 痰痛
- E. 瘀血痛

133. 皮色不红、不热，酸痛，得温痛减，多见于脱疽的是

【正确答案】 A

【答案解析】 寒痛：皮色不红、不热，酸痛，得温则痛缓。见于脱疽、寒痹等。

134. 疼痛轻微，或隐隐作痛，皮色不变，压之酸痛的是

【正确答案】 D

【答案解析】 痰痛：疼痛轻微，或隐隐作痛，皮色不变，压之酸痛。见于脂瘤、肉瘤等。

- A. 四物汤
- B. 复元活血汤
- C. 柴胡疏肝散
- D. 当归补血汤合参附汤
- E. 越鞠丸合复元活血汤

135. 治疗肝破裂气滞血瘀证首选

【正确答案】 B

【答案解析】 气滞血瘀证的证候：跌打损伤，血积胁下，右肋部肿痛剧烈，压痛明显；脉弦。

治法：疏肝理气，活血逐瘀。

方药：复元活血汤加减。

136. 治疗肝破裂肝郁气滞证首选

【正确答案】 C

【答案解析】 肝郁气滞证的证候：损伤后期，胁肋隐痛不适，咳吐、大便等屏气时疼痛加剧；胸闷，喜太息，情志抑郁易怒，纳少；舌苔薄白，脉弦。

治法：疏肝解郁，理气止痛。

方药：柴胡疏肝散加减。

- A. 排石疗法
- B. 溶石疗法
- C. 碎石疗法
- D. 取石疗法
- E. 手术

137. 手术后胆管残余结石，宜选用

【正确答案】 A

【答案解析】 排石疗法适应证：胆管结石直径 $<1\text{cm}$ ，胆管下端无狭窄；胆管或肝管多发小结石；手术后胆管残余结石；较小的胆囊结石，胆囊舒缩功能较好者。

138. 胆囊内直径 $0.5\sim 2\text{cm}$ 的单颗结石，宜选用

【正确答案】 C

【答案解析】碎石疗法适应证：症状性胆囊结石；口服胆囊造影检查显示胆囊功能正常；阴性胆结石；胆囊内直径0.5~2cm的单颗结石；或直径0.5~1cm的多发结石，但不得超过5颗结石；单发胆管阴性结石且定位准确。

- A. 大阴唇
- B. 小阴唇
- C. 前庭大腺
- D. 阴道前庭
- E. 阴阜

139. 耻骨联合前面隆起的脂肪垫是

【正确答案】 E

【答案解析】 阴阜为耻骨联合前面隆起的脂肪垫。

140. 当外阴部发生炎症时，最易形成囊肿的部位是

【正确答案】 C

【答案解析】 前庭大腺最易形成囊肿。

- A. 血热
- B. 气滞
- C. 痰湿
- D. 肝郁
- E. 血瘀

141. 月经周期先后无定期多为

【正确答案】 D

【答案解析】 周期先后无定期，多为肝郁或肾虚。

142. 月经周期提前多为

【正确答案】 A

【答案解析】 周期提前，多为血热或气虚。

- A. 归肾丸合二至丸
- B. 归脾汤
- C. 黑逍遥散
- D. 右归丸
- E. 人参养荣汤

143. 治疗外阴硬化性苔癣血虚化燥证首选

【正确答案】 E

【答案解析】 外阴硬化性苔癣之血虚化燥证。

证候：外阴干燥瘙痒，变薄，变白，脱屑，皲裂，阴唇、阴蒂萎缩或粘连，头晕眼花，心悸怔忡，气短乏力，面色萎黄；舌淡，苔薄，脉细。

治法：益气养血，润燥止痒。

方药：人参养荣汤。

144. 治疗外阴硬化性苔癣脾肾阳虚证首选

【正确答案】 D

【答案解析】 外阴硬化性苔癣之脾肾阳虚证。

证候：外阴瘙痒，局部皮肤黏膜薄脆，变白，弹性减弱，腰背酸楚，小便频数，四肢欠温，形寒畏冷，面浮肢肿，纳差便溏，性欲淡漠；舌淡胖，苔薄白或薄润，脉沉细无力。

治法：温肾健脾，养血润燥。

方药：右归丸加黄芪、白术。

- A. 荆防败毒散
- B. 三拗汤
- C. 新加香薷饮
- D. 麻杏石甘汤
- E. 银翘散合普济消毒饮

145. 暑邪感冒的首选方剂是

【正确答案】 C

【答案解析】 暑邪感冒的证候：发热，无汗或汗出热不解，头晕、头痛，鼻塞，身重困倦，胸闷，泛恶，口渴心烦，食欲不振，或有呕吐、泄泻，小便短黄，舌质红，苔黄腻，脉数或指纹紫滞。

治法：清暑解表。

方药：新加香薷饮加减。

146. 时邪感冒的首选方剂是

【正确答案】 E

【答案解析】 时邪感冒的证候：起病急骤，全身症状重。高热，恶寒，无汗或汗出热不解，头痛，心烦，目赤咽红，肌肉酸痛，腹痛，或有恶心、呕吐，舌质红，舌苔黄，脉数。

治法：清热解毒。

方药：银翘散合普济消毒饮加减。

- A. 滋补肾阴，清泻相火
- B. 疏肝解郁，清利湿热
- C. 滋阴清热，凉血宁络
- D. 清热解毒，凉血止血
- E. 疏肝解郁，清泻相火

147. 治疗小儿性早熟之阴虚火旺证治法宜选用

【正确答案】 A

【答案解析】 性早熟之阴虚火旺证。

证候：女孩乳房发育或伴其他性征及内外生殖器发育，甚者月经提前来潮；男孩睾丸容积增大（ $\geq 4\text{ml}$ ），或伴喉结突出，变声，或有遗精。或伴有潮热、盗汗、五心烦热、便秘、舌红或舌尖红，少苔，脉细数。

治法：滋补肾阴，清泻相火。

方药：知柏地黄丸加减。

148. 治疗小儿性早熟之肝经郁热证治法宜选用

【正确答案】 B

【答案解析】 性早熟之肝经郁热证。

证候：女孩乳核增大、触之疼痛、阴道分泌物增多；男孩阴茎勃起，变声。伴胸闷不舒、心烦易怒、暖气叹息痤疮、便秘、舌红，苔黄或黄腻，脉弦数或弦细数。

治法：疏肝解郁，清利湿热。

方药：丹栀逍遥散加减。

- A. 调理脾胃，继以驱虫
- B. 散结下虫，调理脾胃
- C. 安蛔定痛，继以驱虫
- D. 驱蛔杀虫，调理脾胃
- E. 通腑排蛔，调理脾胃

149. 蛔厥证的治法是

【正确答案】C

【答案解析】蛔厥证的证候：具有蛔虫证的一般症状。突然右上腹阵发性绞痛，弯腰曲背，辗转不安，恶心、呕吐，肢冷汗出，常吐出蛔虫。重者腹痛持续，时轻时剧，畏寒发热，甚则出现黄疸。舌苔黄腻，脉弦数或滑数。

治法：安蛔定痛，继以驱虫。

方药：乌梅丸加减。

150. 蛔虫证的治法是

【正确答案】D

【答案解析】蛔虫证的证候：脐周腹痛，时作时止，食欲不振，日见消瘦，大便不调，面色萎黄，或恶心、呕吐，或吐蛔虫，或大便下虫。睡眠不安，寐中磨牙，甚则爱挖鼻孔，咬衣角，嗜食泥土等；有的患儿面部出现淡色白斑，巩膜出现蓝色斑点，或下唇出现颗粒样大小白点。粪便镜检有蛔虫卵。

治法：驱蛔杀虫，调理脾胃。

方药：使君子散加减。