

【针灸学】

常用于治疗吐血、衄血等血证的腧穴是

A. 极泉

B. 少海

C. 通里

D. 阴郄

E. 少府

学员提问: 为什么选D?

答案及解析: 本题答案为D。

阴郄主治: ①心痛、惊悸等心病; ②骨蒸盗汗; ③吐血, 衄血【医学教育网原创】。

故本题答案选D。

【诊断学基础】

深吸气时脾脏在左肋下4cm但未超过脐水平, 临床为脾肿大

A. 轻度

B. 中度

C. 重度

D. 正常

E. 无法确定

学员提问: 为什么选B?

答案及解析: 本题答案为 B。

脾肿大的分度方法: 深吸气时脾脏在肋下不超过 2cm 者为轻度肿大; 超过 2cm 但在脐水平线以上, 为中度肿大; 超过脐水平线或前正中线为高度肿大, 又称巨脾。中度以上脾肿大时其右缘常可触及脾切迹, 这一特征可与左肋下其他包块相区别【医学教育网原创】。

故本题答案为 B。

【中药学】

治疗外感风寒兼脾胃气滞胸脘满闷、恶心呕逆者, 宜首选

A. 防风

B. 香薷

C. 细辛

D. 紫苏

E. 白芷

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为 D。

紫苏应用于: (1) 风寒感冒。风寒表证而兼气滞胸闷, 用之尤为适宜。

(2) 脾胃气滞, 胸闷呕吐。还可用于妊娠呕吐, 常与砂仁、陈皮同用。

(3) 进食鱼蟹中毒引起的腹痛吐泻【医学教育网原创】。

故本题答案为 D。

【中医儿科学】

预防脐风最重要的措施是

- A. 孕妇勿感风邪
- B. 产妇勿感风邪
- C. 小儿生后避风
- D. 清洁断脐护脐
- E. 脐疮防其走黄

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为 D。

断脐护脐

新生儿娩出 1~2 分钟, 就要结扎脐带后剪断, 处理时必须无菌操作, 脐带残端要用干法无菌处理, 然后用无菌敷料覆盖。若在特殊情况下未能保证无菌处理, 则应在 24 小时内重新消毒、处理脐带残端, 以防止感染及脐风。断脐后还需护脐。脐部要保持清洁、干燥, 让脐带残端在数天后自然脱落。在此期间, 要注意勿让脐部为污水、尿液及其他脏物所侵, 沐浴时勿浸湿脐部, 避免脐部污染, 预防脐风、脐湿、脐疮等疾病【医学教育网原创】。

故本题答案选 D。

【中医妇科学】

疏肝清热法治疗妇科病常用方是

- A. 八物汤
- B. 丹栀逍遥散
- C. 逍遥散
- D. 一贯煎

E. 调肝汤

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案 B。

疏肝清热: 肝郁化火, 治宜疏肝理气、清肝泄热。常用川楝子、丹皮、栀子、黄芩、桑叶、夏枯草、菊花等药, 代表方如丹栀逍遥散、宣郁通经汤。

故本题答案选 B。

医学教育网中医执业助理医师《答疑周刊》2021年第52期(下载)