

问题索引:

1. 子宫内膜异位症病灶最多见的部位?
2. 子宫内膜异位症的确诊依据?
3. 子宫内膜异位症临床分期的依据是?

具体解答:

1. 子宫内膜异位症病灶最多见的部位?

子宫内膜异位症病灶最多见的部位为

- A. 卵巢
- B. 输卵管
- C. 子宫后壁下段
- D. 直肠子宫陷凹
- E. 宫骶韧带

【正确答案】A

【答案解析】卵巢子宫内膜异位症最多见,约 80%患者病变累及一侧卵巢,双侧卵巢同时波及者约为 50%。

2. 子宫内膜异位症的确诊依据?

确诊子宫内膜异位症的依据应为

- A. B 型超声检查
- B. 宫腔镜检查
- C. 腹腔镜检查
- D. 测定血 CA125 值升高
- E. 进行性痛经,子宫后方触痛性结节

【正确答案】C

【答案解析】凡育龄妇女有继发性痛经,进行性加重和不孕史,盆腔检查扪及盆腔内有触痛性结节或子宫旁有不活动的囊性包块,应高度怀疑为子宫内膜异位症。确诊应首选腹腔镜检查,也可剖腹探查获得组织病理诊断。少数情况下,病理未发现异位子宫内膜的证据,但临床表现和术中所见符合内异症特征,也可诊

断。因此本题选 C。

3. 子宫内膜异位症临床分期的依据是？

子宫内膜异位症临床分期的依据是

- A. 彩色超声多普勒检查
- B. 典型病史及妇科检查
- C. 宫腔镜检查
- D. 腹腔镜检查
- E. 血清 CA125 测定

【正确答案】D

【答案解析】子宫内膜异位症的临床分期需要在腹腔镜手术或剖腹探查手术时进行，严格按照分期标准中的内容对手术中所见进行详细记录，以评估疾病的严重程度，正确选择治疗方案，准确比较各种治疗方法的优劣，判断患者的生育预后。故选 D。