

## 2022 年妇产科主治医师必备考点 (1-10)

### 【考点 1】子宫韧带

子宫共有 4 对韧带，即圆韧带、阔韧带、主韧带及宫骶韧带，借以维持子宫于正常位置，受骨盆底肌及筋膜的支托作用。

- (1) 圆韧带：维持子宫呈前倾位；
- (2) 阔韧带：外 1/3 部移行为骨盆漏斗韧带或称卵巢悬韧带；
- (3) 主韧带：固定宫颈位置、防止子宫下垂的主要结构；
- (4) 骶子宫韧带：维持子宫前倾前屈位。

### 【考点 2】阴道

阴道黏膜色淡，由复层鳞状上皮细胞所覆盖，无腺体。阴道黏膜受性激素影响有周期性变化。阴道壁富有静脉丛，损伤后易出血和形成血肿。

### 【考点 3】子宫

成年妇女的子宫重约 50~70g，长 7~8cm，宽 4~5cm，厚 2~3cm；子宫腔容量约 5ml。子宫体与宫颈的比例，女童为 1: 2，成年妇女为 2: 1，老年妇女为 1: 1。

### 【考点 4】输卵管

输卵管是卵子与精子相遇的场所，受精卵由输卵管向子宫腔运行。全长 8~14cm。

### 【考点 5】卵巢

卵巢为一对扁椭圆形的性腺，产生卵子及性激素。卵巢表面无腹膜，由单层立方上皮覆盖，称生发上皮。

### 【考点 6】卵巢的功能

产生卵子并排卵的生殖功能和产生性激素的内分泌功能。

### 【考点 7】黄体

排卵后卵泡液流出，卵泡壁塌陷，卵泡颗粒细胞和内膜细胞向内侵入，周围有结缔组织的卵泡外膜包围，共同形成黄体。排卵后 7~8 日（相当于月经周期第 22 日左右）黄体体积和功能达到高峰。若卵子未受精，黄体在排卵后 9~10 日开始退化，黄体期一般为 14 日，黄体衰退后月经来潮，卵巢中又有新的卵泡发育，开始新的周期。

### 【考点 8】早期妊娠临床表现

- (1) 停经：最早的症状。

(2) 早孕反应：停经 6 周左右出现，多在停经 12 周左右自行消失。

(3) 尿频。

(4) 乳房变化：蒙氏结节。

(5) 生殖器官变化：黑加征、停经 8 周子宫为非孕时 2 倍；停经 12 周为非孕时 3 倍，在耻骨联合上方可以触及。

**【考点 9】先兆流产**

妊娠 28 周前出现少量阴道流血，无妊娠物排出，阵发性下腹痛。妇科检查宫口未开，胎膜未破，子宫大小与停经周数相符。

处置：**继续妊娠：休息**，酌情用药——保胎。**不继续妊娠：人工流产或引产。**

**【考点 10】难免流产**

先兆流产阴道流血增多，阵发性下腹痛加剧，或出现阴道流液（胎膜破裂）。妇科检查宫口扩张，有时可见胚胎组织或胎囊堵塞于宫口内，子宫大小与停经周数基本相符或略小。

处置：立即清宫。

