

妇产科主治医师《专业知识》模考试卷

一、A1

1. 女性不孕因素中最常见的病因是

- A. 无排卵
- B. 输卵管因素
- C. 子宫内膜异位症
- D. 子宫黏膜下肌瘤
- E. 宫颈细长、宫颈炎

2. 下列哪一项不是侵蚀性葡萄胎的临床表现

- A. 贫血
- B. 子宫大小正常
- C. 有不规则阴道流血
- D. 附件触及黄素囊肿
- E. 阴道壁有紫蓝色结节

3. 下列疾病对应的检查方法哪一项不合适

- A. 子宫内膜癌——分段诊刮
- B. 宫颈柱状上皮异位——宫颈刮片
- C. 子宫颈癌——宫颈黏液检查
- D. 滴虫性阴道炎——白带悬滴法
- E. 不孕症——输卵管通畅检查

4. 对于宫颈上皮，下列哪项是不恰当的

- A. 鳞状上皮化生亦可为鳞状上皮不典型增生
- B. 雌激素水平升高时，可形成生理性宫颈糜烂
- C. 宫颈上皮是由宫颈阴道部的鳞状上皮与颈管柱状上皮共同组成
- D. 鳞状上皮化生是柱状上皮下的储备细胞增生转化为复层鳞状上皮，替代柱状上皮

E. 鳞状上皮化是宫颈阴道部的正常鳞状上皮直接长入柱状上皮与基底膜之间，替代柱状上皮

5. 关于妊娠期肝内胆汁淤积综合征，下列叙述不正确的是

- A. 又称妊娠期特发性黄疸
- B. 发生于妊娠中、晚期
- C. 以瘙痒和黄疸为特征
- D. 先有皮肤瘙痒，并进行性加重
- E. 重度黄疸

6. 有子宫破裂高危因素者应在预产期前几周入院待产

- A. 3 周
- B. 2 周
- C. 1 周
- D. 1~2 周
- E. 2~3 周

7. 妊娠合并梅毒的治疗原则中，妊娠早期和晚期应各进行一个疗程的治疗，对妊娠早期以后发现的梅毒，争取完成 2 个疗程治疗，中间间隔

- A. 1 周
- B. 2 周
- C. 3 周
- D. 4 周
- E. 6 周

8. 关于外阴基底细胞癌的治疗，下列叙述正确的是

- A. 需做外阴根治术
- B. 需作腹股沟淋巴结清除术
- C. 局部小范围病灶切除

D. 广泛局部病灶切除

E. 以上叙述都正确

9. 肝素钠用于治疗羊水栓塞早期的高凝状态，尤其在发病后几分钟内使用效果更佳

A. 10 分钟

B. 20 分钟

C. 30 分钟

D. 40 分钟

E. 60 分钟

10. 关于血栓性静脉炎，下列叙述不正确的是

A. 常累及卵巢静脉、子宫静脉、髂内静脉、髂总静脉及下腔静脉

B. 多为双侧

C. 多发生在产后 1~2 周

D. 继子宫内膜炎之后出现寒战、高热，且反复发作

E. 下肢血栓性静脉炎者病变多位于股静脉和大隐静脉

11. 妊娠时出现能使羊水进出呼吸道的呼吸运动的周数是

A. 13 周

B. 14 周

C. 15 周

D. 16 周

E. 18 周

12. () 是诊断羊膜腔感染的金标准。

A. 羊水细菌培养

B. 羊水白介素-6 测定

C. 羊水涂片革兰染色检查

D. 羊水涂片计数白细胞

E. 羊水葡萄糖定量检测

13. 二胎或多胎妊娠时，子宫体积及张力明显增大，其容量将增加超过

A. 10L

B. 11L

C. 12L

D. 13L

E. 14L

14. 关于萎缩性阴道炎的临床表现，下列叙述不正确的是

A. 外阴灼热不适

B. 瘙痒及阴道分泌物增多

C. 阴道分泌物稀薄，呈蛋清色

D. 感染严重者呈脓血性白带

E. 伴有性交痛

15. 关于分娩期巨大胎儿的处理，下列叙述不正确的是

A. 估计胎儿体重 $\geq 4000\text{g}$ 且合并糖尿病者，建议剖宫产终止妊娠

B. 估计胎儿体重 $\geq 4000\text{g}$ 而无糖尿病者，可阴道试产

C. 产时应充分评估，必要时产钳助产

D. 同时做好处理臀难产的准备工作

E. 分娩后应行宫颈及阴道检查，了解有无软产道损伤，并预防产后出血

16. 细胞学结果为 ASC-US、ASC-H 或 ISIL 的 CIN1，建议每年检测 HPV DNA 或每

() 复查宫颈细胞学。

A. 3~6 个月

B. 4~8 个月

C. 5~10 个月

D. 6~12个月

E. 1年

17. 关于羊水过少的病因，下列叙述不正确的是

- A. 胎儿四肢畸形者易导致羊水过少
- B. 小头畸形、甲状腺功能减低等也可引起羊水过少
- C. 胎膜破裂，羊水外漏速度超过羊水生成速度，可导致羊水过少
- D. 妊娠期高血压疾病可致胎盘血流减少
- E. 血管紧张素转换酶抑制剂等有抗利尿作用，使用时间过长，可发生羊水过少

18. 诊断性宫颈锥切术的适应证有

- A. 宫颈刮片细胞学检查多次找到恶性细胞，而宫颈多处活检及分段诊刮病理检查均未发现癌灶
- B. 盆腔急性炎症
- C. 宫颈柱状上皮异位
- D. 宫颈息肉
- E. 血液病等出血倾向

19. 关于先兆子宫破裂，下列叙述不正确的是

- A. 有剖宫产、梗阻性分娩病史
- B. 强烈子宫收缩，烦躁不安
- C. 阴道大量出血，可有血尿
- D. 子宫下段压痛，可有病理性收缩环
- E. 超声检查无特殊变化

20. 径线头盆指数(CID)为骨盆中腔前后径和横径的平均值与胎儿双顶径之差。若(),可疑头盆不称。

- A. $CID \leq 11.8\text{mm}$
- B. $CID \leq 12.8\text{mm}$

C. CID \leq 13.8mm

D. CID \leq 14.8mm

E. CID \leq 15.8mm

21. 关于第三产程的临床表现，下列叙述不正确的是

A. 宫底降至脐平，产妇略感轻松

B. 宫缩暂停数分钟后再次出现

C. 胎盘不能相应缩小，与子宫壁发生错位而剥离

D. 剥离面出血形成胎盘后大量出血

E. 子宫继续收缩，剥离面积继续扩大，直至胎盘完全剥离而娩出

22. 关于长效避孕针，下列叙述不正确的是

A. 有单孕激素制剂和雌、孕激素复合制剂两种

B. 有效率达 98%以上

C. 尤其适用于对口服避孕药有明显胃肠道反应者

D. 雌、孕激素复合制剂肌内注射 1 次，可避孕 3 个月

E. 单孕激素制剂醋酸甲羟孕酮避孕针每隔 3 个月注射 1 针，避孕效果好

23. 关于急性盆腔腹膜炎及弥漫性腹膜炎的叙述不正确的是

A. 腹肌紧张明显

B. 腹膜炎性渗出及纤维素沉积可引起肠粘连

C. 常在直肠子宫陷凹形成局限性脓肿

D. 刺激肠管和膀胱导致腹泻

E. 里急后重及排尿异常

24. 关于痛经的病因，下列叙述不正确的是

A. 原发性痛经的发生主要与月经期子宫内膜前列腺素(PG)含量升高有关

B. PGF 含量升高是造成痛经的主要原因

C. 无排卵的增生期子宫内膜因无孕酮刺激，含前列腺素浓度较高，可发生痛经

D. PGF 含量高可引起子宫平滑肌过强收缩, 血管挛缩、造成子宫缺血、乏氧状态而出现痛经

E. 原发性痛经还受精神、神经因素影响, 疼痛的主观感受也与个体痛阈有关

25. 子宫复旧期() 发挥主要作用

A. 降钙素

B. 前列腺素

C. 缩宫素

D. 促肾上腺素释放激素

E. 孕激素

26. 阴道分娩镇痛需将神经阻滞范围控制在 () 之间。

A. 胸 8~骶 3

B. 胸 10~骶 5

C. 胸 11~骶 4

D. 胸 7~骶 5

E. 胸 9~骶 4

27. 产后应适当补充维生素和铁剂, 推荐补充铁剂

A. 1 个月

B. 2 个月

C. 3 个月

D. 4 个月

E. 5 个月

28. 治疗性早产是指由于母体或胎儿的健康原因不允许继续妊娠, 在未足()时采取引产或剖宫产终止妊娠。

A. 34 周

B. 35 周

C. 36 周

D. 37 周

E. 38 周

29. 关于绝经综合征的治疗不正确的是

A. 睡前可服用艾司唑仑 2.5mg

B. 谷维素有助于调节自主神经

C. 谷维素口服 20mg，每日 1 次

D. 摄入足量蛋白质

E. 摄入足量含钙丰富食物

30. 双胎或多胎妊娠时，孕妇血容量较单胎妊娠多（），心率和心搏量都增加。

A. 300ml

B. 400ml

C. 500ml

D. 600ml

E. 700ml

31. 关于高催乳素血症的放射治疗，下列叙述不正确的是

A. 放射治疗显效快

B. 可能引起垂体功能低下

C. 可能诱发肿瘤

D. 可能引起视神经损伤

E. 不主张单纯放疗

32. 若无并发症，单绒毛膜性双胞胎的分娩孕周为

A. 32~34 周

B. 33~35 周

C. 34~36 周

D. 35~37 周

E. 36~38 周

33. 胎头双顶径长 98~100mm，股骨长 78~80mm，腹围 ()，应考虑巨大胎儿，同时排除双胎、羊水过多及胎儿畸形。

A. >330mm

B. >340mm

C. >350mm

D. >360mm

E. >370mm

34. 产后出血软产道裂伤的不正确处理是

A. 应彻底止血，按解剖层次逐层缝合裂伤

B. 缝合第一针应超过裂伤顶端，不留死腔

C. 避免缝线穿透直肠黏膜

D. 软产道血肿应切开血肿、清除积血，彻底止血、缝合

E. 无需置橡皮引流

35. 下列关于绒癌的描述不正确的是

A. 海绵样

B. 鲜红色

C. 镜下可见两种滋养细胞成分成片浸润

D. 拉长的合体滋养细胞交错排列

E. 没有绒毛结构

二、A2

36. 患者，女，30岁，孕36周，无痛性少量阴道流血3天，无宫缩。对此患者进行产科检查时。最可能出现的体征是

A. 子宫硬如板状

- B. 子宫大于孕周
- C. 胎方位不清楚
- D. 胎心遥远
- E. 胎先露高浮

37. 患者，女，27岁，妊娠37周，阴道流液3小时入院。患者诊断为胎膜早破，那么采用pH试纸测定的结果应该是

- A. $\text{pH} \leq 3$
- B. $\text{pH} 3 \sim 4$
- C. $\text{pH} 4.5 \sim 5.5$
- D. $\text{pH} 5 \sim 6$
- E. $\text{pH} \geq 6.5$

38. 初孕妇，平素月经规则，现停经32周，近3周体重无明显增加，宫高23cm。B型超声提示羊水过少（羊水指数为43mm）。本例的处理方案是

- A. 立即终止妊娠
- B. 待其足月后立即终止妊娠
- C. 待其自然分娩
- D. 待其34周立即终止妊娠
- E. 积极促胎肺成熟后终止妊娠

39. 34岁已婚妇女，停经41周，胎动减少3日，下腹阵痛2小时。检查宫高29cm，胎心140次/min。B型超声检查羊水指数5cm，胎儿外观无畸形，胎心电子监护检查CST阳性。正确处理方法是

- A. 卧床休息
- B. 人工破膜观察羊水
- C. 住院观察，密切检测胎心胎动
- D. 剖宫产
- E. 缩宫素引产

40. 臀位分娩时，产程中的处理正确的是

- A. 鼓励产妇离床活动
- B. 宫口开 1~2cm 时给予温肥皂水灌肠
- C. 一旦破水应立即听胎心
- D. 宫缩时阴道口见胎足，提示已进入第二产程
- E. 为避免脐带脱垂，活跃期应充分堵臀

41. 35 岁初产妇，在家中经阴道自然分娩，当胎儿及胎盘娩出后，出现时多时少的阴道持续流血已 1 小时，送来急诊。为确定诊断，需追问对本例有价值的病史是

- A. 贫血
- B. 滞产
- C. 高龄初产妇
- D. 臀先露经阴道分娩
- E. 新生儿体重 3200g

42. 某产妇，胎儿胎盘娩出后阴道大量流血，为确定出血原因，操作不正确是

- A. 检查胎盘胎膜是否完整
- B. 检查软产道是否有损伤
- C. 急查凝血功能
- D. 检查子宫收缩情况
- E. 检查脐带长度

43. 27 岁初产妇，半月前经阴道自然分娩，产后出血量约 700ml，未输血。至今恶露量多，有臭味。查宫底在耻骨联合上 2cm，有压痛。妇科检查：子宫左侧触及 6cm×7cm×5cm 有压痛肿块。不正确的处理方法是

- A. 取宫腔分泌物作细菌培养
- B. B 型超声检查

- C. 静脉滴注广谱抗生素
- D. 急查白细胞总数及分类
- E. 行剖腹探查

44. 患者，女，30岁，查体发现子宫颈肥大，行宫颈细胞学检查未见异常。其治疗方式正确的是

- A. 子宫颈锥切
- B. 子宫颈切除
- C. 预防性应用抗生素
- D. 微波治疗
- E. 定期随访

45. 患者，女，35岁，停经2个月，尿hCG(-)，大量阴道出血伴重度贫血。此病例的最佳止血方案是

- A. 诊断性刮宫
- B. 大量雌激素使内膜迅速修复
- C. 大量孕激素——药物性刮宫
- D. 大量雄激素——减少出血
- E. 大量止血药以减少出血

46. 患者，女，29岁，继发不孕伴痛经2年。妇科检查：宫颈光滑，子宫后位，正常大小，粘连固定，经阴道后穹隆扪及触痛结节。应诊断为

- A. 卵巢癌
- B. 子宫内膜异位症
- C. 慢性盆腔炎
- D. 子宫腺肌病
- E. 盆腔淤血症

47. 患者，女，46岁，G₄P₂，主诉阴道内肿胀感。妇科检查：让患者排尿后平卧向下屏气用力，发现宫颈外口在处女膜缘，可回纳。诊断其子宫脱垂为

- A. I度轻型
- B. I度重型
- C. II度轻型
- D. II度重型
- E. III度

48. 患者，女，32岁，G₁P₀，孕32周，主诉小腿及踝部有水肿，休息后可好转，腰背痛、便秘，偶有下肢肌肉痉挛。血常规检查示贫血。对该患者进行健康指导时，内容不正确的是

- A. 嘱孕妇左侧卧位，下肢垫高15°，限制水分
- B. 养成定时排便的习惯
- C. 适当增加瘦肉、蛋黄的摄入
- D. 多吃含纤维素多的蔬菜、水果
- E. 适当限制盐的摄入

49. 患者，女，G₁P₀，孕40周，中骨盆狭窄，在严密监护下试产，现宫口已开全，胎头双顶径达坐骨棘水平。可采取

- A. 等待自然分娩
- B. 灌肠促进宫缩
- C. 做好阴道助产术准备
- D. 遵医嘱给予镇静、镇痛药
- E. 做好剖宫产准备

50. 26岁初产妇，妊娠40周，来院时规律宫缩22小时，已破膜。检查：宫底剑突下3指，胎心在脐下左下方140次/min。肛查宫口开全，胎头S+4。本例正确处理应是

- A. 等待自然分娩

- B. 行胎头吸引器助娩
- C. 会阴侧切后自然分娩
- D. 会阴侧切后产钳助娩
- E. 行剖宫产术

51. 女性，25岁。既往月经规律，现月经过期16天无来潮。自述近来有厌食、晨起呕吐症状。最可能的诊断是

- A. 葡萄胎
- B. 早孕
- C. 原发性闭经
- D. 继发性闭经
- E. 生殖道下段闭锁

52. 女性，34岁。因停经40天，尿妊娠试验(+)，5天前于当地医院行人工流产术，现剧烈腹痛并里急后重2小时，伴恶心、心悸。下述考虑正确的是

- A. 宫腔积血，给予缩宫素注射
- B. 盆腔感染，给予抗生素治疗
- C. 应为流产不全，需再次清宫
- D. 子宫正常收缩
- E. 应除外异位妊娠

53. 女性，45岁。阴道不规则流血2个月，G₂P₁A₁L₁，BMI=30kg/m²。诊刮：宫腔深度为8.5cm，病理示子宫内膜样腺癌，以下错误的是

- A. I型（雌激素依赖型）可能性大
- B. 不会出现血行转移
- C. 是最常见的病理类型
- D. 存在患内膜癌的风险因素
- E. 临床分期可能为IA

54. 女性，25岁，已婚。外阴瘙痒、白带多1天。妇科检查：小阴唇内侧面见1~2mm绒线样肿物，淡红色，表现柔软，触之有颗粒样感，醋酸白试验阴性。

本患者可能的诊断为

- A. 外阴白色病变
- B. 外阴阴道假丝酵母菌病
- C. 假性湿疣
- D. 尖锐湿疣
- E. 梅毒

55. 女性，65岁。I度子宫脱垂病史10余年，自行安放子宫托治疗，因放取麻烦而长期放置不取。近2个月患者出现阴道漏液现象，取出子宫托后漏液加重。最可能的诊断是

- A. 子宫脱垂合并压力性尿失禁
- B. 子宫脱垂合并膀胱阴道瘘
- C. 子宫脱垂合并阴道前壁膨出
- D. 子宫脱垂合并阴道后壁膨出
- E. 子宫脱垂合并阴道前后壁膨出

56. 女性，25岁。原发不孕2年，原发性闭经，孕激素试验呈阴性，人工周期月经来潮。查体：身高164cm，肘外翻明显，腭弓高尖，后发际少，内生殖器发育不良。为查病因，下列检查重要的是

- A. 染色体核型
- B. 尿雌激素水平测定
- C. 阴道涂片性激素水平检查
- D. 诊断性刮宫
- E. 基础体温测定

57. 女性, 35 岁。侵蚀性葡萄胎治疗后, 定期随访, hCG 正常 1 年, 停经 45 天, 左下腹痛伴少量阴道出血 3 天。血 hCG 1200IU/L。B 超示内膜厚 1.1cm, 左附件区 3.2cm×3.7cm 大小的不均质回声。以下可能性最大的是

- A. 侵蚀性葡萄胎转移
- B. 绒癌
- C. 先兆流产
- D. 异位妊娠
- E. 早孕

58. 经产妇, 停经 36 周, 右肩前位, 胎膜已破, 胎心音消失 24 小时。肛门指检: 宫口开全, 无先兆子宫破裂征象。恰当的处理是

- A. 全麻下行碎胎术
- B. 全麻下行内倒转术
- C. 立即行剖宫产术
- D. 等其阴道自娩
- E. 静脉滴注缩宫素待阴道助产

59. 初产妇, 30 岁, 39⁺² 周妊娠, 规律性下腹痛 4~5 小时入院。检查宫口开大 4cm, 孕妇自觉有排便感, 屏气向下用力, 此时最有可能的胎方位为

- A. 枕前位
- B. 枕后位
- C. 前不均倾
- D. 后不均倾
- E. 高直后位

60. 女性, 29 岁。妊娠 30 周, 腹部迅速增大 1 周, 持续腹痛伴气急、心悸、不能平卧 2 天。检查: 心率 102 次/min, 呼吸 30 次/min, 血压 120/80mmHg, 下肢水肿(++), 宫高 40cm, 腹围 102cm, 胎心音轻而远, 胎位不清。应诊断为

- A. 双胞胎

- B. 妊娠合并心脏病
- C. 妊娠合并卵巢囊肿蒂扭转
- D. 急性羊水过多
- E. 胎盘早剥

61. 产妇 38 周妊娠，既往剖宫产 1 次。此次剖宫产术时见子宫下段菲薄，可见黑色胎发。诊断应是

- A. 完全子宫破裂
- B. 先兆子宫破裂
- C. 不完全子宫破裂
- D. 子宫瘢痕处妊娠
- E. 子宫肌层断裂

62. 孕妇 36 周妊娠，规律宫缩每 5~6 分钟 1 次，持续 30 秒，无阴道流水及流血。阴道检查宫颈管消退 80%，宫口开大 3cm。此时为

- A. 生理性宫缩
- B. 早产临产
- C. 先兆早产
- D. 先兆临产
- E. 足月临产

63. 经产妇，足月妊娠，臀先露，估计胎儿体重 3000g。阴道分娩处理错误的是

- A. 第一产程少做肛门指检，不灌肠，适当走动
- B. 破膜后立即听胎心率，若出现胎心率异常，阴道检查有无脐带脱垂
- C. 协调性宫缩乏力时可给予静滴缩宫素加强宫缩
- D. 宫口开大 5cm，胎足脱入阴道，消毒外阴后使用堵外阴法
- E. 宫口开全后不应再堵外阴，以免引起胎儿窘迫或子宫破裂

64. 孕妇妊娠 37 周。检查 HBsAg、HBeAg 及 HBcAb 均阳性，进行产前咨询。关于乙型病毒性肝炎母婴传播，下列叙述不正确的是

- A. HBV 可以通过胎盘引起胎儿宫内感染
- B. 产时传播是乙型肝炎母婴传播的主要途径
- C. 选择性剖宫产可以避免产时传播
- D. 产后母乳喂养不会造成婴儿 HBV 感染
- E. 新生儿可通过接触母亲唾液感染 HBV

65. 女性，35 岁。滴虫阴道炎迁延半年不愈。应采取的措施不包括

- A. 阴道分泌物滴虫培养+药敏试验
- B. 性伴侣同时治疗
- C. 可改用替硝唑
- D. 增加甲硝唑疗程及剂量
- E. 加用广谱抗生素静脉滴注

三、A3/A4

患者，女，33 岁。双胎妊娠，胎膜早破，规律宫缩 14 小时，子宫颈口开大 2cm，行剖宫产术，术后静脉点滴抗生素预防感染，第 4 天出现发冷、发热和腹痛，乳房胀，体温 39.5℃ 持续 4 小时，检查子宫底平脐，压痛阳性，恶露污浊有臭味。

66. 本例首先应考虑的诊断是

- A. 急性乳腺炎
- B. 乳腺乳汁淤积
- C. 急性膀胱炎
- D. 急性子宫内膜炎
- E. 上呼吸道感染

67. 最可能造成感染的原因是

- A. 年龄过大

- B. 双胞胎妊娠
- C. 胎膜早破
- D. 乳头皲裂
- E. 胎盘残留

患者，女，25岁。停经5个月，突发腹痛2日入院，腹痛位于上腹部，伴恶心、呕吐，低热。查：体温38.2℃，脉搏110次/min，无明显宫缩，胎位不清，胎心165次/min，右侧腹部压痛、反跳痛明显，平脐处为甚，麦氏点无压痛、反跳痛。Hb 110g/L，WBC $19 \times 10^9/L$ ，N 85%。

68. 最可能的诊断为

- A. 妊娠合并急性胃肠炎
- B. 妊娠合并急性胆囊炎
- C. 妊娠合并急性肾盂肾炎
- D. 妊娠合并输尿管结石
- E. 妊娠合并急性阑尾炎

69. 最恰当的处理是

- A. 静滴抗生素，保守治疗
- B. 静滴山莨菪碱及抗生素
- C. 抗炎、利胆治疗
- D. 积极抗炎，立即手术
- E. 消炎、护胃治疗

29岁经产妇，现妊娠40周，头位。规律宫缩8小时，自然破水，发现羊水III度污染，胎心150~160次/min。

70. 以下处理最重要的是

- A. 持续吸氧左侧卧位
- B. 了解宫口扩大及先露下降情况
- C. 持续胎心监护
- D. 加强宫缩争取短时间内阴道分娩
- E. 抗生素预防感染

71. 若此时胎心持续 160 次/min，宫缩后出现晚期减速，检查宫口开全，先露部已达坐骨棘平面以下 3cm。不必要的处理是

- A. 持续吸氧
- B. 做好新生儿抢救准备
- C. 指导产妇屏气用力
- D. 阴道助产准备
- E. 立即剖宫产

29 岁初产妇，孕 36 周，发现血压升高 3 周，今晨突然腹痛，诉为持续性，阵发加重。血压 20/13kPa(150/98mmHg)，心率 112 次/min。尿蛋白(++)，阴道有少量出血。

72. 此时最有可能的诊断是

- A. 先兆早产
- B. 胎盘早剥
- C. 先兆子宫破裂
- D. 前置胎盘
- E. 子宫肌瘤红色变性

73. 体格检查最可能发现的子宫体征是

- A. 子宫有规则阵发收缩，宫缩间期子宫完全放松
- B. 子宫局部隆起似包块状有压痛

- C. 子宫上段硬，下段膨隆压痛，交界处有环状凹陷
- D. 子宫不规则收缩，较硬，压痛，宫缩间歇不完全放松
- E. 子宫柔软，有压痛，无宫缩

74. 此时对诊断最有用的检查是

- A. 血红蛋白
- B. 白细胞计数、分类
- C. 胎心监护
- D. B超
- E. 眼底检查

患者，女，28岁。G₂P₀，孕33周，阴道少许流血2天，规律腹痛3小时，肛查子宫颈管消退，宫口开大1cm。

75. 此患者最可能的诊断是

- A. 临产
- B. 先兆流产
- C. 晚期流产
- D. 先兆早产
- E. 前置胎盘

76. 对该患者，最首要的处理措施是

- A. 人工破膜
- B. 缩宫素引产
- C. 抗生素预防感染
- D. 再次肛查确认宫口开大情况
- E. 静脉滴注硫酸镁抑制宫缩

77. 治疗期间宫缩越来越频繁，达到 1 次/3min，中等强度，肛查宫口开大 3cm。

处理正确的是

- A. 继续硫酸镁治疗抑制宫缩
- B. 立即剖宫产结束分娩
- C. 新生儿出生后立即结扎脐带
- D. 产程中尽量避免会阴侧切
- E. 以上均不对

孕妇 28 岁，孕 37 周自觉胎动少一日，来院行产前检查。无腹痛、无阴道流液，无出血。查体：生命体征平稳，一般情况好，心肺查体未见异常，腹膨隆，宫高 28cm，腹围 90cm，FHR 120 次/min。

78. 为除外胎儿宫内缺氧，应首先进行的检查项目为

- A. 血、尿常规检查
- B. B 型超声检查
- C. 肝、肾功能检查
- D. 胎儿电子监护
- E. 生物物理评分

79. 若该孕妇胎心监护为无反应型，进一步行生物物理评分，见胎儿呼吸运动 1 次，持续 >20 秒；无肢体活动；肌张力好；羊水最大暗区 1cm，生物物理评分应为

- A. 6 分
- B. 5 分
- C. 4 分
- D. 3 分
- E. 2 分

80. 根据上述生物物理评分，提示胎儿宫内状态为

- A. 无急慢性缺氧
- B. 可能有急性缺氧
- C. 可能有慢性缺氧
- D. 有急性或慢性缺氧
- E. 有急性缺氧伴慢性缺氧

女，37岁。因阴部有块物脱出就诊。妇科检查见部分宫体与宫颈外露于阴道口，宫颈较长。

81. 此患者子宫脱垂的临床分度为

- A. I度轻
- B. I度重
- C. II度轻
- D. II度重
- E. III度

82. 本例正确的处理应是

- A. 阴道前后壁修补术
- B. Manchester 手术
- C. 阴道纵隔形成术
- D. 经阴道子宫全切除及阴道前后壁修补术
- E. 经腹子宫全切除术

女，18岁。2小时前左下腹部剧烈腹痛，恶心呕吐2次，体温37.5℃。肛查：子宫右侧触及活动良好、触痛明显、手拳大肿物。

83. 本例最可能的诊断是

- A. 盆腔炎包块
- B. 输卵管结核
- C. 卵巢子宫内膜异位囊肿破裂
- D. 子宫浆膜下肌瘤扭转
- E. 卵巢肿瘤蒂扭转

84. 本例应采取的处理措施是

- A. 给予抗生素、止痛药
- B. 抗结核药物治疗
- C. 进行腹腔穿刺明确诊断
- D. 进行腹腔镜检查明确诊断
- E. 行剖腹探查

女，28岁。足月产后5天，下腹疼痛3天，发热1天，阴道分泌物无异味，子宫增大，既往有子宫肌瘤史。

85. 本例首先考虑的诊断是

- A. 产褥感染
- B. 肌瘤恶性变
- C. 肌瘤玻璃样变
- D. 肌瘤囊性变
- E. 肌瘤红色样变

86. 正确的处理是

- A. 子宫切除
- B. 雄激素治疗
- C. 对症处理
- D. 肌瘤剔除术

E. 不需治疗

经产妇，28岁。妊娠27周出现皮肤瘙痒，巩膜轻微发黄半月，无其他不适。血压126/84mmHg，前次妊娠有同样病史，于产后黄疸自行消退。化验：ALT 140U/L。

87. 本例最可能的诊断是

- A. 妊娠期高血压疾病引起肝损害
- B. 急性病毒性肝炎
- C. 妊娠期急性脂肪肝
- D. 妊娠期肝内胆汁淤积症
- E. 药物性肝炎

88. 若怀疑是妊娠期肝内胆汁淤积症，为确诊应做的检查项目是

- A. 血清直接胆红素
- B. 血胆固醇
- C. 血清胆酸
- D. 尿胆原
- E. 血清胰岛素

89. 若怀疑是病毒性肝炎，应具备的表现是

- A. 黄疸
- B. ALT 剧烈升高
- C. 胆固醇升高
- D. 食欲不振、恶心、呕吐等消化道症状
- E. HBsAg(+)

90. 经确诊为妊娠期肝内胆汁淤积症，对母儿无影响的是

- A. 血压升高
- B. 胎儿窘迫
- C. 早产
- D. 死胎
- E. 围生儿死亡率增高

产妇，27岁。临产17小时，阴道有少量淡绿色液体流出。宫缩25s/（6~8）min，胎心音150次/min。肛查宫口开大2+cm，宫颈轻度水肿，胎头S-2。

91. 正确的诊断是

- A. 活跃期延长
- B. 潜伏期延长
- C. 原发性宫缩乏力
- D. 胎儿窘迫
- E. 头盆不称

92. 根据产妇病情，不应进行的处理是

- A. CST 检查
- B. 给病人吸氧
- C. 静滴5%苏打水
- D. 静脉推注安定10mg
- E. 静滴催产素

93. CST 监护出现频繁的晚期减速，胎心音160次/min，此时应首选的处理是

- A. 左侧卧位
- B. 静滴50%葡萄糖
- C. 剖宫产结束分娩

- D. 继续给氧
- E. 静滴小剂量催产素

初产妇，24岁。仅在乡卫生院做过2次产前检查，自述现妊娠38周，阵发腹痛2小时来院分娩，检查血压120/80mmHg，胎心140次/min，四段触诊发现母体宫底部可触及胎头，拟诊为臀先露。

94. 关于臀先露的描述，正确的是

- A. 单臀先露最常见
- B. 完全臀先露最常见
- C. 足先露最常见
- D. 膝先露最常见
- E. B超不易辨别臀先露的类型

95. 关于该产妇的分娩方式，正确的是

- A. 一旦诊断，均应行剖宫产
- B. 除外骨盆狭窄，均可经阴道分娩
- C. 单臀先露均可经阴道分娩
- D. 脐部娩出后，应在8分钟内娩出胎头
- E. 后出头时禁用产钳助产

经产妇，产后第1天，诉下腹痛。查体：有低热，出汗，咽无充血，无恶心呕吐、腹泻，脐下二横指处触及一硬块上界，白细胞 $11.0 \times 10^9/L$ ，中性0.75。

96. 最可能的诊断是

- A. 产后子宫内膜炎
- B. 产后宫缩痛
- C. 子宫肌瘤红色变性

D. 卵巢囊肿扭转

E. 子宫肌炎

97. 正常产后第 3 天，乳房胀痛，无红肿，乳汁少，伴低热。解决方法首选

A. 芒硝敷乳房

B. 生麦芽煎汤喝

C. 用吸奶器吸乳汁

D. 让新生儿多吸吮双乳

E. 少喝汤水

98. 产后第 4 天，双乳房胀，乳汁排流不畅，最常见原因是

A. 进食少

B. 卧床不活动

C. 未及早按摩、热敷乳房

D. 未给新生儿早吸吮、多吸吮

E. 乳头凹陷

足月产妇，孕 39 周，重度妊娠期高血压疾病、先兆子痫，剖宫产术后 0.5h，
阴道持续流血，未见血凝块，失血达 900ml，应用缩宫剂无效。

99. 最可能的出血原因是

A. 子宫收缩乏力

B. 软产道裂伤

C. 胎盘残留

D. 凝血功能障碍

E. 羊水栓塞

100. 需要进一步检查的项目是

- A. 胸部 X 线检查
- B. 血小板计数，凝血试验
- C. 心电图
- D. 眼底检查
- E. 肝功能检查

2022 年妇产科主治医师《专业知识》考前模考大赛（二）答案解析

一、A1

1. 【正确答案】 B

【答案解析】 女性不孕因素中最常见的病因是输卵管因素。

2. 【正确答案】 B

【答案解析】 侵蚀性葡萄胎的临床表现：贫血、子宫大于正常、有不规则阴道流血、附件触及黄素囊肿、阴道壁有紫蓝色结节。

3. 【正确答案】 C

【答案解析】 子宫颈癌——子宫颈细胞学检查。

4. 【正确答案】 A

【答案解析】 鳞状上皮化生：暴露于子宫颈阴道部的柱状上皮受阴道酸性影响，柱状上皮未分化储备细胞开始增殖，并逐渐转化为鳞状上皮，继之柱状上皮脱落，被复层鳞状细胞所替代；②鳞状上皮化：子宫颈阴道部鳞状上皮直接长入柱状上皮与其基底膜之间，直至柱状上皮完全脱落而被鳞状上皮替代。

5. 【正确答案】 E

【答案解析】 1) 轻度：①血清总胆汁酸 $10\sim 39.9\ \mu\text{mol/L}$ ；②主要症状为瘙痒，无其他明显症状。2) 重度：①血清总胆汁酸 $\geq 40\ \mu\text{mol/L}$ ；②症状严重伴

其他情况，如多胎妊娠、妊娠期高血压疾病、复发性 ICP、既往有因 ICP 的死胎史或新生儿窒息死亡史等。满足以上任何一条即为重度。

6. 【正确答案】 D

【答案解析】 有子宫破裂高危因素者应在预产期前 1~2 周入院待产。

7. 【正确答案】 B

【答案解析】 中间间隔 2 周。

8. 【正确答案】 D

【答案解析】 外阴基底细胞癌的治疗是广泛局部病灶切除。

9. 【正确答案】 A

【答案解析】 肝素钠用于治疗羊水栓塞早期的高凝状态，尤其在发病后 10 分钟内使用效果更佳。

10. 【正确答案】 B

【答案解析】 血栓性静脉炎常累及卵巢静脉、子宫静脉、髂内静脉、髂总静脉及下腔静脉；多为单侧；多发生在产后 1~2 周；继子宫内膜炎之后出现寒战、高热，且反复发作；下肢血栓性静脉炎者病变多位于股静脉和大隐静脉。

11. 【正确答案】 D

【答案解析】 妊娠时出现能使羊水进出呼吸道的呼吸运动的周数是 16 周。

12. 【正确答案】 A

【答案解析】 羊水细菌培养是诊断羊膜腔感染的金标准。

13. 【正确答案】 A

【答案解析】 双胎或多胎妊娠时，子宫体积及张力明显增大，其容量将增加超过 10L。

14. 【正确答案】 C

【答案解析】 萎缩性阴道炎的临床表现：外阴灼热不适；瘙痒及阴道分泌物增多；感染严重者呈脓血性白带；伴有性交痛。

15. 【正确答案】 D

【答案解析】 分娩期巨大胎儿的处理，估计胎儿体重 $\geq 4000\text{g}$ 且合并糖尿病者，建议剖宫产终止妊娠；估计胎儿体重 $\geq 4000\text{g}$ 而无糖尿病者，可阴道试产；产时应充分评估，必要时产钳助产；分娩后应行宫颈及阴道检查，了解有无软产道损伤，并预防产后出血。

16. 【正确答案】 D

【答案解析】 细胞学结果为 ASC-US、ASC-H 或 ISIL 的 CIN1，建议每年检测 HPV DNA 或每 6~12 个月复查宫颈细胞学。

17. 【正确答案】 A

【答案解析】 羊水过少的病因：小头畸形、甲状腺功能减低等也可引起羊水过少；胎膜破裂，羊水外漏速度超过羊水生成速度，可导致羊水过少；妊娠期高血压疾病可致胎盘血流减少；血管紧张素转换酶抑制剂等有抗利尿作用，使用时间过长，可发生羊水过少。

18. 【正确答案】 A

【答案解析】 宫颈刮片细胞学检查多次找到恶性细胞，而宫颈多处活检及分段诊刮病理检查均未发现癌灶的情况，可以行诊断性宫颈锥切术。

19. 【正确答案】 C

【答案解析】先兆子宫破裂表现为：①子宫呈强直性或痉挛性过强收缩，产妇烦躁不安，呼吸、心率加快，下腹剧痛难忍。②因胎先露部下降受阻，子宫收缩过强，子宫体部肌肉增厚变短，子宫下段肌肉变薄拉长，在两者间形成环状凹陷，称为病理缩复环。随着产程进展，可见该环逐渐上升平脐或脐上，压痛明显。③膀胱受压充血，出现排尿困难及血尿。④因宫缩过强、过频，无法触清胎体，胎心率加快或减慢或听不清。所以C项阴道大量出血错误。

20. 【正确答案】 E

【答案解析】 $CID \leq 15.8\text{mm}$ ，可疑头盆不称。

21. 【正确答案】 D

【答案解析】第三产程的临床表现：宫底降至脐平，产妇略感轻松；宫缩暂停数分钟后再次出现；胎盘不能相应缩小，与子宫壁发生错位而剥离；子宫继续收缩，剥离面积继续扩大，直至胎盘完全剥离而娩出。

22. 【正确答案】 D

【答案解析】长效避孕针目前的长效避孕针，有单孕激素制剂和雌、孕激素复合制剂两种。有效率达98%以上。尤其适用于对口服避孕药有明显胃肠道反应者。雌、孕激素复合制剂肌内注射1次，可避孕1个月。复合制剂，由于激素剂量大，副作用大，很少用。单孕激素制剂：醋酸甲羟孕酮避孕针，每隔3个月注射1针，避孕效果好；庚炔诺酮避孕针，每隔2个月肌内注射1次。长效避孕针有月经紊乱、点滴出血或闭经等副作用。由于单孕激素制剂对乳汁的质和量影响小，较适用于哺乳期妇女。

23. 【正确答案】 A

【答案解析】弥漫性腹膜炎腹肌紧张不明显。

24. 【正确答案】 C

【答案解析】 前列腺素含量增高是造成痛经的主要原因。无排卵性功血的增生期子宫内膜因无孕酮刺激,所含前列腺素浓度很低,通常不发生痛经。其余项均与痛经有关。

25. 【正确答案】 C

【答案解析】 子宫复旧期缩宫素发挥主要作用。

26. 【正确答案】 C

【答案解析】 阴道分娩镇痛需将神经阻滞范围控制在胸 11~骶 4 之间。

27. 【正确答案】 C

【答案解析】 产后应适当补充维生素和铁剂,推荐补充铁剂 3 个月。

28. 【正确答案】 D

【答案解析】 治疗性早产是指由于母体或胎儿的健康原因不允许继续妊娠,在未足 37 周时采取引产或剖宫产终止妊娠。

29. 【正确答案】 C

【答案解析】 谷维素有助于调节自主神经功能,口服 20mg,每日 3 次。

30. 【正确答案】 C

【答案解析】 双胎或多胎妊娠时,孕妇血容量较单胎妊娠多 500ml,心率和心搏量都增加。

31. 【正确答案】 A

【答案解析】 放射治疗用于不能坚持或耐受药物治疗者;不愿手术者;不能耐受手术者。放射治疗显效慢,可能引起垂体功能低下、视神经损伤、诱发肿瘤等并发症,不主张单纯放疗。

32. 【正确答案】 D

【答案解析】 单绒毛膜性双胞胎的分娩孕周为 35~37 周。

33. 【正确答案】 A

【答案解析】 胎头双顶径长 98~100mm，股骨长 78~80mm，腹围>330mm，应考虑巨大胎儿，同时排除双胎、羊水过多及胎儿畸形。

34. 【正确答案】 E

【答案解析】 产后出血软产道裂伤的可以置橡皮引流。

35. 【正确答案】 B

【答案解析】 阴道紫蓝色转移结节。

二、A2

36. 【正确答案】 E

【答案解析】 此患者考虑为前置胎盘，产科检查可见子宫软，无压痛，子宫大小与停经月份相符，胎方位清楚，胎先露高浮，胎心可正常或异常或消失。

37. 【正确答案】 E

【答案解析】 正常阴道液呈酸性，pH 为 4.5~5.5；羊水的 pH 为 7.0~7.5。用 pH 试纸检查，若阴道流出液 $\text{pH} \geq 6.5$ 时，视为阳性，胎膜早破的可能性极大。

38. 【正确答案】 E

【答案解析】 FGR 一般在孕 34 周左右考虑终止妊娠，孕周末达 34 周者，应当积极促胎肺成熟后再终止妊娠。

39. 【正确答案】 B

【答案解析】 本例诊断为羊水过少，无明显胎儿畸形，已足月，应人工破膜观察羊水。

40. 【正确答案】 C

【答案解析】 臀位分娩时，一旦破水应立即听胎心，以判断有无脐带脱垂。臀位时为避免羊膜突然破裂，脐带脱垂，应卧床，且不宜予肥皂水灌肠。由于胎足较小，宫口开大4cm时即可脱出，所以阴道口见胎足并不表示进入第二产程。活跃期应充分堵臀，但目的主要在于充分扩张产道以利后出头，而不在于避免脐带脱垂。

41. 【正确答案】 B

【答案解析】 此患者为高龄初产，阴道流血发生于胎盘娩出后，出血特点表现为时多时少的阴道持续流血，所以最可能的出血原因应为子宫收缩乏力。而滞产（产程延长）可引起子宫肌水肿或渗血、宫缩乏力，从而导致出血。

42. 【正确答案】 E

【答案解析】 产后出血时应迅速查找出血的原因，脐带不是导致产后出血的原因。

43. 【正确答案】 E

【答案解析】 有感染存在，不应行剖腹探查，可致感染扩散。

44. 【正确答案】 E

【答案解析】 子宫颈肥大为慢性炎症的长期刺激导致腺体及间质增生，临床上一般无需治疗。

45. 【正确答案】 A

【答案解析】 根据患者的年龄及临床特点，该患者的诊断应考虑到功能失调性子宫出血的可能，对于出血量大的功血，应首选诊断性刮宫，既可明确诊断又可迅速有效止血。

46. 【正确答案】 B

【答案解析】 根据患者年龄、不孕、痛经及妇科检查结果应考虑到子宫内膜异位症的可能。慢性盆腔炎一般有急性盆腔炎史。卵巢肿瘤症状常表现为腹胀，腹部肿块及腹水等。子宫腺肌病子宫呈均匀性增大或有局限性结节隆起，质硬而有压痛。

47. 【正确答案】 B

【答案解析】 患者平卧用力向下屏气时，宫颈外口已达处女膜缘，但外口超过处女膜缘，因此可诊断为 I 度重型子宫脱垂。

48. 【正确答案】 A

【答案解析】 孕妇发生水肿时，可取左侧卧位，下肢垫高 15° ，避免长时间地站或坐，以利血液回流。适当限制孕妇对盐的摄入，但不必限制水分。发生贫血时应适当增加含铁食物的摄入，如动物肝脏、瘦肉、蛋黄、豆类等。发生便秘时，孕妇应养成每日定时排便的良好习惯，并多吃含纤维素多的新鲜蔬菜和水果，同时增加每日饮水量，注意适当的活动。

49. 【正确答案】 C

【答案解析】 中骨盆狭窄者，若宫口已开全，胎头双顶径达坐骨棘水平或更低，遵医嘱做好胎头吸引术、产钳等阴道助产术，以及抢救新生儿的准备。

50. 【正确答案】 B

【答案解析】 产程已达 22 小时，进展较缓慢，宫口开全， $S=+4$ ，应尽快结束分娩。因胎头较低，可行胎头吸引器助娩以减少产钳助娩的损伤。

51. 【正确答案】 B

【答案解析】 停经，厌食、晨起呕吐考虑为早孕可能性大。

52. 【正确答案】 E

【答案解析】 停经，尿妊娠试验（+），考虑为妊娠，出现剧烈腹痛并里急后重不除外异位妊娠破裂，应除外异位妊娠。

53. 【正确答案】 B

【答案解析】 子宫内膜癌转移途径包括直接蔓延、淋巴转移、血行转移。

54. 【正确答案】 C

【答案解析】 假性湿疣是指发生于男女性外生殖器部位易与尖锐湿疣混淆的一组皮肤黏膜的病变。这组病变主要包括阴茎珍珠状丘疹、系带旁丘疹和绒毛状小阴唇。

55. 【正确答案】 B

【答案解析】 本例患者出现阴道漏液，考虑患者出现了膀胱阴道瘘，B选项符合。

56. 【正确答案】 A

【答案解析】 本例考虑特纳综合征，属于先天性发育不全，性染色体异常。

57. 【正确答案】 D

【答案解析】 侵蚀性葡萄胎治疗后随访正常，现左附件区不均质回声，hCG升高，考虑可能性最大的是异位妊娠。

58. 【正确答案】 A

【答案解析】 胎儿死亡，虽然宫口已开全，但是为右肩前位，无先兆子宫破裂，应全麻下行断头术或碎胎术。

59. 【正确答案】 B

【答案解析】 枕后位因枕骨持续位于骨盆后方压迫直肠，产妇自觉肛门坠胀及排便感，致使宫口尚未开全时过早使用腹压，容易导致宫颈前唇水肿和产妇产

劳，影响产程进展。前不均倾位易使产妇膀胱受压于前顶骨与耻骨联合之间，使产妇过早出现排尿困难及尿潴留；枕前位高直后位不会导致孕妇的过早排便感。

60. 【正确答案】 D

【答案解析】 急性羊水过多较少见，多发生在妊娠 20~24 周，数日内子宫迅速增大，似妊娠足月或双胎妊娠大小，横膈上抬，出现呼吸困难，不能平卧，甚至发绀，孕妇表情痛苦，腹部张力过大感到疼痛，出现下肢及外阴部水肿及静脉曲张，不能平卧仅能端坐。

61. 【正确答案】 C

【答案解析】 不完全性子宫破裂指子宫肌层全都或部分破裂，浆膜层尚未穿破，宫腔与腹腔未相通，胎儿及其附属物仍在宫腔内。本患者隔着子宫下段可见胎发，说明仅剩浆膜未破，故为不完全子宫破裂。

62. 【正确答案】 B

【答案解析】 20 分钟出现 4 次或 4 次以上规律宫缩，宫缩持续时间 30 秒以上，宫颈管消退 $\geq 75\%$ ，宫颈口扩张 $> 2\text{cm}$ ，为早产临产。

63. 【正确答案】 A

【答案解析】 臀位不宜站立走动，以防破膜后发生脐带脱垂。宫口开全后，不应再“堵”，以防发生子宫破裂或胎儿窘迫。

64. 【正确答案】 C

【答案解析】 新生儿通过产道，吞咽含有 HBV 的分泌物或血液；宫缩时胎盘绒毛破裂，母血渗漏进入胎儿血液循环，导致新生儿感染。剖宫产不能避免 HBV 产时感染，母体 HBV 阳性不是选择性剖宫产的指征。

65. 【正确答案】 E

【答案解析】 滴虫阴道炎应使用硝基咪唑类药物。

三、A3/A4

66. 【正确答案】 D

【答案解析】 根据“胎膜早破、产后发热、子宫复旧不良、压痛阳性，恶露污浊有臭味”等临床特点，首先应考虑到急性子宫内膜炎的可能。

67. 【正确答案】 C

【答案解析】 急性子宫内膜炎多与胎膜早破、产程长、手术产有关。

68. 【正确答案】 E

【答案解析】 妊娠5个月，因阑尾位置变化，可达髂嵴水平，如发生阑尾炎则可能发生“右侧腹部压痛，反跳痛明显，平脐处为甚”。因此考虑妊娠合并急性阑尾炎。

69. 【正确答案】 D

【答案解析】 妊娠期急性阑尾炎不主张保守治疗。一旦确诊，应在积极抗感染治疗的同时，立即手术治疗。妊娠期阑尾炎若一时难以确诊，又高度怀疑急性阑尾炎时，应尽早剖腹探查。

70. 【正确答案】 B

【答案解析】 “羊水Ⅲ度污染，胎心150~160次/min”提示胎儿窘迫，应行阴道检查了解宫口扩大及先露下降情况，以便于选择最快的分娩方式。

71. 【正确答案】 E

【答案解析】 此时宫口已开全，先露部已达坐骨棘平面以下 3cm，而且是经产妇，所以目前应为阴道助产做好准备，不必立即剖宫产。如宫口未开全或胎先露高时，宜立即行剖宫产。

72. 【正确答案】 B

【答案解析】 患者在子痫前期的基础上出现突发的持续性腹痛，阴道流血，符合胎盘早剥的常见表现。

73. 【正确答案】 D

【答案解析】 “子宫不规则收缩，较硬，压痛，宫缩间歇不完全放松”为胎盘早剥的典型表现。

74. 【正确答案】 D

【答案解析】 胎盘早剥时的典型表现为胎盘与子宫壁间有 B 超边缘不清楚的液性暗区，如见此征象即可诊断为胎盘早剥。

75. 【正确答案】 D

【答案解析】 妊娠满 28 周后至 37 周前出现有明显的规律宫缩伴宫颈管缩短，可诊断为先兆早产。

76. 【正确答案】 E

【答案解析】 此患者孕 33 周，胎膜未破，可通过休息和药物治疗控制宫缩，尽量维持妊娠至足月。

77. 【正确答案】 C

【答案解析】 早产不可避免, 应尽早决定合理分娩方式。如臀位、横位, 估计胎儿成熟度低, 产程较长者可选剖宫产。经阴道分娩者, 应考虑使用产钳和会阴切开术尽可能缩短产程。临产后停用抑制宫缩药物。新生儿出生后, 立即结扎脐带, 防止过多母血进入胎儿体内。

78. 【正确答案】 D

【答案解析】 了解胎儿宫内状态, 评估胎儿宫内安危情况。

79. 【正确答案】 E

项目	2分(正常)	0分(异常)
无应激试验(20分钟)	≥2次胎动伴胎心加速≥15次/min持续≥15秒	<2次胎动, 胎心加速<15次/min, 持续<15秒
胎儿呼吸运动(30分钟)	≥1次, 持续≥30秒	无或持续<30秒
胎动(30分钟)	≥3次躯干和肢体活动(连续出现计1次)	≤2次躯干和肢体活动; 无活动或肢体完全伸展
肌张力	≥1次躯干和肢体伸展复屈, 手指摊开合拢	无活动; 肢体完全伸展; 伸展缓慢, 部分复屈
羊水量	最大羊水暗区垂直直径≥2cm	无或最大暗区垂直直径<2cm

【答案解析】

80. 【正确答案】 E

【答案解析】 满分为10分, 10~8分无急慢性缺氧, 8~6分可能有急或慢性缺氧, 6~4分有急或慢性缺氧, 4~2分有急性缺氧伴慢性缺氧, 0分有急慢性缺氧。

81. 【正确答案】 D

【答案解析】 子宫脱垂Ⅱ度表现为：子宫颈已脱出阴道口外，但宫体尚在阴道内为轻型；子宫颈及部分宫体已脱出阴道口外为重型。

82. 【正确答案】 B

【答案解析】 子宫脱垂的手术治疗：①阴道前后壁修补术适用于Ⅰ、Ⅱ度子宫脱垂伴明显阴道前、后壁膨出但宫颈长不明显者；②阴道前后壁修补术加主韧带缩短及宫颈部分切除术又称曼氏手术（Manchester 手术），适用于年龄较轻、宫颈较长的Ⅱ、Ⅲ度子宫脱垂患者；③阴道子宫全切除及阴道前后壁修补术适用于Ⅱ、Ⅲ度子宫脱垂，且年龄较大、无需考虑生育功能的患者。但在将子宫切除后，应将双侧切断的主韧带、宫骶韧带和圆韧带残端分别相互贯穿缝合，以加强盆底的支托功能；④阴道纵隔形成术，又称 Le-Fort 手术，系将阴道前后壁各切除相等大小的黏膜瓣，然后将前后壁剥离创面相对缝合以部分封闭阴道。术后失去性交功能，仅用于丈夫已故、年老体弱不能耐受较大手术且子宫无可疑恶变者。此例患者部分宫体与宫颈外露于阴道口，属Ⅱ度重型脱垂，宫颈较长，故应行 Manchester 手术。

83. 【正确答案】 E

【答案解析】 蒂扭转为常见的妇科急腹症，见于中等大小、蒂长、活动度大的皮样囊肿。患者常突然感下腹一侧剧痛，呈绞痛，伴恶心、呕吐，妇科检查扪及肿块张力大，有压痛。

84. 【正确答案】 E

【答案解析】 蒂扭转是常见的妇科急腹症，一经确诊，应尽快行剖腹手术，术时应在蒂根下方钳夹，将肿瘤和扭转的瘤蒂一并切除，钳夹前不可回复扭转，以防栓塞脱落。

85. 【正确答案】 E

【答案解析】 肌瘤红色变性多发生于妊娠期或产褥期，可有急性腹痛、发热、肌瘤迅速增大等临床表现，剖面呈暗红色，质软，旋涡状结构消失。

86. 【正确答案】 C

【答案解析】 肌瘤发生红色变性，应采用保守治疗，对症处理后多能自行缓解。

87. 【正确答案】 D

88. 【正确答案】 C

89. 【正确答案】 D

90. 【正确答案】 A

【答案解析】 ①妊娠 28 周左右出现症状，有既往史，临床表现符合妊娠期肝内胆汁淤积症典型。②血清胆酸增高是妊娠期肝内胆汁淤积症的特征性变化。③肝炎时的消化道症状明显。④妊娠期肝内胆汁淤积症对孕妇影响不大，不影响孕妇血压，主要是影响胎儿。

91. 【正确答案】 B

【答案解析】 该患者潜伏期已为 17 小时，超过了 16 小时。

92. 【正确答案】 E

【答案解析】 绝大多数潜伏期宫缩乏力产妇经充分休息后自然进入活跃期。

93. 【正确答案】 C

【答案解析】 频繁晚期减速说明存在胎儿严重缺氧，应立即剖宫产终止妊娠。

94. 【正确答案】 A

95. 【正确答案】 D

【答案解析】 ①单臀先露最常见，分娩时也较安全。足先露对分娩最不安全。B超可以确定臀先露的类型、胎儿大小及胎头姿势。②臀先露的剖宫产指征包括：产道异常、高龄初产、有难产史、胎儿偏大、不完全臀先露等。后出头时用单叶产钳助产效果佳。

96. 【正确答案】 B

【答案解析】 在产褥早期因子宫收缩引起下腹部阵发性剧烈疼痛，称为产后宫缩痛，一般在产后1~2日出现，持续2~3日自然消失。

97. 【正确答案】 D

【答案解析】 乳房胀痛，无红肿，考虑乳汁过多积聚在乳房内，应让新生儿多吸吮。

98. 【正确答案】 E

【答案解析】 一般产后如果乳头凹陷，导致吸乳障碍。

99. 【正确答案】 D

【答案解析】 重度妊娠期高血压疾病、先兆子痫，剖宫产术后0.5h，阴道持续流血，未见血凝块，失血达900ml，应用宫缩剂无效，考虑为凝血功能障碍。

100. 【正确答案】 B

【答案解析】 需进一步检查血小板和凝血功能。



正保医学教育网

www.med66.com