

问题索引：

1. 患者头痛身重，肩背、腰脊疼痛，难以转侧，苔白，脉浮，治宜用
2. 布散于体表皮肤、肌肉和孔窍的是
3. 解鱼蟹中毒最宜用的药物是
4. 下列属于证候转化的是
5. 毛细血管脆性增加可见于

1. 患者头痛身重，肩背、腰脊疼痛，难以转侧，苔白，脉浮，治宜用
 - A. 桂枝汤
 - B. 羌活胜湿汤
 - C. 防己黄芪汤
 - D. 独活寄生汤
 - E. 以上都不是

【答案】B

【解析】羌活胜湿汤主治风[医学教育网]湿犯表。头痛身重，肩背、腰脊疼痛，难以转侧，苔白，脉浮。

2. 布散于体表皮肤、肌肉和孔窍的是
 - A. 津
 - B. 液
 - C. 血
 - D. 气
 - E. 精

【答案】A

【解析】津的特点为：流动性较[医学教育网]大，布散于体表皮肤、肌肉和孔窍，并能渗注于血脉，起滋润作用的。

3. 解鱼蟹中毒最宜用的药物是

- A. 生姜、白芷
- B. 紫苏、半夏
- C. 紫苏、生姜
- D. 生姜、葛根
- E. 葛根、菊花

【答案】C

【解析】紫苏能解鱼蟹毒[医学教育网]，治进食鱼蟹中毒而致腹痛吐泻者。生姜对生半夏、生南星等药物之毒，以及鱼蟹等食物中毒，均有一定的解毒作用。

4. 下列属于证候转化的是

- A. 表里出入
- B. 表里同病
- C. 寒热错杂
- D. 虚实夹杂
- E. 以上都是

【答案】A

【解析】证候转化指疾病[医学教育网]在其发展变化过程中，其病位、病性，或邪正盛衰的状态发生变化，由一种证候转化为对立的另一种证候。证候的转化包括表里出入、寒热转化、虚实转化。

5. 毛细血管脆性增加可见于

- A. 尿毒症
- B. 过敏性紫癜
- C. 血小板无力症
- D. 血管性血友病
- E. 以上都是

【答案】E

【解析】毛细血管脆性增加见于：（1）毛细血管壁异常：如遗传性出血性毛细血管扩张症、过敏性紫癜、单纯性紫癜及维生素 C 缺乏症；中毒性损害，如败血症、感染性心内膜炎[医学教育网]、尿毒症、砷中毒。（2）血小板量与质异常：如原发性或继发性血小板减少性紫癜、血小板无力症。（3）血管性血友病等。