

医学教育网执业西药师:《答疑周刊》2022年第45期

问题索引:

1. 【问题】慢性阻塞性肺疾病治疗药物是什么?
2. 【问题】肺结核的治疗药物及不良反应是什么?
3. 【问题】肺结核标准化学治疗方案是什么?

具体解答:

1. 【问题】慢性阻塞性肺疾病治疗药物是什么?


治疗作用	代表药物
支气管舒张剂	短效 $\beta_2$ 受体激动剂: 沙丁胺醇、特布他林 (雾化吸入)
	长效 $\beta_2$ 受体激动剂: 每日 2 次: 福莫特罗、沙美特罗; 每日 1 次: 茚达特罗、奥达特罗、维兰特罗
	抗胆碱药物: 异丙托溴铵 (短效)、噻托溴铵 (长效)
	甲基黄嘌呤类磷酸二酯酶抑制剂: 茶碱
抗炎药物	糖皮质激素、磷酸二酯酶-4 (PDE-4) 抑制剂: 罗氟司特
祛痰药	有盐酸氨溴索、乙酰半胱氨酸、福多司坦、桉柠蒎等
抗氧化剂	大剂量 N-乙酰半胱氨酸或羧甲司坦, 可降低 COPD 反复加重的频率

2. 【问题】肺结核的治疗药物及不良反应是什么?

药物	不良反应
异烟肼 (H)	周围神经病 (肌肉痉挛、四肢感觉异常, 可合用维生素 B <sub>6</sub> 进行预防)、药物性狼疮、癫痫、脑病
利福平 (R)	体液变色-橘红色、流感样综合征、药物性血管炎、急性间质性肾炎
吡嗪酰胺 (Z)	痛风、关节痛; 恶心、食欲不振、面色潮红、光敏性
乙胺丁醇 (E)	关节痛, 尿酸升高, 球后视神经炎 (视力模糊、红绿色盲、视野受限)

3. 【问题】肺结核标准化学治疗方案是什么?

个体情况	方案
初治活动性肺结核	2HRZE/4HR
不能耐受吡嗪酰胺 (Z) 的患者	2HRE/7HR
异烟肼耐药地区	2HRZE/4HRE
对急性粟粒型肺结核或结核性胸膜炎患者	3HRZE/6-9HR
复治活动性肺结核	3HRZE/6HR, 2HRZSE/6HRE, 2HRZSE/1HRZE/5HRE



正保医学教育网

www.med66.com