

医学教育网临床助理医师考试:《答疑周刊》2023年第21期

女性生殖系统在医师考试中属于分数多、有些难度的科目,需要了解解剖关系同时结合临床来学习,这里介绍女性生殖系统病理妊娠的相关考点。

问题索引:

1. 自然流产的母体因素有哪些?
2. 流产的治疗原则是什么?
3. 过期妊娠的病因有哪些?

具体解答:

1. 自然流产的母体因素有哪些?

关于自然流产母体因素的说法错误的是

- A. 全身性疾病
- B. 生殖器官异常
- C. 内分泌异常
- D. 母胎血型抗原不合
- E. 强烈应激

【答案】D

【解析】自然流产母体因素包括:

(1) 全身性疾病: 孕妇严重感染、高热疾病等全身性疾病刺激子宫强烈收缩; 严重贫血、心力衰竭引发胎儿缺氧、细菌毒素、病毒经胎盘进入胎儿血循环导致胎儿死亡、孕妇患慢性肾炎、高血压致胎盘梗死, 均可导致流产。

(2) 生殖器官异常: 子宫畸形和子宫肿瘤影响胚胎着床发育。宫颈内口松弛、宫颈重度裂伤引发胎膜早破, 导致晚期流产。

(3) 内分泌异常: 黄体功能不足、甲状腺功能减退、严重糖尿病等, 均可导致流产。

(4) 强烈应激: 妊娠期严重躯体不良刺激(如手术, 直接撞击腹部, 性交过频)或精神创伤(过度紧张、焦虑、恐惧、忧伤等), 均可导致流产。

母胎血型抗原不合属于免疫功能异常。[医学教育网原创]

## 2. 流产的治疗原则是什么？

关于流产的治疗原则，下列哪项是错误的

- A. 难免流产应行刮宫术
- B. 不全流产应行刮宫术
- C. 患者自述阴道有组织物从阴道内排出，但阴道流血未见减少，应行刮宫术
- D. 感染性流产出血不多，应抗感染及刮宫同时进行
- E. 子宫颈内口松弛者，应在妊娠 12~14 周时行子宫颈内口缝扎术

**【答案】** D

**【解析】** 治疗原则应积极控制感染，若阴道流血不多，应用广谱抗生素 2~3 日，待控制感染后再行刮宫，清除宫腔残留组织以止血。若阴道流血量多，静脉滴注广谱抗生素和输血的同时，用卵圆钳将宫腔内残留组织夹出，使出血减少，切不可用刮匙全面搔刮宫腔，以免造成感染扩散。术后继续应用抗生素，待感染控制后再行彻底刮宫。[医学教育网原创]

## 3. 过期妊娠的病因有哪些？

与过期妊娠无关的是

- A. 羊水过多
- B. 头盆不称
- C. 巨大胎儿
- D. 雌孕激素比例失调
- E. 胎盘缺乏硫酸酯酶

**【答案】** A

**【解析】** 过期妊娠的病因包括：1. 雌孕激素比例失调；2. 头盆不称；3. 胎儿畸形；4. 遗传因素。胎盘缺乏硫酸酯酶是一种罕见的伴性隐性遗传病，可导致过期妊娠。正常妊娠 38 周后，羊水量随妊娠推延逐渐减少。故本题正确答案是 A。[医学教育网原创]