

医学教育网口腔主治医师：《答疑周刊》2023 年第 25 期

问题索引：

1. 扁平苔藓发病于部位？
2. 全口义齿修复时垂直距离恢复过低有什么表现？
3. I 度根分叉病变可以选择哪种治疗？
4. 多少浓度的过氧化氢溶液可以用于牙周冲洗液？

具体解答：

1. 扁平苔藓发病于部位？

下列哪项不是扁平苔藓的发病部位

- A. 皮肤
- B. 生殖器
- C. 指甲
- D. 眼结膜
- E. 口腔黏膜

【答案】D

【解析】扁平苔藓的病损特点有皮肤损害、[医学教育网原创]指甲与（或）趾甲损害、口腔黏膜损害、生殖器黏膜损害。故答案为 D。

2. 全口义齿修复时垂直距离恢复过低有什么表现？

全口义齿戴用一段时间后，引起髁突明显后移并出现关节症状，其原因是

- A. 垂直距离过低
- B. 垂直距离过高
- C. 咬合力过大
- D. 咬合不平衡
- E. 义齿固位不良

【答案】A

【解析】天然牙列存在时，[医学教育网原创]上下颌的关系依赖于上下牙列牙齿的尖窝交错的接触而得到保持。此时患者两侧髁突处于关节凹中的生理后位。

全口义齿的垂直距离过低时，患者戴入义齿并咬合时下颌髁突会明显向后上方移位，严重时可合并关节症状，故正确答案选 A。一般情况下，垂直距离过高时，患者面下 1/3 垂直距离增大，同时伴有面颊部肌肉酸痛或关节不适等，所以不能选 B。其他选项的情况也不会产生髁突后移及关节症状。

3. I 度根分叉病变可以选择哪种治疗？

若牙周袋较浅，牙槽骨的外形尚佳，做龈下刮治使牙周袋变浅即可，此种做法适合哪种程度的根分叉病变

- A. I 度病变
- B. II 度病变
- C. III 度病变
- D. IV 度病变
- E. V 度病变

【答案】 A

【解析】 I 度病变：若牙周袋较浅，牙槽骨的外形尚佳，做龈下刮治使牙周袋变浅即可。若袋较深，牙槽骨不符合生理外形，[医学教育网原创]应在基础治疗后，行翻瓣手术消除牙周袋和修整骨外形，以利于菌斑控制。

4. 多少浓度的过氧化氢溶液可以用于牙周冲洗液？

过氧化氢溶液作为牙周冲洗液的浓度为

- A. 0.5%
- B. 1.0%
- C. 1.5%
- D. 2.0%
- E. 3.0%

【答案】 E

【解析】 [医学教育网原创]过氧化氢溶液作为牙周冲洗液的浓度为 3.0%。