

医学教育网中医执业助理医师: 《答疑周刊》2023年第25期

问题索引:

1. 慢性肺心病患者的首要死亡原因是什么?
2. 乙脑主要的传染源是什么?
3. 胃癌发生淋巴结转移时, 常转移至哪个部位?

具体解答:

1. 慢性肺心病患者的首要死亡原因是什么?

慢性肺心病的首要死亡原因是

- A. 酸碱失衡
- B. 电解质紊乱
- C. 心律失常
- D. 消化道出血
- E. 肺性脑病

【答案】E

【解析】肺性脑病是指由于严重缺氧及高碳酸血症导致中枢神经系统功能障碍, 出现意识模糊、谵妄甚至昏迷等一系列精神神经症状的临床综合征, 是慢性肺心病患者首要的死亡原因[医学教育网原创]。

2. 乙脑主要的传染源是什么?

乙脑的主要传染源是

- A. 猪
- B. 鸡
- C. 鸭
- D. 蚊子
- E. 患者

【答案】A

【解析】人感染乙脑病毒后病毒血症期短暂, 血中病毒含量少, 不是乙脑主要的传染源。家畜、家禽和鸟类均可感染乙脑病毒。猪的感染率高, 感染后血中

病毒含量多, 病毒血症期长, 且猪的饲养范围广, 更新快, 是乙脑主要的传染源。乙脑主要通过蚊虫叮咬而传播, 蚊子不是乙脑主要的传染源 [医学教育网原创]。

3. 胃癌发生淋巴结转移时, 常转移至哪个部位?

胃癌发生淋巴结转移时常出现在

- A. 右锁骨上窝
- B. 左锁骨上窝
- C. 颈部
- D. 腋窝
- E. 滑车上

【答案】 B

【解析】恶性肿瘤转移所致的淋巴结肿大, 质硬或有橡皮样感, 一般无压痛, 表面光滑或有突起, 与周围组织粘连而不易推动。左锁骨上窝淋巴结肿大, 多为腹腔脏器癌肿(胃癌、肝癌、结肠癌等)转移; 右锁骨上窝淋巴结肿大, 多为胸腔脏器癌肿(肺癌等)转移。鼻咽癌易转移到颈部淋巴结; 乳腺癌最早经胸大肌外侧缘淋巴管侵入同侧腋下淋巴结[医学教育网原创]。