

医学教育网主管护师:《答疑周刊》2024年第8期

问题索引:

1. 【问题】 排卵性功血与无排卵性功血的区别?
2. 【问题】 内囊出血所致的对侧肢体三偏综合征和脑桥出血所致的交叉瘫痪有什么区别?
3. 【问题】 预产期如何推算?

具体解答:

1. 【问题】 排卵性功血与无排卵性功血的区别?

【解答】

分类/类型	排卵性	无排卵性
好发时期	生育年龄	青春期和绝经过渡期
发病机制	黄体功能不全和子宫内膜不规则脱落	青春期一下丘脑-垂体-卵巢轴调节功能未发育成熟; 绝经过渡期一卵巢功能衰退
临床表现	黄体功能不足一月经周期缩短; 子宫内膜不规则脱落一月经周期正常, 经期延长, 出血量多	不规则子宫出血(最常见), 月经周期紊乱, 经期长短不一, 出血量时多时少, 多有大量出血, 也可由长时间少量出血, 淋漓不断。有贫血, 一般无腹痛
基础体温测定	双相型	单相型
治疗原则	恢复黄体功能	青春期及生育期一止血、调整周期、促排卵; 绝经过渡期一止血、调整周期、减少经量、防止子宫内膜病变

2. 【问题】 内囊出血所致的对侧肢体三偏综合征和脑桥出血所致的交叉瘫痪有什么区别?

【解答】 偏瘫、偏身感觉障碍、偏盲叫三偏综合征。它是内囊出血的典型症

状。

(1) 偏瘫: 病变脑组织对侧肢体瘫痪。

(2) 偏身感觉障碍: 病灶对侧肢体感觉减退或消失。

(3) 偏盲: 病灶对侧同向偏盲, 比如病灶在右侧内囊, 则左眼外侧一半及右眼内侧一半看不见。

交叉性瘫痪——表现为病变侧脑神经麻痹和对侧肢体的瘫痪。

### 3. 【问题】预产期如何推算?

【解答】预产期推算公式:

$EDC(月) = LMP(月) - 3(或+9)$

$EDC(日) = LMP(日) + 7$

批注: EDC 为预产期英文缩写, LMP 为末次月经英文缩写。末次月经日期的月份加 9 或减 3, 为预产期月份数; 天数加 7, 为预产期日。

此类型题注意年份和 2 月份天数。

注: 一三五七八十腊, 三十一天永不差。除二月, 剩余月份均为三十天。