

医学教育网妇产科主治医师：《答疑周刊》2024年第8期

分娩中随着新生儿出生体重的逐渐上升，产伤、肩难产、异常分娩和新生儿永久性损伤更易发生。因此对巨大儿的诊断及终止妊娠的时机尤为重要。通过练习题目，一起来回忆一下此部分的知识点吧！

问题索引：

1. 关于巨大儿，下列哪项不正确？
2. 发生巨大儿的高危因素有哪些？
3. 巨大儿对母儿的影响有哪些？

具体解答：

1. 关于巨大儿，下列哪项不正确？

关于巨大儿，下列哪项不正确

- A. 我国定义为胎儿体重超过 4000g
- B. 近年发生率明显下降
- C. 男胎多于女胎
- D. 巨大儿手术产率及死亡率较正常胎儿高
- E. 巨大儿易造成肩难产

【答案】B

【解析】巨大胎儿指任何孕周胎儿体重超过 4000g。近年来，营养过剩的孕妇有逐渐增多趋势，导致巨大胎儿的发生率增加较快（B 错）。男胎多于女胎。巨大儿手术产率及死亡率较正常胎儿高。巨大儿在分娩过程中易出现肩难产。[医学教育网原创]

2. 发生巨大儿的高危因素有哪些？

发生巨大儿的高危因素，除了下列哪项？

- A. 羊水过多
- B. 妊娠期糖尿病
- C. 营养过剩
- D. 有巨大儿分娩史

E. 父母身材高大

**【答案】** A

**【解析】**巨大儿高危因素包括：①孕妇肥胖；②妊娠合并糖尿病，尤其是 2 型糖尿病；③过期妊娠；④经产妇；⑤父母身材高大；⑥高龄产妇；⑦有巨大胎儿分娩史；⑧种族、民族因素。部分胎儿染色体异常的胎儿多合并羊水过多。妊娠期糖尿病孕妇中羊水过多及巨大儿的发生率高，但羊水过多不是巨大儿的高危因素（A 错）。[医学教育网原创]

### 3. 巨大儿对母儿的影响有哪些？

巨大儿对母儿的影响，除了下列哪项

- A. 难产及肩难产
- B. 产后出血
- C. 软产道裂伤
- D. 羊水栓塞
- E. 新生儿臂丛神经损伤

**【答案】** D

**【解析】**①对母体影响：头盆不称发生率上升，增加剖宫产率；经阴道分娩主要危险是肩难产（A 对），其发生率与胎儿体重成正比。肩难产处理不当可发生严重的阴道损伤和会阴裂伤甚至子宫破裂（C 对）；子宫过度扩张，易发生子宫收缩乏力、产程延长，易导致产后出血（B 对）。胎先露长时间压迫产道，容易发生尿瘘或粪瘘。②对胎儿影响胎儿大，常需手术助产，可引起颅内出血、锁骨骨折、臂丛神经损伤等产伤（D 对），严重时甚至死亡。巨大儿不引起羊水栓塞。[医学教育网原创]